

COMMENTATIO

DE

INFANTVM NVPER NATORVM

VMBILICO

ET

PVLMONIBVS.

---

AUCTORE

CHRIST. FRID. DANIEL.

---

THEATLAE

SVMTV JO. CHRIST. KENDALL.


1780.

---

Famossimae omnium & quae haecenus medicis & Ictis crucem fixerunt, sunt, omissa *funiculi* deligatio & submersio *pulmonum*. De utraque plures magnifice sentiunt, alii iterum illas parum pensi habent.

I. F. S. de BOEHMER,  
in d. de parric. §. 6. p. 13.

---



## P R A E F A T I O.

**Q**uemadmodum libellum de vulnerum letalitate edens desideravi, ut in omni prouincia exstaret a collegio medico conscriptus de vulnerum letalitate liber, sic etiam vexatissimis de argumentis, de umbilici deligationis necessitate & de pulmonum nuper natorum docimasia, commentationes editurus, iterum in votis habeo, ut de hoc argumento ubique libelli exstarent, quo dissensus denique, qui tum enunciationibus, tum observationibus Cl. VV. nititur, tollatur; quis, quantusque sit, & quo iure hodie & ICrī, & Medici, in decernendis causis atque eruenda

\* 2

veri-

veritate saepe ambigent, vtraque commentatione ostendere studui, tum promissis satisfactorius, tum ad Cl. VV., FISCHERI & PLOUCQUETI obiectiones atque opprobria responsurus.

Sic autem accipias velim, B. L., has commentationes, ut putes, me, quantum in me fuit, ab omni praeiudicata opinione fuisse alienum, me neque observationes, neque enunciationes, a Cl. VV. prolatas, vel ornasse, vel ab iis quidquam detraxisse, nullumque, vel in enarranda historia, vel in eadem diuidenda, vel in eruendis enunciationibus, alium me intendisse finem, nisi, ut verum non quaererem solum, potius aut inuenirem ipse, aut, alii ut facilius inuenirent, efficerem. Quem quidem si adsecutus forte sim, fore spero, ut B. L. ea, quae contra Cl. VV. etiam in his commentationibus proferre debui, non per contradicendi quemdam pruritum, sed per veri eruendi nec leue, nec vituperandum, explicet studium.

Ut vero, nisi nouum a me propositum pulmonum experimentum consideratione indignum fuerit, summi in arte viri, iique praecipue, qui facilem instituendorum eiusmodi experimentorum occasionem nacti sunt

anae



anatomicos & obstetrices volo, in eam rem capiant experimenta, tum, vtrum liceat eo experimento vti, tum, quatenam vel addi vel detrahi debeant eius vsui, significatura, publice obtestor. Huic enim experimento operam, quam possunt, nauaturis, infanticidii crimine suspectarum, innocentium matrum, inde absoluendarum, apprecor benedictionem, tum rei publicae infanticidii nefandi criminis, commissi a matribus, in proprium sanguinem turpiter furentibus, vindictam iustam inde obtinentis, obtestor beneuolentiam \*). Neque equidem mihi persuadeat, medici esse, legum sancitarum aequitatem & vim scrutari, atque iniquis responsis efficere, vt aequitas quaecumque visa obtineatur, & ICtorum sententia a vero seducetur; sed id potius medici esse puto, vt certitudinem corporis delicti omni ratione eruendam adiuuet.

Censuras iniquas sperno, doctas & graues desiderans: neque enim is sum, qui sui laboris quaerat admiratores, & doctorum vi-

\* 3

rorum

\*) Vtinam Cl. TITTELII nuper in libello, inscripto: *über die Todesstrafen gegen Moerder*, dicta de infanticidio expenderent tum ICtorum tum medicorum ii, qui infanticidii crimen adeo vilipendunt.

rorum in errore applausum: Verum ut splendeat, ubique placet.

Addo, quod limatiores forte prodissent: hae commentationes, nisi, iam ante aliquot annos conscriptae, nunc edendae fuissent, ob indicatas causas, & simul condito aegritudinum systemati, mox edendo, criticas manus denuo adhibere deberem, cuius aliquam futuram esse utilitatem, vel sola lectio librorum, de publicae medicinae bene instituendae methodo, nuper editorum suadere videtur. Ostendet forte, aliam ineundam esse viam, ac propositam, ut finis obtineatur laudabilis, qualem vero inuentam numquam publicam facturum me umquam esse, vix credo, quod applausus doctorum virorum quem, non quaeram, quo iure, nuper reportauit scriptor, me docuerit, rei publicae non aequam semper esse rerum censuram ut metuam, ne laborum ne leuissima quidem reportem praemia. Scrib. Hall. Magd.  
a. d. XX. Iul. clcIo cclxxx.



# COMMENTATIONIS

DE

## V M B I L I C O.

### ARGVMENTA.

- §. I. Veterum quorundam pauca placita.
- II. Recentiorum ab aliquot retro saeculis de vmbilico & placenta opiniones. P. 3 sq.
- III. Inde a nostri saeculi initio negarunt vmbilici deligationis necessitatem FANTONVS & SCHVLZIVS; horum argumenta. 5
- III. Qui secuti sint hos. BVCHWALDI, WERLHOFFII, SCHWEICKARDI, ROEDERERI, rel. argumenta. 9
- V. Argumenta, a Cl. FISCHERO proposita. 14
- VI. Ad auctorum, §§. III–V. adductorum, argumenta respondetur: de ortu quaestionis: an deligatio vmbilici necessaria sit? 18
- VII. Quaestionem dictam in foro carere utilitate, ostenditur. 20
- VIII. Respondetur ad FISCHERI argumentum I. 23
- IX. Respondetur ad FISCHERI argumentum II. 25
- \* 4 §. X.

§. X. Respondetur ad FISCHERI argu- mentum III.	P. 26
XI. Respondetur ad FISCHERI argu- mentum IV.	28
XII. Respondetur ad obiectionem.	32
XIII. Respondetur ad argumentum V. FISCHERI.	34
XIV. Quaestio est de obs. LXXVI. b. pa- rentis.	36
XV. Et de obs. LXV.	40
XVI. Quaestio est de obs. LXVII.	42
XVII. Vindiciae obs. LXXIV.	46
XVIII. Vindiciae obs. LXXVIII.	49
XIX. Haemorrhagia umbilicalis non est effectus laesionis capitis. Neque <i>νεμεαγγιλια</i> potest per congestiones aut extranasationes explicari.	50
XX. Quod probatur observationibus.	53
XXI. }	
XXII. }	
XXIII. }	
XXIV. Respondetur ad argumentum VI. Cl. FISCHERI.	62
XXV. Vbinam de haemorrhagia umbili- cali quaeratur. Distinctio eiusdem in vterinam & infantilem.	65
XXVI. Quando haemorrhagia umbilica- lis vterina adfit.	67
XXVII. Quando haemorrhagia infanti- lis adfit. Animaduersiones.	69
XXVIII. Certitudinem haemorrhagiae quomodo nos adsequi possimus.	73 a sq.
	§. XXIX.

- §. XXIX. Intentio matris circa infantilem  
haemorrhagiam ex physicis princi-  
piis illustratur. P. 73 b sq
- XXX. Neque haemorrhagia testatur de  
vita infantis, neque placentae solu-  
tio praecept de fetus debilitate aut  
morte. 76 sq.
- XXXI. Animaduersio. 79 sq.
- XXXII. Umbilici constitutio varia quae-  
nam indicet. 80 sq.
- XXXIII. Haemorrhagiae infantilis umbi-  
licalis causae accessoriae. 81 sq.
- XXXIV. An de vita & morte testatur  
umbilicus? 83 sq.
- XXXV. Animaduersio. 84 sq.
- XXXVI. Conclusio. De vulnerum leta-  
litate verba fiunt. 85 sq.

## COMMENTATIONIS

DE

## P V L M O N I B V S ARGVMENTA.

### SECTIO I.

### RECENSVS SCRIPTORVM SAECVLI XVII.

(Galenus).	93
A. Spigelius.	
I. S. Pinaeus.	
G. Harueus.	
G. Charletonus.	94
I. Diemerbroeckius.	
* 5.	Th.



<i>Th. Bartholinus.</i>	P. 94.
<i>Tr. Swammerdamius.</i>	
<i>M. Truſtonus.</i>	95
<i>C. Raygerus.</i>	
<i>I. Diemerbroeckius.</i>	96
<i>Th. Willifius.</i>	
<i>M. Ettmüllerus.</i>	97 ſq.
<i>Th. Bartholinus.</i>	98
<i>Fr. Fabricius ab Aquapendente.</i>	99
<i>C. Stalpart van der Wiel.</i>	
<i>Th. Craanen.</i>	100
<i>H. Ouerkampius.</i>	101
<i>St. Blancardus.</i>	102
<i>I. Schreyerus.</i>	
<i>Riuius &amp; Langius.</i>	103 ſq.
<i>G. Budaeus.</i>	105
<i>I. Zellerus &amp; I. D. Mauchart.</i>	106
<i>I. C. Weſtphal.</i>	107

## SECTION II.

### RECENSUS SCRIPTORVM SAECVLI XVIII.

<i>I. Bohnius.</i>	107 ſq.
<i>I. C. Becker.</i>	109
<i>I. I. Schoepfer.</i>	
<i>Fr. Ruyschius.</i>	110
<i>I. D. Mauchart.</i>	
<i>G. Baglinus.</i>	
<i>I. von Hoorn.</i>	111
<i>I. D. Goblus.</i>	ſq.
<i>G. Beyerus.</i>	112
<i>I. C. Kundmannus.</i>	113
<i>L. Heiſterus.</i>	

*C. Vater.*



<i>C. Vater.</i>	P. 114
<i>H. Fr. Teichmeyer.</i>	
<i>M. Alberti.</i>	115
<i>L. Heisterus.</i>	
<i>I. I. Geelhausen.</i>	116
<i>Fr. Hoffmannus.</i>	
<i>M. Alberti.</i>	sq.
<i>A. O. Goelicke.</i>	118
<i>E. E. Richter.</i>	
<i>M. Schurigius.</i>	119
<i>L. Heisterus.</i>	
<i>I. D. Göblius.</i>	
<i>A. Vater.</i>	120
<i>D. Boessel.</i>	
<i>I. P. Kressius, I Ct.</i>	121
<i>Roukema, P. &amp; B. Idema, Schellinger,</i> <i>Wierdsma &amp; Croeser.</i>	121 sq.
<i>R. F. Ouelgün.</i>	123
<i>A. Leyserus, I Ct.</i>	
<i>G. H. Eisenmannus.</i>	124
<i>I. B. Mazinus.</i>	
<i>Torrezius.</i>	125
<i>C. F. Kaltschmied.</i>	
<i>F. E. Cangiamila.</i>	126
<i>I. E. Hebenstreit.</i>	sq.
<i>C. E. Eschenbach.</i>	129
<i>P. C. Fabricius.</i>	sq.
<i>G. C. Detharding.</i>	131
<i>I. G. Roedererus.</i>	
<i>A. de Haën.</i>	
<i>A. de Haller.</i>	132
<i>I. Ruth.</i>	133
<i>A. van</i>	

<i>A. van der Laar.</i>	P. 134
<i>I. B. Morgagnus.</i>	sq.
<i>A. de Haller.</i>	136
<i>C. C. Schmiedel.</i>	137
<i>I. T. Adolph.</i>	138
<i>C. G. Büttner.</i>	139
<i>A. de Haller.</i>	140
<i>Idem.</i>	141
<i>C. G. Ludwig.</i>	
<i>C. F. Jaeger.</i>	sq.
<i>F. Tartarotti de Eichenberg.</i>	142
<i>I. F. Faselius.</i>	143
<i>I. F. Eisenhart ICt.</i>	
<i>I. P. Baumer.</i>	144
<i>G. H. Kannegiesser.</i>	145
<i>I. I. L. Neydeck.</i>	sq.
<i>A. Portal.</i>	
<i>I. C. Kochius ICt.</i>	148
<i>I. S. F. de Boehmer, ICt.</i>	
<i>C. G. Büttner.</i>	149 sq.
<i>I. W. Baumer.</i>	151
<i>E. G. Bofe.</i>	
<i>C. L. Lieberkühn.</i>	152
<i>C. A. Marherr.</i>	153
<i>C. E. Eschenbach.</i>	154
<i>I. G. Zierhold.</i>	
<i>b. parens.</i>	
<i>Ipse.</i>	155
<i>H. A. Wrisberg.</i>	sq.
<i>I. Kiernänder.</i>	159
<i>I. C. Quistorp. ICt.</i>	160
<i>P. Camper.</i>	161
	I. C.

<i>I. C. Ruef.</i>	P. 164
<i>G. G. Plouquet.</i>	
<i>I. G. Baumer.</i>	166
<i>Anonymus.</i>	167
<i>I. C. Loder.</i>	170
<i>Ipsē.</i>	

### SECTIO III.

#### ANIMADVERSIONES.

§. XXIV. Infanticidium aegre definitur.	P. 171
XXV. In eo detegendo iuvat scrutinium pulmonum.	172
XXVI. Fetus in utero non respirat.	174
XXVII. Neque effluxis aquis in utero aut vagina respirat, vno casu excepto.	177
XXVIII. Infans natus non semper mox respirat.	181
XXVIII. Respirationis effectus commemorantur. Thoracis incrementum. Volumen pulmonum auctum. Vesicularum distensio. Color. Copia sanguinis aucta. Pondus imminutum.	183 sq.
XXX. Experimentum pulmonum sollemne quid doceat. Monitum.	188 sq.
XXXI. Putredinis vis in pulmonum experimento.	191 sq.
XXXII. Inflationis vis in experimento pulmonum.	193 sq.
XXXIII. Experimentum sollemne, & quae addiderunt B A U M E R V S &	

BÜTTNERVS non sufficiunt, vt  
tuto de respiratione iudicetur. P. 195 sq.

XXXIV. De antlia pneumática & thora-  
cis incremento. 197

XXXV. Nouum nostrum experimentum  
describitur. 200

XXXVI. De eiusdem laudibus & vitu-  
perationibus. 202

XXXVII. De utilitate porro. 207

XXXVIII. Vbi infans viuus non respi-  
ret. 210

XXXIX. Quis dici possit respirasse. 213

### SECTIO III.

#### V S V S F O R E N S V S.

§. XXXX. Quando de respiratione facta aut  
non facta statui possit. P. 214

XXXXI. Quis respirauerit. 215

XXXXII. Quis suffocatus dici possit. 216

XXXXIII. Quis non respirauerit. 217

XXXXIV. Inflatio quando adsit. 219

XXXXV. Putredo quando natationis  
caussa. 220

XXXXVI. Iudicium vbi suspendendum. 221


XXXXVII. Quo ordine condiciones con-  
siderandae. ibid.


XXXXVIII. Conclusio. Animaduersiones. 222 sq.

COMMENTATIO

D E

V M B I L I C O.









SENTENTIARVM

DE

VMBILICI

IN

NVPER NATIS DELIGATIONE

ATQVE

REI UTILITATIS IN FORO

EXAMEN.

---

I.

*Veterum quorundam pauca placita.*

**Q**uaerisne, qui factum sit, vt vmbilicus abscindatur & deligetur? GALENVS <sup>a)</sup> quidem

<sup>a)</sup> In libro, GALENO adscripto: *de historia philosoph.*  
ed. opp. GALENI Froben. f. 11.

A

quidem ex illo stoicorum placito, fetum ope umbilici primum spiritum ad se attrahere & foras emittere, sanguinemque eius ope quoque ad fetum a matre duci, obstetricum consuetudinem deducit, funiculum simul, ac quis editus est fetus, deligandi, orisque rictum digitis aperiundi, quo cibus iam aliunde conqueri incipiat. AVICENNA <sup>b)</sup> autem, cur umbilicus abscindi, vnam, cur deligari debeat, duas adfert rationes. „Umbilicus, inquit, in primis debet incidi, si nempe remaneret hoc corpus umbilicale secundum longitudinem suam, tunc putresceret & noceret infanti cum odore suo fetido, & fortasse perucniret putredo ad partem internam umbilici. — Et ligari oportet post eius incisionem propter duas causas, quarum una est aggregatio partium huiusmodi meatus ad inuicem & velox consolidatio ipsarum: secunda causa est, ut infans non laedatur ab aëre frigido, qui adueniret ad ventrem eius per concauum umbilicum., Me autem legere apud veteres, quod ob haemorrhagiam secuturam umbilicus deligandus sit, non memini. Quin tamen & veteres haemorrhagias umbilicales viderint, dubitari non

<sup>b)</sup> Canon. L. I, Fen. III. Doctr. I. fol. 32. ed. Venet. 1547. f.

non potest, vel ideo, quod non tam diu plerumque videantur expectasse, donec haemorrhagia metuenda non est: quod quidem colligo ex hoc HIPPOCRATIS <sup>c)</sup> loco, consuetudinem limitante, scilicet: „si fetus in naturalibus haereat, nec facile exeat, sed cum labore, nec sine medici ope, huiusmodi fœtus, quum pauci sint temporis, his non ante abscindendus est umbilicus, quam urinam reddiderint, sternutarint, aut vocem ediderint, sed sinendi sunt. „

## II.

*Recentiorum ab aliquot retro saeculis de umbilico & placenta opiniones.*

Inde vero ab aliquot saeculis nouissimis non haemorrhagiae solum umbilicalis fusc permulti scriptores meminerunt, verum etiam docuerunt, quo modo umbilici deligatio instituenda esset. Voluerunt scilicet, ut nec nimis stricta, nec nimium laxa esset ligatura, ne in alterutro casu haemorrhagia sequeretur, sicuti v. g. statuunt PARAEVS <sup>d)</sup>, FABRICIVS HILDANVS <sup>e)</sup>, P. DIONIS <sup>f)</sup>.

A 2

In.

c) l. de superfoet. p. 225.

d) Opp. L. XXIII. Cap. 17. p. 686.

e) Obs. C. I. § 2.

f) Oper. D. II.

Indeque factum est, ut sine omni haesitatione, mortem absolute subsequutam esse, dicerent simul, atque funiculum solutum, nec deligatum, conspicerent in infante, neque anatomem infantis instituerent g).

Solam etiam placentae cum infante nato cohaesionem, veterum castra sequentes, recentiores etiam, nociuam esse, declararunt. BOHNIVS <sup>h)</sup> enim: „Metuendum simile „quid, inquit, a placenta, mox simul cum „fetu excussa, ab hoc tamen minus tempestive seu non illico sequestrata: dum haec „vitalitate maximam partem orbata, & tantum non cadauerosa, non, nisi cruorem grumescentem, nihilque vitalitatis ac virium „illi concedit, quin potius aliquid corruptellae suae inchoatae impertitur. „ HEBENSTREITIVS <sup>i)</sup> autem: „Haec chorda, inquit, absque nascentis periculo, nec indiuulsae & placentae uterinae continua — diu manere potest. „ Contingere vero etiam hae-

g) Cf. e. c. G. BVDÆI *misc. med. pr. & for. an.* 1731. *cas.* 34. p. 106. de anno 1679. an. 1732. *cas.* 12. p. 51. & *cas.* 31. p. 119. P. AMMANNI *med. crit. cas.* 69. n. 4.

h) *De letalit. vuln. disp. adi.: modi natum enecandi* p. 381.

i) *Anthropol. for.* S. II. M. II. C. II. §. 32. p. 417.



haemorrhagiam posse, si placenta cum fetu  
 connexa maneret aliquamdiu, non dudum  
 MARHERRIVS <sup>k)</sup> docuit, dum: „Et déni-  
 „que quando fetus, inquit, vna cum mem-  
 „branis & placenta simul in lucem editur,  
 „etsi membrana placentae integra sit, tamen  
 „sanguis ex placenta exsudat, & fetus perit,  
 „atque sanguine inanis reperitur, obseruan-  
 „te DENYSIO, nisi funiculus vmbilicalis  
 „ligetur, sicque impediatur, ne arteriae vm-  
 „bilicales sanguinem vltra ad placentam a  
 „fetu transferant. Hinc omnes fetus, qui  
 „vna cum placenta in lucem eduntur, illaesa  
 „licet placenta, licet integro relicto vmbili-  
 „cali funiculo certo pereunt, nisi is ligetur,  
 „non tamen pereunt adeo certo. — Hinc  
 „mirum est, haesitare quosdam in deciden-  
 „dis casibus criminalibus, dum quaeritur,  
 „vtrum eiusmodi infantes omissione fuerint  
 „occisi. „

### III.

*Inde a nostri saeculi initio negarunt vmbil. deligat.  
 necessitatem FANTONVS & SCHVL-  
 TIVS. Huius argumenta.*

Quamuis autem, haemorrhagiam per  
 vmbilicum contingere, fere in vulgus notum

A 3

esset,

<sup>k)</sup> *Praelect. in H. Boerhaave instit. med. T. III. p. 609.*

esset, atque obstetrices feminae quotidie simile quid obseruarent, totque etiam exstarent tristem casuum exempla, ut eas excitare operae pretium non sit: fuere tamen, qui, eam non ubique omnino contingere, docerent, atque obseruationibus comprobarent. Igitur, quum antea, umbilici deligationem absolute necessariam esse, statuerent, tum non defuerunt, qui hanc sententiam oppugnarent, quos inter primus videtur fuisse FANTONVS <sup>1)</sup>, medicus Italus, ad finem saeculi praecedentis clarus anatomicus. Docuit idem, infantem, iam natum, a conuoluto embryonis situ se vindicare, ut sanguis recto nunc ductu in eos hypogastricos ductus subeat, qui per arteriam umbilicalem rotundo quidem, sed satis certe acuto angulo, contra se ipsum redibat. Atque in eo rationem quaefuit, quod arteriae umbilicales iam nati infantis nullum iam sanguinem acciperent, unde & haemorrhagiae metus nullus esse deberet.

Secutus est *I. H. SCHVLZE*, *V. Cel. m)* qui varia protulit argumenta, quibus, non esse

<sup>1)</sup> *Anatom. C. H. p. 261.*

<sup>m)</sup> *D. de vasis umbilicalibus natorum & adultorum. H. 1733. d. qua problema: an umbilici deligatio in nuper natis absolute necessaria sit? in partem negativam resolvitur. H. 1733.*



esse necessariam funiculi vmbilicalis deligationem, comprobaret.

Itaque I. per vmbilicalem venam haemorrhagiam contingere posse, ideo negauit, quia sanguis inde ab exterioribus ad interiora moueretur, neque in amputationibus de venis ligandis quis esset sollicitus <sup>n</sup>).

II. Arteriarum autem fines, cum vena contrahi, retrahi, acuminari, claudi & aboleri <sup>o</sup>).

III. Bruta inter & homines eandem obtinere rationem, idem periculum adesse in brutis, quae pedibus vix nata insistant, matres in admordendo funiculo non festinare, vt in brutis praesidium, ex morfu quaesitum, euanescat <sup>p</sup>).

IV. Exempla, ad confirmandam deligationis necessitatem producta ab aliis, examini subiecit, atque, ea ita esse comparata, contendit, vt ob rei adiuncta desideranda vix possint argumentum confirmare, quare easdem alia ratione ex-

A 4

pli-

<sup>n</sup>) D. an deligat. necess. §. 4.

<sup>o</sup>) l. m. c. §§. 3. 9.

<sup>p</sup>) l. c. §§. 5. 6. 7.

plicauit, vt vel a calore balnei, vel a vitio obstetricum, a commotionibus sanguinis, cet. repeteret haemorrhagiam *q*).

V. Adduxit exempla, vbi haemorrhagia quidem consecuta est, sed sisti facile poterat neque fetui exitiosa fuit *r*).

VI. Exempla attulit, vbi nulla haemorrhagia secuta est, quamuis minor vmbilici pars esset abrupta *s*).

VII. Millies millena exempla quotannis natorum & viuentium animalium exstare, quibus vmbilicus non fuerit ligatus.

VIII. Placentam etiam, fetui connexam, nocere non posse, quae non adeo putrescat, nec statui posse, sanguinem amplius illuc esse abiturum, nisi in corpore plethorico & plethorâ commota: quum in parte frigida stagnare sanguis debeat.

Tandem: „Ceterum repeto, inquit, quae dixi & protestatus sum, *me non contendere,*  
„*vt*

*q*) l. c. §§. 10. 11. 12.

*r*) l. c. §§. 14. 15.

*s*) l. c. §§. 16. 18.

„ut in natis hominum umbilici deligatio in  
 „posterum omittatur <sup>1)</sup>“. „

## III.

*Qui secuti sint hos.* WERLHOFFI,  
 SCHWEICKHARDI, ROEDERERI, ar-  
 gumenta.

SCHVLZIVM secuti sunt plures viri  
*Cel.*, VIELLERVS<sup>u)</sup>, TREW<sup>x)</sup>, SCHAELEY),  
 SCHWEICKHARD<sup>z)</sup>, PLATZIVS<sup>a)</sup>, &  
 nuper P. FISCHERVS<sup>b)</sup>: quibus addi pos-  
 sunt obstetrices clari, LA MOTTE, ROEDE-  
 RER, BURTON, FRIEDIVS, STEINIVS,  
 WHITE, DE WIND, CAMPERVS, alii:  
 qui & obseruationes & argumenta protule-  
 runt,

1) l. c. §. 21.

u) *Comm. litter. Norimb. 1733. hebd. 48.*

x) *Ibid. 1733. ad ann. 1738. & d. epist. de differ. quibusdam inter hominem natum & nascendum intercedent. Norib. 1737.*

y) *De F. V. deligatione non absolute necessaria. Prael. ROEDERERO, in cuius Opp. P. II. exstat.*

z) *d. sistens obseruationem de non necessaria F. V. deligatione. Argent. 1769.*

a) *pr. de non absol. mortifera F. V. intermissa deligatione. L. 1774. (pertinet ad d. Cl. REDLICH de submers. resuscit.)*

b) *d. an deligatio F. V. in neonatis absolute sit necessaria? Ingolst. 1777.*

runt, ut non esse necessariam vmbilici deligationem probarent.

Itaque argumenta aestimaturi audiamus primo Cl. BVCHWALDVM, WERLHOFFIVM, & Cl. SCHWEICKHARDVM, qui respirationem primam dixerunt efficere, ut haemorrhagia impediretur. Et quidem Cl. BVCHWALD <sup>c)</sup>, occasione monstri, necessitatem deligationis negavit, quod impetus sanguinis in vasa vmbilicalia respiratione imminueretur, & sanguis facilius subiturus esset cruralia vasa, quam ex iliacis sub acuto angulo oriunda vmbilicalia. Deinde WERLHOFFIVS <sup>d)</sup>, thorace magis dilatato, abdominisque cauo in eadem proportionem decrescen- te, diaphragma, hepar, & reliqua abdominis viscera, deprimi, hinc omnia abdominis vasa, comprimi, & sanguinis impulsui, ad haec loca imminuto, insignem nasci resistantiam, edixit. SCHWEICKHARDVS vero <sup>e)</sup>, qui obseruauit, pulsum in arteriis vmbilicalibus post aliquot horae minuta cessare, dum

vm-

c) *Prodrom. praen. contin. acta medica Hafniensia.*  
Hafn. 1753. 4. p. 28. cf. *Vogels n. med. Bibl.*  
I. 98.

d) *Comm. litt. Norimb. ann. 1734. hebdom. 45.*

e) d. c. ad n. 2).

umbilicum non prius solueret, quam placenta etiam esset producta, atque in loco solueret, vbi iam cessauerat pulsus, nullam consequi haemorrhagiam, licet deligatus non esset umbilicus, atque infans in aqua calida detineretur, (qualia exempla plura obseruasse FRIEDIVM, V. Cel. refert) causam in eo quaerit, quod annulus umbilici tendinosus respiratione, atque musculorum in primis abdominalium actione, constrictus, sanguinis influxum cohiberet.

ROEDERERVS *f*) deinde cum SCHAELIO ad directionem vasorum in primis mutatam respexit. Nimirum artieriarum ymbilicalium in nuper nato infante ita mutari directionem statuit, vt, quum fetus in rectitudinem expanderetur, angulus artieriarum iliacarum valde acute retrogradus efficeretur, eo, in primis in homine, effectu, vt sanguinis in ymbilicales artieras, nunc etiam inter abdominis viscera & musculos pressas, per respirationem, tanta impulsioni nasceretur resistentia, vt vel nihil omnino, vel parcissima solum copia, istas superare angustias posset. Hinc pulsus in umbilico deficere, ita, vt primum in parte, placentae proxima,

*f*) l. c. ad n. y).



ma, euanescat, sensimque idem infanti proxime fiat. Itaque si umbilicus in illo loco abscinderetur, ubi pulsus iam defecit, nullam omnino consequi haemorrhagiam, quod idem saepius se obseruasse dicit.

Haud multo post etiam *de WIND*, *V. Cel.*, *Batauus* g), hanc quaestionem mouit, atque dictis consentanea protulit, in cuius partes transiit nuper *CAMPERS*, *V. Cel.* h), ut tamen adderet, pulsum artierum umbilicalium, post infantem natum, plerumque tam diu continuare, donec deligatio fieret, quum euanesceret e contrario pulsus, quando placenta simul esset excussa i). Ille tamen fassus est, contingere interdum exitiosam haemorrhagiam posse, quando umbilicus solueretur ante, quam pulsus euauit, in primis in infantibus, qui gaudent umbilicali funiculo *crasso*, quod quidem obseruationibus comprobauit: *hic* vero,

g) In tract. qui inscribitur: *De vraag, is het niet afbinden der Navelstreng, volstrekt doodelyck voor een eerst geboren Kind, onderzocht en beantwoord door Paul. de WIND. Middelb. 1757.*

h) *Abh. v. d. Kennzeichen des Lebens v. des Todes bey neugebornen Kinderñ, a. d. Holländ. Frcf. u. L. 1777. 8.*

i) l. m. c. p. 95 sq.



vero, tunc de haemorrhagia iudicari in fetu posse ex vasorum vacuitate, contendit <sup>k)</sup>).

Medicinae vero forensis scriptores, postquam non ubique consequi haemorrhagiam ex umbilico cognouerant, tum modo, infantem haemorrhagia umbilicali decessisse, dixerunt statui posse, quum vasa maiora & cor sanguine orbata conspicerentur; ut monuerunt TEICHMEYER <sup>l)</sup>, C. VATERVS <sup>m)</sup>, ALBERTI <sup>n)</sup>, G. C. DETHARDING <sup>o)</sup>, BOHNIVS <sup>p)</sup>, HEBENSTREIT <sup>q)</sup>, FABRICIVS <sup>r)</sup>, ESCHENBACH <sup>s)</sup>, KANNEGIESSER <sup>t)</sup>, BÜTTNER <sup>u)</sup>, ADOLPH <sup>x)</sup>, alii.

## V.

k) l. c. p. 97 sq.

l) *Med. legal.* Cap. XXIV. p. 235.

m) *d. de infanticid. imputat. signis diagnosticis. Viteb.* 1722.

n) *De F. V. neglecta allegat. in causa infanticid. limitanda.* H. 1731. in *I. M. T.* II.

o) *d. de cautione circa infanticid.*

p) l. c. p. 368.

q) l. c. p. 420. 422.

r) *Med. Resp. cas.* I. 5. II.

s) *M. L.* §. 141.

t) *Inst. M. L.* §. 546.

u) *Vom Kindermorde*, §. 75. p. 88. rel.

x) *d. de infant. not. sect. legali detegend.* Helmst. 1764. §. 6.

## V.

*Argumenta a Cl. FISCHERO proposita.*

Nuper quoque contra necessitatem deligationis funiculi vmbilicalis proposuit Cl. FISCHERVS argumenta, quae huc redeunt:

I. In brutis aequae, atque in hominibus, haud raro solui vmbilicalem funiculum, nec tamen sequi haemorrhagiam, saltem non eam, quae exitiosa fetui sit y).

II. Haemorrhagiam quidem diu satis post partum contingere, comprobantibus observationibus, eandem tamen potius sequi ob naturae defectum & sanguinem morbose constitutum, hinc eundem & aliam in adultis, & pueris, viam sibi parare, saepius vero eam non magni momenti esse z).

III. Exstare quidem observationes, quae pro ligatura militent, quarum plures adducit a); nec tamen haemorrhagiam sequi, nisi funiculus vmbilicalis citius soluatur, quam pulsus in eodem deficiat,

y) l. c. §§. V. VI.

z) l. c. §§. VI. VII.

a) l. c. §§. VII. VIII.

ciat, id quod obseruationes comprobarent adductae <sup>b)</sup>).

III. Haemorrhagiam sequi ob impedimenta, respirationis negotio opposita, hinc ob pectoris compressiones, fasciae ligaturam, atque omnia, quae nouum aëris elementum rarius redderent, vt ignis, calor <sup>c)</sup>. Prouocat in primis ad B A V-DELOCQ VII, V. Cel. obseruationem, qui, respirationem varia ratione impediendo, id effecit, vt sanguis iteratis vicibus per vmbilicum stillaret, & denuo ad lubitum experientis cessaret <sup>d)</sup>. Hinc concludit: „Ex intempestiuo in-  
„uoluendi & tenella corpora compri-  
„mendi exercitio patet denique gene-  
„ralis funiculum deligandi consuetudo,  
„non quod per se, sed propter peruer-  
„sam neonatos tractandi methodum ne-  
„cessaria sit, vt grauiora pericula auer-  
„tantur <sup>e)</sup>. „

V. Fetus plerumque alia perimi ratione, iudicesque minus caute agere, dum inter-

<sup>b)</sup> l. c. §§. IX. X.

<sup>c)</sup> l. c. §. XI.

<sup>d)</sup> l. c. p. 9. §. V.

<sup>e)</sup> l. c. §. XI.

remissam vmbilici ligaturam. accusant,  
 quod plura dentur partum enecandi me-  
 dia, male a iudice saepius neglecta *f)*;  
 vbi & haec *g)* occurrunt: „Illud tan-  
 „tum mirandum est, quod in manifes-  
 „tis laesionibus, vbi simul ligatura fu-  
 „niculi deficiebat, maior semper huius,  
 „quam illarum ratio habita fuerit, &  
 „adhuc dum habeatur. Sic v. g. *Cl.*  
 „DANIEL in aliquo casu *h)* neglectam  
 „funiculi ligaturam male accusat, dum  
 „vulnus simul collo cum laesione caro-  
 „tidis inflictum erat. Insuper habitis  
 „haemorrhagiis, quae ex vmbilico  
 „fiunt caussis, in infante, ceterum su-  
 „gillationibus notato, intermissae deli-  
 „gationi mortem tribuit *i)*. Alio loco  
 „placentam a partu non separatam cul-  
 „pat *k)*, dum tamen contusio, in occi-  
 „pite obuia, causam mortis abunde te-  
 „statur; & sic plura: nam ex vasis ab-  
 „dominalibus, minus sanguine repletis,  
 „& ex funiculo non vincto, etsi capitis  
 „con-

*f)* l. c. §§. XII. XIII.

*g)* l. c. p. 28. §. XIII. & not. e. f. g.

*h)* Resp. cas. 75.

*i)* ibid. c. 65.

*k)* ibid. c. 67.

„contusio observata sit, ad haemorrhagiam letalem concluditur <sup>l)</sup>; partus „similiter ex haemorrhagia funiculi, ob „defectum sanguinis in vasis periisse vi- „debatur, licet sugillatio quoque in ca- „pite obtinuerit <sup>m)</sup>? „ — Ex quibus deinde comprobabo, FISCHERVM *κεντραγγίαν* non habere pro signo haemorrhagiae, quam varia ratione explicat.

VI. Haemorrhagiam non numquam venae sectionis vices supplere, v. c. in capitis incuneatione, aut quum sanguinis circuitus per prolapsum funiculum umbilicalem eiusque circumvolutiones impeditur <sup>n)</sup>).

Ceterum salutarem quidem funiculum deligandi methodum impugnare non adniti- tur: „sed de ambiguitate iuris tantum rem „agi dicit, ne vita infciae matris emortuo fe- „tu simul periclitetur <sup>o)</sup>: atque alibi addidit: „Quibus

l) *ibid.* c. 74.

m) *ibid.* c. 78.

n) l. c. §. XIV.

o) l. c. §. I.



„Quibus omnibus rite perpenſis numeroſae  
 „licet, proſtigatura militantes, obſervationes;  
 „multum de ſuo vigore perdent, quin pau-  
 „cae ſupererunt, quae non ad vnam, alte-  
 „ramue ex ſupra allegatis cauſſam reduci  
 „poterunt, niſi eae forte, quae circumſtan-  
 „tiis minus ſtipatae ex actis criminalibus po-  
 „tius, quam medicis ſuppleri deberent; quod  
 „niſi quis fecerit, nullum inde ſolidum pete-  
 „re argumentum poteſt p).„

## VI.

*Ad auctorum ſ. III–V. argumenta reſpondetur..*  
*De ortu quaestion. an delig. umbil. neceſſaria?*

Itaque ad propoſitum noſtrum propius  
 accedamus. Quid ſibi velint Viri Cl., qui,  
 non eſſe neceſſariam vmbilici deligationem,  
 ſtatuunt, ego quidem non adſequor; niſi  
 enim egregie fallor, ſibi ipsis maxime con-  
 tradicunt. Etenim SCHVLZIVS, ſe non  
 contendere, dixit, vt in natis vmbilici deli-  
 gatio in poſterum omittatur q), atque ipſe  
 ſuorum infantum vmbilicos deligauit r); ne-  
 que adpareret, eum voluiſſe, vt ad medicinam  
 fo-

p) l. c. §. 29.

q) l. c. §. 21. ad fin.

r) ALBERTI I. M. T. VI. praef.



forensem dicta adhiberentur. FISCHERVS autem, qui ad medicinam forensem sua argumenta composuit, non semel sibi contraxit, uti ex sequentibus patebit, ut, quod iam negaret, mox concederet.

SCHVLZII argumenta, Cel. BOEHMERVS <sup>s)</sup> aestimauit, atque ad eadem respondit, hisque ego responsurus etiam sum, dum FISCHERI, *V. Cl.*, argumenta, in primis hic considerata, quorum non pauca communia habent, examini subiicio. Igitur primum de orru quaestionis, vtrum vmbilici deligatio necessaria sit? an secus, quaeritur. Quoniam de vulnerum letalitate olim in primis ex analogia statuebant, inde factum esse puto, ut ex sola analogia, absolute letale vulnus esse vmbilicum non deligatum, absque cadaueris sectione, statuerent, recentioribus vero temporibus putarent, animaduertendum esse ad obseruationes, quae, non vbique haemorrhagiam sequi, docerent, atque ad exemplorum adiuncta, cur fieret in hoc vel illo casu haemorrhagia, cur hic illic deficeret? Sic HEBENSTREITIVS animaduertit, ex longiori funiculo non sequi haemorrhagiam,

B 2

fri-

*s) d. de necessaria F. V. vi vasorum structurae in nuper natis deligatione. H. 1745.*

frigusque impedire eamdem. Sed bene omnino, attendendam esse vasorum in cadaueribus conditionem, num sanguine repleta, an vacua sint? monuerunt V. Cel. adeo, ut HEISTERVS <sup>1)</sup> etiam probe animaduertisset, vel praesente ligatura metui debere, ne facta sit haemorrhagia, siquidem, quo minus ea post hanc iniiciatur, nihil impedit. Adeoque pro ea, quae est huius disquisitionis sollicitae certitudo, in sequentibus comprobanda, admirari satis non possum: cur FISCHERVS, ad quaestionem disquirendam a Cel. de WOLTER requisitus, in eam sententiam, paullo ante prolata, transferit? Sunt vero eius argumenta in primis aestimanda, quoniam quibusdam Viris Cl. bene rem peragisse visus est.

## VII.

*Quaestionem dictam in foro carere utilitate.*

Iam de utilitate quaestionis videamus. Eam quidem nullam esse putō. Namque distinguendum est primum, utrum de utilitate deligationis in obstetricia arte, an in medicina forensi quaeratur? Si *illud*, hodie  
omnes

<sup>1)</sup> d. de summe necessaria inspect. cordis vasorumque maiorum sub legali infantum sectione. Helmst. 1752.

omnes fere medici in eo consentiunt, superuacaneum esse haemorrhagiae metum, quum umbilicus non citius soluitur, quam pulsus defecit, tamen prudentiam poscere, ob accidentia varia, vt umbilicus nihilo secius deligetur; adesse vero non numquam causas, quae haemorrhagiam vellent: sed eadem hoc loco non ad nos. Si *hoc*; id est, in foro, haec quaestio nullius vsus est. Feminam, enim ponamus, clandestinum edidisse partum, vt, infanticida ne fuerit, metuendum sit, iudicemque requirere medicum chirurgumque, vt in mortis causam inquirent. Hos, ponamus, nihil omnino, quod contra naturam sit, in cadauere deprehendere, nisi *κενέαγγλαν*, quam, nullo exstante vulnere, ex haemorrhagia per solutum, nec deligatum, funiculum umbilicalem, factam esse, concludunt. Tum referunt ad iudicem, infantem obiisse ex non deligato umbilico, siquidem, hac ratione, non cohibita haemorrhagia, *άναιμια* inductam esse, statuunt, quae dicenda sit mortis causa. Iam mater, dum pareret, & paullo postea, aut sui conscia fuit, aut secus. Si *posterius*, deligare non poterat umbilicum, quamuis deligatio necessaria, atque de eo etiam mater esset conuicta. Itaque non obstante haemorrhagia letali, si compro-

bat mater, se nec grauiditatem celasse, nec de industria solam peperisse, sed praeter expectationem acceleratum esse partum, ita absoluitur, ut ne culposum quidem infanticidium credatur commisisse. Quodsi grauiditatem celauit, nec comprobare potest, se non de industria solam peperisse, metuendum est, ne infanticidii sit rea: atque culposum infanticidium commisit, si sola de industria peperit, licet comprobet, se sui consciam non fuisse. Si *prius*, id est, si sui conscia fuit, *aut*, deligationem necessariam esse, mater intellexit, sed eandem neglexit, ea intentione, ut haemorrhagia obiret infans, adeoque infanticidium *dolosum ex intentione directa* commisit; *aut*, deligationem negligens, mortem infantis noluit quidem, eandem tamen sequi posse, non ignorauit, hinc infanticidium *ex intentione indirecta dolosum* <sup>u)</sup> commisit; *aut* ignorauit, deligandum esse umbilicum, hinc, si grauiditatem celauit, vel de industria sola peperit, infanticidii *culposi* rea est, *aut* nec grauiditatem celauit, nec consilio sola peperit, & vestigia adsunt sollicitudinis matris, conseruandi vitam infantis, quantum pro rei adiunctis lice-

bat;

<sup>u)</sup> Cf. *perill.* NETTELBLADT d. de homicidio, ex intentione indirecta commissio. §§. 27. 29.



bat, adeoque *casuale* adest infanticidium. Quid igitur, obsecro, iuuat hic quaestio, an necessaria sit deligatio vmbilici, qua certe in nullo casu opus est? Sufficit enim in his omnibus certitudo, infantem obiisse haemorrhagia. Adeoque Cl. viri argumenta debuissent contra hanc certitudinem proferre, quum animus erat, ostendendi, matres posse infanticidii iniuste accusari. Itaque FISCHERI argumenta, quorum aliqua possint facile eo duci, examini liceat subiicere, atque aliorum simul V. Cl. attendere animaduersiones.

## VIII.

*Respondetur ad FISCHERI argum. I.*

*Ad I. argum. FISCHERI.* Ad hoc argumentum respondeam, non opus est, siquidem in foro non ex analogia decidenda est quaestio, an *forte* (infidum enim semper esset iudicium) fetus haemorrhagia perierit, nec re? sed ex effectibus, in cadauere perscrutandis. Nullus enim iudex quaestionem propositurus est, absente corpore delicti, aut ad sectionem inepto, vtrum haemorrhagiâ perierit infans: quod si fieret, vtilitate non carere. — Liceat tamen animaduvertere,

plures dari obſervationes, ab ipſo FISCHE-  
RO partim excitatas, quae comprobent le-  
talem haemorrhagiam vmbilicalem, quam  
contrariae. Et, ſi FISCHERVS cum  
SCHVLZIO obſervationes poſitiuas expli-  
cat per calorem, rel., negatiuas certe per fri-  
gus, rel., explicare licebit. (Frigus enim  
haemorrhagiam impedire, V. Cl. obſerua-  
runt, hinc potius metuendum eſt, ne per-  
actum infanticidium lateat; e contrario im-  
punis mater non culpatur). Et *brutorum*  
ratio quid ad nos? Praeterea negligi non  
poſſeſt BERENGARII <sup>x)</sup> teſtimonium, qui  
equorum etiam & aſinorum pullos periſſe  
vidit, quibus vmbilicales funiculi reſecti  
erant. Et ſi, ZELLERO <sup>y)</sup> potius confi-  
dendum eſſe, quis putet, qui negat bruta  
haemorrhagiâ perire; notandum tamen eſt,  
animalium funiculos ante partum flacceſce-  
re, parumque continere ſanguinis<sup>z)</sup>, vt igitur  
diuerſa adſit inter hominem & bruta  
conditio. — Et quod homines attinet, ſi  
FISCHERVS vult, non ſequi haemorrha-  
giam, quum vmbilicus poſt deficientem ar-  
teriarum pulſum diſcinditur, rem vltro con-  
cedi-

<sup>x)</sup> In MVNDINVM p. 261.

<sup>y)</sup> *Vita humana ex fune pendens*, Tüb. 1692. p. 11. 12.

<sup>z)</sup> PLAZ l. c. p. 8.



cedimus, si alia ratione, negamus. Hinc bene BÜTTNERVS <sup>a)</sup>: „Die Anmerkungen, – nach welchen der Nabelstrang abgerissen, und davon doch keine Verblutung erfolgt, indem fast nichts oder wenig Blut ausgeflossen ist, beweisen deutlich, daß schon zu der Zeit der Umlauf in den Nabelgefäßen gänzlich aufgehöret gehabt:“, rel. Certe nihil ultra.

## VIII.

*Respond. ad FISCHERI argum. II.*

*Ad II. argum. FISCHERI.* Ex morbose constituto sanguine haemorrhagiam sequi per funiculum vmbilicalem non deligatum quomodo probat V. Cl.? Quod aliae etiam obseruentur haemorrhagiae in pueris atque adultis! Obseruationes adductae ita sunt comparatae, vt nullam omnino vim habeant. Namque si tardius secuta est ex vmbilico haemorrhagia, vt in exemplo BARTHOLINI, non spectat ad fetum iam natum, si post annum tumor in vmbilico ortus, vt in exemplo, a MAURICEAU adducto, aut tumor ortus est die septimo, vt in WAGNERI exemplo, aut frictione die septimo

B 5

op.

<sup>a)</sup> De infantie. §. 75. p. 88.

producta est haemorrhagia, ut in KRAMERII exemplo, tum aliunde de vita infantis & mortis causa constat, atque tumor in cadauere exstabit, rel. Quid haec ad fetum mox natum? Et si vel rite probasset V. Cl., tamen morbosa haemorrhagia in nuper nato infante, huic exitiosa, deligatione impediri poterat, ut fetus superesset. Nisi enim tanta fuit haemorrhagia, ut fetus moriretur, in foro hac de re quaestio non erit. Quod si tanta fuit, ut periret fetus, mater omnino non absque ratione infanticidii suspecta, ream habebitur.

## X.

*Respond. ad argum. III. FISCHERI.*

*Ad III. argum. FISCHERI.* Nisi citius soluatur umbilicus, quam pulsus articularum umbilicalium <sup>b)</sup> deficiat, haemorrhagiam

- <sup>b)</sup> Non raro arteriae umbilicales ex ipsa aorta oriuntur, cuius ortus signum infallibile praebet obstetrici pulsus diu continuatus in umbilico, ubi in primis deligationis congruae requiritur solertia teste CL. STEIN (*theor. Auleit. z. Geburtsh.* ed. II §. 343.) In hoc igitur casu facilius procul dubio haemorrhagia contingit; nec tamen inde excusatio peti posset, licet idem cadaueris sectione pateret. Sed illustrat haec observatio, quamvis in vniuersum haemorrhagiam umbilicalem non mitiget,

giam non sequi, non pertinet ad medicinam forensem. Tamdiu enim si mater expectauit, ut pulsus deficeret, en! concedamus nullam fieri haemorrhagiam; tum supererit fetus, neque in quaestionem criminalem incidet mater. Si citius soluit, ut sequeretur haemorrhagia, quid tum, quaeso, iuuabit aestimare, haemorrhagiam non fuisse secuturam, si diutius expectasset? Non expectauit, igitur videndum, num mater dolose, an culpose egerit, an casuale sit infanticidium? Atque ipse V. Cl.: „Enimuero „praeualente vita fetus, inquit, si funiculus „iusto maturius secetur, haemorrhagias sequi, quis inficias ibit? — Sed potissima, „quae de haemorrhagiis exempla circumferuntur, partim imprudentiae, partim praematurae funiculi sectioni attribuenda videntur c). „ Nimirum bene quidem, quid inde? — Id, inquam, sequitur, ut in sectione cadaueris attendatur, num vasa sanguine turgida, an exhausta sint? siquidem, vtrum iusto citius resecto vmbilicali funiculo haemorrhagia secuta sit, an secus? inde concludi potest.

## XI.

*Respond. ad argum. IIII. FISCHERI.*

*Ad IIII. argum. FISCHERI.*

Quemadmodum semper a particulari ad vniuersale male concluditur, ita profecto hic etiam factum est. Namque V. Cl., enunciationi, ex vna obseruatione ductae, haemorrhagiam sequi ob impedimenta, respirationis negotio opposita, plures repugnant obseruationes. Quamquam enim, si haemorrhagia per respirationem peractam vere impediretur, vt voluerunt WERLHOFFIUS, SCHWEICKHARDVS, ALII, videri potest, haemorrhagia per impedimenta respirationis contingere debere: tamen, haec attendantur, oportet. 1) Dantur casus, vbi haemorrhagiae, ex vmbilico non deligato factae, iure meritoque mors adscribenda est, nec tamen respiratio fuit impedita, sed libere potius respirarunt, donec respiratio ob inductam *αναιστειαν* tolleretur, neque aderant in cadaueribus signa suffocationis, aut alius laesionis d). Imo in mortuo respirationem, aëris

d) v. g. ALBERTI I. M. T. I. app. cas. 4. T. IV. 2. T. V. 7. T. VI. 4. *Acta Med. Berol. Dec. I. Vol. IV. p. 87. FABRICII R. ed. nov. cas. I. §. II. BÜTTNER I. C. cas. 6. 31. RUEF V. Cl. R. p. 57.*



aëris inflatione imitatus est *Cel.* CAMPE-  
 RV S <sup>e)</sup> eo euentu, ut per vmbilicum san-  
 guis, ad concretionem pronus, magno im-  
 petu efflueret. 2) Suffocati sunt, neque se-  
 cuta est haemorrhagia ex vmbilico non de-  
 ligato <sup>f)</sup>: atque huc pertinent exempla fe-  
 tuum, frigore enectorum <sup>g)</sup>; quamuis de his  
 dubitari liceat, dum haemorrhagia quoque  
 per frigus impeditur. Aut certe diu post  
 partum non respirarunt, neque secuta est  
 haemorrhagia: quorsum referri possunt  
 BOHNII <sup>h)</sup> exempla. Neque etiam, ubi  
 de infanticidio quaestio est, facile intempesti-  
 uum natum inuoluendi exercitium adest: ple-  
 raeque enim matres ne cogitarunt quidem de  
 indusiis aut fasciis, imo sunt, quae indusia,  
 rel. pararunt quidem, ac secum portarunt,  
 verum tamen infanticidium commiserunt, ut  
 excusationis modo caussa parasse videantur.  
 Praeterea inuoluendi infantem mox natum  
 exer-

e) V. d. Zeichen des Leb. und Todes. p. 87.

f) ALBERTI l. c. T. I. P. II. cas. 6. T. II. 4.  
 T. VI. 8. RICHTERI *decis. for.* p. 262. BÜTT-  
 NER l. c. cas. 22. 24. 25. 27. 30. 35. 36. 84.  
 rel.

g) ALBERTI l. c. T. III. cas. 12. 13. FABRI-  
 CIVS l. c. cas. 9. BÜTTNER l. c. c. 41. DA-  
 NIEL l. c. c. 79.

h) l. c. p. 355. circ. anat. phys. p. 40.

exercitii defectus considerari potius potest: tamquam causa haemorrhagiae, siquidem esset potius sanguis ad pedes abiturus, quam ad umbilicum (si infantes obvoluendi mos consideratur), non renuente HAL- LERO: „Ita umbilicales grandissimae arte-  
 „riae, dicente, ob insignem; quem cum *extenso*  
 „*puero* intercipiunt anfractum, continuo san-  
 „guinem desinunt suppeditare i). „

Ipse etiam V. Cl. egregie sibi contra- dixit, dum statuit, respirationem cohibitam efficere haemorrhagiam ex umbilicali funi- culo non deligato, nec tamen minus *Lipsien- sibus* adsentit, qui in casu quodam, ubi in- fans suffocatus erat, haemorrhagiam factam neutiquam ex suffocatione reperierunt, sed omnino negarunt, ex non deligato umbilico haemorrhagiam contigisse, licet cor quidem non omni sanguine vacuum, *vasa tamen in- signiora depleta essent* k). Igitur, FISCHER-

R O

i) El. phys. T. II. p. 187.

k) PLAZ. l. c. p. 10 sq. Me decidendi rationem V. Cl. non adsequi, fateor. Namque *νεκρωγία*, cuius ope decidendum erat, refertur ad rationes dubitandi. E contrario rationes decidendi eadem fere sunt, ac FISCHERI argumenta. Negant enim haemorrhagiam factam esse, quia: „die Nabelschnur  
 „einer Handbreit annoch an dem Kinde gehan-  
 „gen,



RO iudice, debuisset haemorrhagia sequi,  
(& vere secuta est), eam tamen cum *Lipsien-*  
*sibus* negat factam esse!

## XII.

„gen, und also dem durch die beiden arterias vmbilicales schießendem Blute, nicht gänzlich ein ungehinderter freyer Abschufs verstattet worden, auch — dennoch, da die Nabelschnur noch einer guten Viertelelle lang an dem Kinde gehangen, deren äußerste Enden sich viel eher und genauer, vermöge ihrer natürlichen zusammenziehenden Kraft verkürzen, auch durch diese Verengerung, den völligen Ausflufs des Bluts gar verhindern können, wie denn auch, daß noch einiges geronnenes Blut in den auriculis cordis befindlich gewesen, — erhellet. Nächst dem, aber auch die unterlassene Unterbindung der N. keineswegs durchgängig, und ohne alle Ausnahme, als eine Ursache einer tödtlichen Verblutung anzunehmen ist. „ Addit, saepius aliquot sanguinis uncias ad promovendam infantis respirationem esse detrahendas. Sed an, quaeso, in concreto, ex analogia adeo vagis argumentis utendum est ad componendam sententiam? Nonne rursum longe ex νεκρωγία de haemorrhagia argumentatur? Num istud sanguinis, in cordis ventriculis contentum, suffecisset vitae vivendae? Nonne infans ἀναίμια periit? Cuius causam haemorrhagiam, & huius, cohibitam esse respirationem, concedamus. Num vero haemorrhagia contigisset, si deligatus fuisset vmbilicus? Latet praeterea, an ea adfuerint suffocationis signa, ut huic mors adscribi possit. An igitur mater omnino absolvenda erat? — Videtur etiam Cl. PLAZIVS haec animadvertisse, siquidem haec proposuit: „Neque etiam hoc a me scripta fuerunt animo, ut in minimum abusum cedant, aut regulae  
„inde

## XII.

*Respond. ad obiectionem.*

Sed obiiciet iam forte quis: in BAV-DELOCQVLI & *Lipsiensium* exemplis videtur omnino ob cohibitam respirationem secuta esse haemorrhagia, atque eadem secuta antea non fuit, quam pater suffocaret infantem, is enim ad quatuor horas vixit incolomis, licet vmbilicus deligatus non esset: igitur, praesentibus in cadauere aut deficientis, aut cohibitae respirationis, & haemorrhagiae signis, dubitari debet, quae mortis caussa sit? Iam vero distinguamus, oportet. Si *respiratio defecit* omnino, vel adsunt signa in cadauere, vel non. Si *prius*, v. g. mucus, fauces, naresque opplens, tum aut impune, aut culposum aderit infanticidium, quatenus, nisi clandestine peperisset mater, mors caueri poruisset.<sup>1)</sup> Quodsi non omnino mors

ex

„inde constituentur, innumeris profecto exceptionibus limitandae.„ Atque haec vera satis sunt, si quid video, atque a FISCHERO merito aestimanda.

- 1) Vtrum dolosum & quale adsit infanticidium, si haemorrhagiam aut directe aut indirecte mater intendit, mors vero partim ex haemorrhagia, quae tamen suffocationis effectus esset, partim ex culposa suffocatione secuta est, Ictis ad determinandum relinquo.

ex sola ea cohibita respiratione intelligitur, sed ex haemorrhagia simul, tunc de hac quaestio erit ratione, supra tradita, ut vel sui conscia mater fuerit, & sciuerit, quae facienda essent, rel., aut secus. Si *posterius*, id est, si impeditae respirationis signa *non adsunt*, tum vel constabit de ratione mortis *ante partum*, &, *κενέαγγισ* praesente, de placentae ante partum solutione, hinc contingente haemorrhagia, indeque sequente morte infantis; vel constabit de mortis ratione *post partum*, quae tum certe erit haemorrhagia vmbilicalis <sup>m</sup>).

Quodsi *suffocatio* potius inducta est, vel mater est causa suffocationis, vel non. Si *prius*, dubitari non potest, quin mortis causa sit, licet haemorrhagia sit effectus suffocationis. Si *posterius*, ut alius infantem suffocet, a quaestione nihilo minus absolui non potest, quare omiserit deligationem? Mors enim partim per suffocationem, partim per haemorrhagiam, potest esse secuta. Et sicuti vinculum, vmbilico iniectum, praesent.

<sup>m</sup>) Casus, ubi respiratio a fune circa collum ducto, aut a frigore cohibetur, hic omitti debent, siquidem tum non possunt adesse signa *ἀναμίας*.

sentibus *νεκρυγίας* signis, matrem a quaestione non absoluit, vtrum ipsi constaret de haemorrhagia, siquidem post peractam haemorrhagiam iniicere vinculum facile potuit, ita etiam hic, ex intentione vel directa vel indirecta eandem omisisse deligationem, non repugnat, & praeterea *δραμία*, vmbilico deligato, non fuisset secutura, ex qua forte potius, quam ex suffocatione, mors intelligitur.

## XIII.

*Respond. ad argum. V. FISCHERI.*

*Ad V. argum. FISCHERI.* Male accusat V. Cl. iudices, medicosque, ad probandam sui ipsius sententiam, siquidem ex quo culta magis fuit medicina forensis, iure meritoque statuerunt summi profecto in arte viri, ex *νεκρυγία* concludi & posse, & debere, ad haemorrhagiam, ex vmbilico factam, nisi adfuerint alia vulnera (& rationes, quae eam factam tunc esse simul negarent) adeo, vt, bene monente HEISTERO <sup>n)</sup>, ne-  
re-

<sup>n)</sup> Dissert. citt. Vel praesente deligatione interdum haemorrhagia contingit, quando nimirum eadem laxior fit; id quod in primis accidit, quum ante deligationem nec sanguis vmbilicalis expellitur, nec humiores gelatinosi ex cellulosa vmbilici dissipantur.



requiratur quidem ligaturae defectus adfit, quum, post haemorrhagiam factam, aut matrem, aut alium hominem umbilicum deligasse, non repugnet. Et sic statuunt l. c. TEICHMEYER, BOHNIVS, ALBERTI, A. VATER, TREW<sup>o)</sup>, BAVMER, G. C. DETHARDING, HEBENSTREIT, FABRICIVS, ESCHENBACH, KANNEGIESSER, BÜTTNER, ROEDERER<sup>\*)</sup>, alii. Sic HEBENSTREITIVS<sup>p)</sup> : „licet exempla „sint, inquit, quae contrarium affirmant, possint- „que multi hoc vulnus pati, – tamen sine „effectu eiusmodi exempla a defensoribus „adducuntur, ubi ipsa sectio legalis euentui „fidem facit, docetque, sanguinem ex infan- „te, veluti ex vacuitate venarum auricula- „rumque & ventriculorum cordis deprehen- „sum fuit, letaliter fluxisse. „

Quodsi iam observationes *b. parentis*, a V. Cl. excitatas, conferamus, eundem V. Cl. a veritate aliena tradere, signisque eidentibus, atque a grauissimis in arte viris stabilitis, iusto minus tribuere, ac *νεσαγγισαν* non agnoscere tamquam signum haemorrhagiae, ex umbilico factae, facile poterit col-

C 2

ligi.

<sup>o)</sup> Comm. litt. Nor. a. 1734. h. 28. p. 220.

<sup>\*)</sup> Cf. STRUVENS recht. Bed. 2 Th. p. 461.

<sup>p)</sup> l. c. p. 420.

ligi. Quod ut pateat, atque simul argumentis FISCHERI, id est, ex analogia petitis, in nostra causa non esse fidendum, elucescat, tum observationum excitatarum loca adducam, tum ex actis, ad quae in primis prouocat V. Cl., ut supra propositus locus docet, ea addam, quae huc pertinent.

## XIII.

*Quaestio est de obs. LXXVI. b. par.*

Itaque in obs. LXXVI. (quae inscribitur: „Von einem leb. geb. Kinde, das an einer Verletzung des Kopfs und Halses, und einer Verblutung gestorben,) haec leguntur <sup>q)</sup>: „Denn der in die linke Seite des Halses gethane Querschnitt, wodurch insonderheit die arteria carotis externa ganz durch und abgeschnitten worden, ist allein so beschaffen, daß sich das Kind davon nothwendig hat verbluten müssen, zugeschwegen, daß auch die unverbundene Nabelschnur zur gänzlichen Verblutung mit beygetragen hat; daher man auch gar kein Blut weder in den Herzkammern, noch Herzohren, noch in den grossen Blutgefäßen mehr angetroffen hat. „Non-  
ne:

<sup>q)</sup> R. l. c. p. 255.



ne igitur inique FISCHERVS contra hanc observationem insurgit? Videtur quidem pro certo adsumsisse, vel matrem ante, quam solueret vmbilicum, collo vulnus inflixisse, vel intermissam deligationem attendendam non esse, siquidem vulnus, collo inflictum, sufficeret inducendae morti. Et hoc quidem cum b. parente facile concedo; at quum toties ex vmbilico, nullo alio simul praesente vulnere, *ἀναμύλα* inducatur, hic omnino tamquam concaussa mortis consideranda erat, omnino non negligenda, siquidem latebat hactenus (quod inquisitione erat discendum) annon mater citius vmbilicum sic soluisset, vt haemorrhagia sequeretur, hac vero nondum absoluta, & tardius succedente, colli etiam vulnus inflixisset (quam quidem sententiam varia comprobant)<sup>r)</sup>? Atque ex actis nihil certi erui potest. Infanticida enim erat callida, in depositionibus admodum inconstans. Sic vmbilicum vnguibus se soluisse, adseuerabat primo<sup>s)</sup>, deinde cultro se soluisse<sup>t)</sup> edicebat:

C 3

de.

r) Quum mater, curru vehens, partum absolueret ita, vt metuens, ne de eo constaret aurigae, genui vtrique insisteret, partusque ingrueret, vbi locus, quo degere volebat, haud multum distabat, non repugnat sententia supra proposita.

s) Fol. 10a Vol. I. Actor.

t) *ibid.* fol. 16.

denique, actis iam ad iudicium supremum, decernendae sententiae causa, transmissis, umbilicum ope catenae, currui adfixae, se soluisse, adnuebat, ut nouum iudicium de eo ab obducentibus <sup>u)</sup> requireretur. Sic etiam e vulnere, collo inflicto, cruorem vix manasse, adseuerabat <sup>x)</sup>, sed alibi <sup>y)</sup> edicebat: „Es blutete freilich, es war ja auch viel Blut: „auf dem Wagen. „ Atque vulnus etiam colli, primum adnuebat, ope cultri esse inflictum, deinde vero, se eius causam esse, negabat. rel. Igitur quaesita eadem, quomodo vulnera inflixerit? respondit <sup>z)</sup>: „Sobald das Kind von ihr gewesen, habe sie: „sich gebückt, das Kind bey dem Kopfe gefasst, ihr bey sich gehabtes Brodmesser aus der Tasche geholet, und mit selbigem die Nabelschnur durchgeschnitten <sup>a)</sup>. „ Deinde <sup>b)</sup> respondit: „Sie habe die Nabelschnur mit dem bey sich gehabten Brodmesser abgelöset <sup>c)</sup>; auch mit gedachtem Messer: „dem

<sup>u)</sup> cf. R. n. LXXVII.

<sup>x)</sup> Fol. 17. Vol. I. Aetor.

<sup>y)</sup> ad art. 112. f. 17. Aetor.

<sup>z)</sup> ad art. 91.

<sup>a)</sup> fol. 71. b. Aetor. Vol. I.

<sup>b)</sup> ad art. 101.

<sup>c)</sup> ad art. 103. 104. 105.

„dem Kinde in den Hals geschnitten, wie  
 „sie es aber gemacht, das wisse sie nicht *d*). „  
 – Tum *e*): „Sie wisse nicht, ob sie die Na-  
 „belschnur zuerst abgeschnitten, *f*) „ & sic  
 „quoque alio loco deposuit *g*). – Neque igitur  
 „certi quid inde desumi potest. Ceterum  
 „quoad iudicium consentiunt praeterea HE-  
 „BENSTREIT *h*) ac BÜTTNERVS *i*), qui  
 „haec proposuit in obseruatione, quae inscri-  
 „bitur: „Obduction eines lebendig gebornen,  
 „und von zerschnittenen Halsgefäßen, und  
 „darauf erfolgter Verblutung schleunig ge-  
 „storbenen Knäbleins: – und 3) nach n. 25.  
 „in den Lungengefäßen, nach no. 19, in der  
 „Leber, Milz und Nieren, und nach no. 20.  
 „in der aorta und Hohlader kein Blut vor-  
 „handen, *sondern sowohl durch die no. 3. of-  
 „fene und unverbundene Nabelschnur, nach  
 „no. 11. durch die zerschnittene Halsgefäße  
 „ausgeschlossen war.* „ rel. Itaque haec  
 „BÜTTNERI obseruatio reprehendenda po-  
 „tius erat, quam illa *b. parentis*, siquidem ibi

C 4

ex

*d*) f. 73. sq.*e*) ad art. 110. R.*f*) f. 74. Aët.*g*) f. Aët. 17.*h*) l. c. p. 424.*i*) l. c. obs. 32. p. 90.

ex vmbilico potius facta esse statuitur haemorrhagia, quam ex vulnere colli.

## XV.

*Et de obs. LXV.*

In obs. LXV. *k)* haec exstant: „b) können auch die hin und wieder zugefügten „fugillationen, ob sie schon an sich nicht tödtlich sind, bey ihrer grossen Schwäche den „Tod mit befördert haben, da zumal der „Kopf bey dem ersten Kinde vorzüglich mit „gelitten hat. Endlich ist auch c) nicht zu „zweifeln, daß die bey beiden Kindern, besonders aber bey dem grössten, wegen der „unverbundenen Nabelschnur vorgegangene: „Verblutung eine der vornehmsten Ursachen „des so bald erfolgten Todes mit gewesen „sey.“ Iam vero secundum „n. 7. hielten „die Gefässe der Leber nur wenig Blut in „sich, wie man denn auch in den grossen „Blutgefässen nur wenig Blut, in dem Herzen aber gar nichts antraf *l)*. „ Iam acta inquisitionalia consulamus, vbi *m)* leguntur: sequentia: „Im Bette, worinn Inquisitinn geschl-

*k)* l. c. p. 219.

*l)* l. c. p. 216.

*m)* fol. 5. Actor. n. 4).



„schlafen <sup>n)</sup>), befanden sich 2. länglichte Fle-  
 „cken, schwarz und getrocknet Geblüte, so  
 „in das Bettuch eingetrocknet war, wie  
 „denn auch selbst auf dem Kissen eben dergl.  
 „eingetrocknetes Blutfleck zu sehen war,  
 „etwā wie eine Hand groß: auch fand man  
 „noch einen Blutfleck.,, Arque alibi <sup>o)</sup>):  
 „Inquisitinn gestand, sie habe an dem mit  
 „Blut bezeichnetem Orte (n. 3.) beyde Kin-  
 „der bald nach einander geboren. Als sie  
 „beyde Kinder gehabt, und mit einem Ein-  
 „legemesser die Nabelschnuren abgeschnitten,  
 „habe sie dieselben zusammen in dasienige  
 „Hembde gewickelt, darinn sie bey der  
 „Section gefunden worden, und in das Bette  
 „an den Ort no. 4. hingelegt, und sey das  
 „Blut so sich im Bette, und auf dem Kissen  
 „befindet, von den beyden Kindern durch  
 „das Hembde; darein sie dieselben gewi-  
 „ckelt, durchgedrungen.,, Porro quæsitæ:  
 „quæ esset mortis caussa? respondit <sup>p)</sup>):  
 „Das wisse sie nicht. Als aber den Mor-  
 „gen nach der Geburt die Kindmutter M.  
 „zu ihr gekommen, habe diese der Inquisi-

C 5

„tinn

<sup>n)</sup> Secunduū *fol. Actor. 22.* post partum non cuba-  
 uit in eodem lecto.

<sup>o)</sup> *Fol. 6. Act. seq.*

<sup>p)</sup> *ad art. 114.*



„tinn gewiesen, daß *viel Blut zwischen bey-*  
 „den Kindern *gelegen*, so aus der Nabel-  
 „schnur gegangen, und habe ihr dabey ge-  
 „sagt, daß sich die Kinder verblutet, weil  
 „sie ihnen die Nabelschnur nicht verbun-  
 „den.,, Alibi 1) vero respondit: „daß den  
 „Kindern *viel Blut* aus der Nabelschnur ge-  
 „laufen, habe sie nicht eher gesehen, als es  
 „ihr die Kindmutter gewiesen.,, Praeterea,  
 se ex ignorantia funiculum non deligasse,  
 illa 2) edixit. Nonne igitur b. parentis iu-  
 dicium rei adiuncta & matris ipsius confessio  
 comprobant? Veriusne iudicium FISCHERI?

## XVI.

*Quaestio est de obs. LXVII.*

In obseru. LXVII. 3) haec leguntur:  
 „Daß aber das Kind durch die am Haupte  
 „erlittene große Gewaltthätigkeit wirklich  
 „zu Tode gebracht sey, ist keinem Zweifel  
 „unterworfen. — Wiewohl selbigen auch  
 „die unterbliebene Verbindung der Nabel-  
 „schnur,

1) Fol. Act. 71. ad art. 115.

2) ad art. 119. 120. f. 72. Act. & f. 44. sic in lecto  
 deposuisse infantes, ne prohiberetur respiratio li-  
 bera, statuit. Igitur ad ergastulum condemnata  
 est ita, ut per octo annos laboribus castigaretur.

3) p. 225. l. c.

„schnur, und verabsäumte Ablösung der  
 „After füglich mit kann befördert haben.“  
 Cor vero & vasa maiora secundum n. 8<sup>z)</sup>  
 sanguine fere erant destituta: aderat ergo *αραι-  
 μία*. — Sed hic nihilo minus, non FISCHERO  
 solum, sed pluribus VV. Cl. respondendum est.  
 Namque fieri non posse, vt ex longiori vmbili-  
 co sanguinis iactura contingat, hinc multo mi-  
 nus ex placenta, siquidem paullo post par-  
 tum pulsus in superiori versus placentam  
 parte in vmbilico deficiat, plures VV. Cl.  
 statuunt: v. g. HEBENSTREIT<sup>u)</sup>, BÜTT-  
 NERVS<sup>x)</sup>, LUDWIG<sup>y)</sup>, PLAZIVS<sup>z)</sup>,  
 Cl. BAVMER<sup>a)</sup>, FISCHERVS<sup>b)</sup>. At  
 enim vero dantur casus, vbi ex longiori  
 etiam vmbilico, v. g. apud FABRICIVM<sup>c)</sup>,  
 & Cl. RUEF<sup>d)</sup> haemorrhagia secuta est:  
 nullam vero plerumque sequi, id ex eo  
 consequitur, quod pulsus ante solutionem  
 iam

z) p. 224.

u) l. c. p. 421.

x) l. c. §. 72. p. 86.

y) §. 259.

z) l. c. p. 10. 11.

a) Med. for. p. 313.

b) l. c. §§. IX. X.

c) l. c. *cas.* 11. p. 93.

d) l. c. p. 46.

iam ibi defecerit; quod scilicet directio vasorum in nuper natis plerumque admodum mutatur; vasorumque fines quodammodo se retrahant, quando abruptus est vmbilicus. Quodsi infans sic conuolutus iacet, vti in vtero, eadem vt sit vasorum directio, atque in vtero fuit, tunc sane, haemorrhagiam per contiguam etiam placentam fieri, non repugnat. Id quod *Cel. CAMPERVS*, qui de ligationis necessitatem potius abnegat, his concedit: „Aber so lange der Mutterkuchen an der Gebärmutter fest bleibt, selbst nach der Geburt des Kindes dauert das Klopfen gemeiniglich bis das Abbinden geschieht.“<sup>e)</sup> „Iam vero si pulsus adest, fieri etiam haemorrhagia poterit: quod quidem confirmant *b. ALBERTI f)*, & *b. MARHERRII* testimonium, supra adductum. Notum est praeterea, haemorrhagias letales sequi, quum placenta ab vtero soluta est, aut alterius gemelli, iam nati, vmbilicus non deligatus erat, ideo scilicet, quod directio vasorum easdem permittat <sup>g)</sup>. Ac profecto non

e) l. c. p. 96. Atque exinde explices, cur obstetrices, vt *LEVRETVS* (Acc. p. 210.), hodie etiam vmbilicum non esse citius ligandam moneant, quam infans respirauerit.

f) d. c. §. VII.

g) Cf. v. g. *HEISTERI* anat. pag. 270. *DENYS* apud *TREW chyl. fet.* p. 18. *Eph. N. C. Vol. I.* obs.

non video, qua ratione observata in hoc casu *κενεαγγυλα* cum signis respirationis explicari possit. Etenim ex soluta ante partum placenta, quorsum plures facile concludunt, hic tamen *κενεαγγυλα* explicari nequit; quum non intelligatur, quomodo fetus, haemorrhagiâ iam debilitatus, (nisi mortuus) sub laborioso tum quoque partu natus, respirare etiam potuisset? Sane tum capitis vi non fuisset opus <sup>h)</sup>. Itaque, me quidem iudice, illi potius errant, qui placentae cum fetu cohaesionem habent pro signo, aut debilem, aut mortuum natum esse fetum, ut statuit v. c. BÜTTNERVS <sup>i)</sup>; in quo consentit etiam ALBERTI <sup>k)</sup>; atque exempla sunt, secundas diu prodiisse ante fetum absque malo <sup>l)</sup>.

## XVII.

*obs. 65. p. 184. HALLERI el. phys. T. VIII. p. I. pag. 249. MORGAGNI de sed. & caus. morb. ep. XLVIII. art. 5. 6.*

<sup>h)</sup> Acta consequi non potui, id quod doleo. Sed recordor, matrem infantis fassam esse, se causam esse mortis infantis viui. Adeoque idem quum interpretamur in primis de capitis vi, tum patet omnino, matrem, quae cupiebat mortem infantis, non oportuisse, vim inferre fetui, quum debilis esset natus, cui tanten & respirationis signa contradicunt.

<sup>i)</sup> l. c. cas. 50. 59. 63.

<sup>k)</sup> d. de F. V. delig. §. VII.

<sup>l)</sup> HALLERI *el. phys. T. VIII. p. I. p. 247.*



## XVII.

*Resp. ad obs. LXXIV.*

Iam redeamus ad observationes. Itaque porro in excitata observat. LXXIV. (quae inscribitur: „Von einem lebendig gebornen Kinde, das an einer Kopfverletzung und Verblutung gestorben,) „sequentia leguntur: „Es ist im geringsten kein Zweifel, dass: „der Tod diesem Kinde durch die am Kopfe erlittene grosse Gewalt sey zugefügt worden. – Doch kann auch da die Nabelschnur unverbunden gewesen ist, und die Blutgefäesse nur wenig Blut in sich gehabt, der Tod durch einigen Blutverlust zugleich mit seyn befördert worden <sup>m</sup>). „ Atque sub no. LXXV. ad quaestionem responderunt, essentne haec capitis vulnera letalia? Acta etiam inquisitionalia consului, sed res est incerta. Nimirum callida mater, primo partum negans, deinde, abortum se passam esse fingens, denique, se peperisse statotempore, adnuens, vix videtur per totam inquisitionem vera protulisse. Atque eadem vix in carcerem coniecta, medicinae studiosus, eadem antea cum illa in domo degens, anxius ita se gessit, ut videretur idem non inique:



inique in quaestionem esse ducendus; sed post aliquot dies subito & clam abierat. Infanticida autem praeterea, quod in depositionibus admodum vacillaret; ante, quam ad articulos supraadditionales, quos vocant, respondisset, iam diu animi moerore & perturbatione afflicta, obiit. — Igitur ita sedens sola partum edidisse, edixit, ut fetus in vasculum suppositum capite caderet <sup>n)</sup>. Funiculum primo, statim ipsam soluisse, adnuit <sup>o)</sup>, sed deinde <sup>p)</sup> edixit, se paullo post partum incidisse in lipothymiam, quâ demum absoluta, fetu iam mortuo (qui respirauerat antea, ipsâ fatente) funem praecidisse. — Sed callida mater videtur intellexisse, fore, ut iudex quaestionem moueat, an sanguis ex soluto vmbilico manauerit? Hinc forte responsum mutauit. — Sed ponamus etiam, matrem funem non citius soluisse, nisi fugatâ lipothymia, ac fetum tunc mortuum fuisse: nihil tamen impedit, quo minus, qui potuerit ex vmbilico non deligato haemorrhagia sequi, intelligatur. Etenim primo *Cel.*

CAM.

<sup>n)</sup> *Fol. 7a Vol. I. Act. & resp. ad artic. 72. 73. 77. 79. 80. 90.*

<sup>o)</sup> *Fol. 7. Act. Vol. I.*

<sup>p)</sup> *Fol. 14. Act. & resp. ad artic. 88. 89. 90. 91. 92. 100. fol. 101. Act.*

CAMPERI animaduersioni memores simus, deinde attendamus, infantem dici sic in vase iacuisse, vt praeter pedes, ad abdomen attractos, in vase absconditus esset. Sic enim respondit 1): „Das Kind habe ganz in dem „Fälsgeu gelegen, und weil es die Füße an „den Leib gezogen, habe es geschienen, als „wenn die Füße etwas höher, als der Kopf „gelegen. „ Itaque, quum fetus natus iam matris pars esse desinat, & sic conuolutus fere iacuerit, vt in vtero, sanguis ex fetu, durante adhuc vita fetus, ad placentam abire poterat, vbi ex hac, nunc *soluta* 2), euacueretur; quum e contrario, ob lipothymiam aut asphyxiam matris, nullus ad fetum abiret. Igitur hac ratione fetus κεραγγία, ob non de-

1) Fol. 100. Aft.

2) Placentam tum solutam esse, saltem ex parte id tum suadet partus facilis, naturalis, qua viuus nascetur infans, partim ratio partus. „Nam Testes „Krascheninnikow & Clem. Alexandri foeminae „barbarorum, genibus nixae, partum deponunt; „qui persaepe pondere suo & placentam promouet. „ (Exstant apud FISCHERVM l. c. §. IX p. 18.). KOEDERERVS (Comm. Soc Goett T. III. p. 406 sq.) quoque testatur, infante etiam nato, pulsus in arteriis vmbilicalibus superesse ad 28 min., & quamuis in suis obseruationibus neget, sanguinem ex placenta prodiisse, eadem tamen soluta non fuit. Quodsi soluta fuit, sanguis omnino ex placenta abire potuit.

deligatum vmbilicum mori poterat, id vel  
contingeret matris culpa, aut dolo. An igitur  
iniquè iudicauit *b. parens* <sup>s)</sup>?

## XVIII.

*Atque ad obs. LXXVIII.*

Denique in obseruat. LXXVIII. (quae  
inscribitur: „Von einem lebendig gebornem  
„Kinde, das an einer Verblutung und Kopf-  
„verlerzung gestorben „) haec exstant:  
„Wir halten dafür, daß eine vorgegangene  
„Verblutung den Tod des Kindes zuwege  
„gebracht, die am Kopfe bemerkte Gewalt  
„aber ihn hiernächst befoerdert habe <sup>z)</sup>. „  
Et secundum n. 8. cor cum vasis maioribus  
sanguine fere omni destituta erant; capitis  
vero vulnus non multum excedebat eam  
constitutionem, cui saepius obnoxii sunt in-  
fantes sub partu, in primiparis facile laborio-  
so. Neque igitur iniquum videtur propo-  
situm esse iudicium <sup>u)</sup>.

Quum

s) Facti certitudo non adest. Forte partum adiuuit  
med. stud., solutus iusto citius est vmbilicus &  
haemorrhagia secuta; mater vero finem vitae in-  
fantis adiuuit vulnere capitis.

z) l. c. p. 261.

u) Actis uti non potui.

D

Quum igitur in his, quas reprehendit Cl. FISCHERVS, obseruationibus adesset *νερεαγγία*, hanc eidem non sufficere ad inferendam haemorrhagiam vmbilicalem, satis elucet. At vero quomodo demum in adductis obseruationibus *νερεαγγίαν* explicabit V. Cl.? Num forte reputat, in iis quoque casibus haemorrhagiam, tamquam laesionis capitis effectum, esse considerandam; sicut habet pro effectu impeditae respirationis? Creditne V. Cl., *νερεαγγίαν* explicari in adductis obseruationibus posse ex congestionibus atque extrauasionibus capitis? Ita videtur. Igitur & haec aestimari debent, vt adpareat, an de haemorrhagia tuto iudicari ex *νερεαγγία* possit. Itaque videamus.

### XVIII.

*Haemorrh. vmbil. non est effectus laesionum capitis. Nec νερεαγγία potest per congest. aut extrauasiat. explicari.*

Haemorrhagiam, ex vmbilico contingentem, non posse haberi pro effectu laesionis capitis, sequentia comprobant. 1) Haemorrhagia ex vmbilico non deligato, obseruationibus <sup>a)</sup> edocentibus, contingit, absque im-

a) cf. obsf. citt. ad §. XI. d).



impedimento respirationis aut capitis laesione.  
 2) Capitis laesiones obseruantur absque haemorrhagia vmbilicali, licet haec contingere potuisset y). Atque capitis laesiones, quatenus, animi defectum inducendo, actiones vitales aut imminuunt aut tollunt, haemorrhagiam per se coërcere potius videntur z). 3) Dantur obseruationes, vbi capitis laesio cum suffocatione aderat, nec tamen *νεκρωγία*, hinc ad haemorrhagiam concludi non poterat a). Itaque si haemorrhagia vmbilicalis vtriusque effectus esset, deberet in iis quoque casibus facta esse.

D 2

Quod

y) cf. v. g. obff. apud ALBERTI l. c. T. I. app. c. 13. a. p. 64. T. III. 15. T. IV. 5. T. VI. 3. *Acta med. Berol. Dec. II. Vol. III. p. 52. Vol. VI. pag. 85. BÜTTNER l. c. cas. 9. 14. 34. FABRICIUS l. c. cas. 8. 14. 15. 17. liceat addere b. parentis cas. 69. 70. Quoad vltimum casum 70. inoneo, me acta inquisitionalia consuluisse, quibus didici, matrem de industria stando peperisse, ea, vt edixit, intentione, vt fetus, quem ignorabat ope funiculi & placentae vtero adhaerere, in terram caderet. Funiculum, dum lastrabat infantem, huic adhaesisse, non sibi, fetumque cum impetu in terram cecidisse, edixit.*

z) cf. van SWIETEN Comm. T. I. p. 235 sq.

a) v. c. BÜTTNER l. c. cas. 13. 18.



Quod alteram quaestionem attinet, neque *νεκρωγία* explicari potest ex congestionibus atque extrauasionibus: quae in primis hic considerandae erunt, quo magis multi eo facile concludunt. Sic v. g. facultas medica ante haud multos annos respondit. „Was endlich die Frage betrifft: ob in dem gegenwärtigen Falle die unterlassene Abbindung der Nabelschnur pro causa mortis zu achten? so gründen wir uns auf die Richtigkeit des Geständnisses der Inquisitin, daß: nämlich die Nabelschnur erst dem Kinde abgeschnitten worden, da es schon todt gewesen, und sie alsdenn nicht geblutet, weil in diesem Falle die unterlassene Verbindung derselben keine Ursache des Todes abgeben kann,“ (quam sapienter! Estne vero callidae infanticidae depositionibus potius fidentum, quam euidetibus obseruatis? An, inquam, iudex acta ad ordinem medicum fuisset misurus, si existimasset, confidi posse infanticidae depositionibus? Nonne vel iudex, vel artis non peritus tale ferre iudicium potuisset?) „und wenn auch nach dem Sectionsbericht die vasa maiora nach proportion nur wenig Blut enthalten; so ist hingegen desto mehr Blut in den vasis exterioribus cerebri zusammengehäuft, und also kein indicium

„cium

„cium einer geschehenen haemorrhagie vor-  
 „handen gewesen, da propter congestionem  
 „ad caput die untersten Gefaesse haben aus-  
 „geleeret werden müssen! „ rel.

## XX.

*Dicta ss. praec. probantur observationibus.*

Itaque observationes consulamus. Pri-  
 mo in medium proferam ROEDERERI <sup>b)</sup>  
 observationum, ex fetibus, in vtero mortuis,  
 captarum, aliquam. „Et primo quidem, in-  
 „quit, abdomen aperui, ex quo aperto san-  
 „guinis tenuioris, omnia viscerum interualla  
 „replentis, notabilis quantitas effluxit. Te-  
 „nuior quidem ac alter, quem ex venis post-  
 „modum extraxi, is sanguis fuit. — Intesti-  
 „na rubicunda adparent, vasis eorum venosis  
 „sanguine plenissimis, cum minores arteriae  
 „vacuae essent. — In thorace grauissimae  
 „inflammationis & sanguinis congestionis  
 „signa conspiciebantur. Prouti enim maiora  
 „cordis vasa, arteriae, venae, auriculae,  
 „sinus, & ventriculi sanguine tulerunt, ita  
 D 3 „mi-

<sup>b)</sup> *Sat. de suffocat.* §. 13. *Opp.* p. II. p. 323. Cf. *Et.*  
*pr. de infant. in partu suffoc. obs.* §§. 2. 3. 4.  
 l. c. p. 347 sq. atque ALBERTI l. c. T. VI. c. 3.  
 p. 85.

„schwarzem dicken Blut, welche drey Zoll  
 „lang, und drey Zoll breit war. 8) Als  
 „wir dieses mit Blut angelauffene und erha-  
 „bene Beinhäutlein über dem linken Wir-  
 „belbein aufschnitten, lief wenigstens andert-  
 „halb Loth schwer Blut heraus. – 9) Bey  
 „der Bewegung dieses zerbrochenen linken  
 „Wirbelbeins lief gern eine halbe Unze:  
 „schwer dickes schwarzes Blut heraus.  
 „10) Als wir dieses linke Wirbelbein ab-  
 „schnitten, zeigten sich die obere lange:  
 „Bluthöhle der harten Hirnhaut, und die:  
 „Hirngefaesse – mit vielem dicken Blut an-  
 „geschwollen. 11) Im geöffnetem Unterlei-  
 „be fanden wir – 12) die grosse Pulsader,  
 „Hohlader, Leber, Milz, und Gekrösge-  
 „faesse mit vielem Blut – angefüllt. 13) Nach  
 „eröffneter Brust – lief uns viel schwar-  
 „zes dickes Blut entgegen, und die Herz-  
 „kammern gaben viel Blut von sich f). „

Sic etiam alibi g) haec leguntur: (prae-  
 ter notabiles fugillationes sub n. 7-11.) „Un-  
 „ter einem Theil von iedem Wirbelbein,  
 „12) saß eine recht dicke Austretung von  
 „coagulirtem Blut. 14) Ueber und in der  
 „lang

f) l. c. *obs.* 9. p. 26 sq.

g) l. c. *cas.* 14. p. 46 sq. cf. etiam *cas.* 34. p. 93 sq.

„langen Bluthöhle der harten Hirnhaut lag  
 „eine ziemliche Portion von dickem schwar-  
 „zen ausgetretenen Blut, welches sich bis  
 „unter das Hinterhauptsbein erstreckte.  
 „15) Nach Wegnehmung der harten Hirn-  
 „haut, die ganz roth, wie eingespritzt war,  
 „waren die Gefaesse der feinen Hirnhaut,  
 „und die Hirnblutadern nicht allein ganz  
 „voll von schwarzem Blut, sondern es zeig-  
 „te sich auch 16) zwischen beyden halben  
 „Kugeln des grossen Gehirns schwarz aus-  
 „getretenes Blut. – 17) Hierauf öffneten  
 „wir die Brust und fanden das Herz mit sei-  
 „nen Säcken und Kammern, wie auch die  
 „Kranzgefäesse desselben mit Blut angefüllt.  
 „– Im Unterleibe bemerkten wir Leber,  
 „Milz, Gedärme, Nieren, den Magen, und  
 „das Gekröse in gutem Zustande – und  
 „die Gefäesse benannter Eingeweide annoch  
 „mit Blut angefüllt. „

## XXII.

*I t e m p o r r o.*

Apud FABRICIVM <sup>h)</sup> haec propo-  
 nuntur: „quoad interna hat sich in der caui-  
 D 5 „tate

<sup>h)</sup> l. c. cas. 8. p. 72 sq. cf. etiam cas. 14. p. 112 sq.  
 ac DELII d. de sugill. quatenus infant. indic.  
 pag.



„tate abdominis alles natürlich gefunden.  
 „Bey der cavitare pectoris waren — die vasa  
 „maiora sanguifera, ingleichen die ventriculi  
 „cordis voll von Blut. — Bey der Oefnung  
 „des Kopfs, — hat man auf dem pericranio,  
 „— ein gelatinöses Wefen mit vielem fan-  
 „guine extraufato & congrumato gefunden,  
 „dergleichen extraufirtes Geblüte auch  
 „dicht auf dem fonte pulfati wahrzunehmen  
 „gewefen, und am offe frontis hat fich  
 „auch von außen auf beyden Seiten hier und  
 „da flockendes und extravafirtes Geblüte  
 „gezeiget. Als man das cranium geöfnet,  
 „find fowol die vafa durae, als piae matris  
 „ziemlich mit Blut angefüllt gewefen, zwi-  
 „fchen den gyris und circumvolutionibus  
 „cerebri hat man viel flockendes Geblüt  
 „gesehen; die finus laterales hatten viel Ge-  
 „blüt in fich, und die basis cerebri ift mit  
 „fanguine extraufato angefüllt gewefen. „

Quibus addam, quae huc faciunt, ex  
 obferuationibus recentioribus GOLDHAGE-  
 NII, *V. Celeb.* beneuole mecum communi-  
 catis. Igitur in obferuatione de a. 1775. haec:  
 de-



deprehendo: 13) „Fand man ſowol über als  
„unter den beyden hemisphaeriis cerebri,  
„um die pia mater herum, ein ſerum ſangui-  
„nolentum gelatinofum, und die vafa pia  
„matriſ von ſchwarzem Blut angelaufen.  
„14) War auf dem proceſſu tranſuerſo der  
„harten Hirnhaut auf 3 Theelöffel voll ſchwar-  
„zes geronnenes extravasirtes Geblüt befind-  
„lich. „ – 17) „Nach Eröffnung der Bruſt  
„ſelbſt fand man in der rechten Höhle der-  
„ſelben etwa ein Loth dunkelgefaerbtes Se-  
„rum ſanguinolentum. – 19) Alle vafa pul-  
„monum & cordis, ſo wie auch alle Hölen  
„des Herzens waren von ſchwarzen und ge-  
„ronnenen Geblüt ſtark erfüllet. 20) Nach  
„Eröffnung des Unterleibes fand man die Le-  
„ber und Milz ganz ſchwarzbraun, und mit  
„ſehr- vielem Blut angefüllet, ſo wie auch die  
„vafa vmbilicalia Blut enthielten. „ – Atque  
in obſervatione de a. 1777. haec lego: „Nach  
„eröffnetem Kopfe fand man – die Gefaefſe  
„des groſſen Gehirns ſo, wie die langen,  
„die Seiten- und übrigen Bluthalter, und  
„das Adergewebe mit ſchwarzem Blute voll-  
„gepfropft. – Nach eröffneter Bruſthöhle  
„traf man – 8) in dem Herzen, ſo wie in  
„den anliegenden Blutgefäeſſen, genug Blut  
„an. 10) Im Unterleibe fand man die Leber  
„vom

„vom Blute vollgepfropft, alle Eingeweide:  
„aber natürlich und blutreich.“

## XXIII.

*Comprobantur dicta §. XIX.*

In his igitur haecenus propositis atque excitatis observationibus aderat vasorum encephali totius infarctus, aderant haud leues extrauafationes, nec tamen minus totius corporis vasa sanguine non plena solum, sed turgida potius erant. (Atque hi fetus, praeter illam ROEDERERI omnes respirarunt).. Poteritne igitur statui, hanc encephali conditionem *νεκρωγία* inducere, quae toties absit? Nonne potius & hic ROEDERER O subscribendum est; „qui constans, inquit, & „inconcussa veritas manebit, falso obseruatum „effectum esse, cuius impossibilitatem ex veris „principiis iusta ratiocinii lege demonstra- „re possumus, & simultaneorum saltem phaenomenorum causas aliunde reperendas esse, „si euictum dari potest, inter ipsa phaenomena nihil nexus intercedere, multoque minus vnum ex altero deriuari.“

Itaque *νεκρωγία* si per encephali conditiones abnormes explicari nequit, nonne debet

bebit per haemorrhagiam vmbilicalem explicari? Nonne, signis certissimis, a summis in arte viris stabilitis, maiorem fidem habendam esse, patet, quam FISCHERI argumentis fallacibus? Nonne, vulnerum etiam letalitate male ex vaga analogia, tamquam fallaci argumentandi ratione, diiudicari, quae ex eudentibus cadauerum conditionibus longe certius erui potest, hoc etiam argumentum egregie comprobatur?

Quid igitur, inquam, FISCHERVS sibi voluit? An forte vnam mortis causam sufficere, & concausam negligendam esse, statuit? At, in medicina forense concausas aestimandas esse, quis negauerit? Potest in rixa homo a duobus vel tribus letale vulnus accipere, quorum nullum negligi debet: v. g. cordis & cerebri, rel. Atque in infanticidio in primis concaussa negligi non potest: mater enim potest de industria omisisse vmbilici deligationem & fetui potest casu potius, quam dolo, capitis vulnus inflatum esse; e contrario mater dolose caput laedere, atque ex ignorantia deligationem omittere potest. In utroque casu utramque mortis causam neglexeris, efficies, ut cum tuum de letalitate, tum iudicis iudicium a vero

vero aberraret. Haec itaque omnia probe sunt attendenda, maxime in terris *Borussicis*, ubi secundum *Clementissimi Regis* rescriptum d. d. *Berol.* d. 8. Febr. 1765. §. I. maior de vita & morte medicis habetur fides, quam inquisitionis; quod quam congrue fiat, intelligunt omnes, qui accuratius res aestimant.

## XXIII.

*Respond. ad argum. VI. FISCHERI.*

Supereft, vt tandem ad *VI. argum.* FISCHERI respondeam. Venae sectionis locum modicam congruamque haemorrhagiam ex umbilico aliquando supplere, concedo, imo non raro efficere, vt in vitam redeat infans, incuneationem capitis, al. expertus, addo; sed quid inde? Si tantum sanguinis tempore congruo per umbilicum detractum est, quantum salutis cedit, en! viuit infans, nec mater infanticidii accusatur. Quod si iusto plus detractum fuit, vt ex nimia sanguinis iactura infans periret, num ad haec respici poterit? Num, si ex vasis adulti laesis haemorrhagia, *accipit* inducens, contingit, inde excusatio vulneris repeti potest, quod toties absque damno vasa per phlebotomen incidantur?

Itaque:



Itaque salua res est. Vera etiam hodie sunt haec HEBENSTREITII: „Ergo deligandus funiculus vmbilicalis est, a neglecta enim illius deligatione mors infantis est certissima. Sanguis enim ille, qui ex fetu, motu cordis eius per vtramque arteriam vmbilicalem ducitur, tamquam ex vulnere arteriarum, magno cum impetu & breui tempore omnis emanat, vel tam minima eius pars manet, vt vitae ducendae haud sufficiat <sup>1)</sup>“. Cui addamus HALLERVM, qui argumenta in vtramque partem prolata aestimaturus: „Si quando contraria fuerint euenta, inquit, & parcior haemorrhagia „fu-

- 1) l. c. p. 418. Non est necesse, vt omnis omnino sanguis corpusculi per vmbilicum effluat, vt ad haemorrhagiam concludatur; sed illa adesse haud sine ratione statuitur, quum modo magna sanguinis iactura facta est, vt vitam viuere infans non potuisse existimandus sit. Sic etiam facultas medica *Helmstädiensis* assentiebat iudicio physici: „Dass die Unterlassung der Verbindung der Nabelschnur die wahre Ursache des Todes des Kindes sey;“, quamuis in relatione haec legantur: „Die vasa pulmonalia hielten in Verhältniß gegen die ausgeleerten vasa sanguifera in abdomine noch ziemlich Blut in sich, wovon die beyden Kammern des Herzens gleichfalls eine mäßige Quantität enthielten.“ Cf. FABRICIVS l. c. cap. II. Hinc male in casu, a Cl. PLAZIO allato, haemorrhagia adfuisse negatur. Debuisset effectibus, in cadaveribus reperiundis, maior fides haberi, quam infidis depositionibus.



„funiculi, id summae fetus debilitati, satis  
 „vulgari vitio, aut longo funiculo, aut frigo-  
 „ri, cuius magna hic est potestas, ut etiam  
 „sanguinem auulsi aut incisi funiculi suppri-  
 „mat, aut caussis aliis non perpetuis tribui  
 „debere <sup>k</sup>). „

Huic vero omissae deligationi, inde-  
 que pendenti haemorrhagiae, mors poterit  
 adscribi, quando ~~νεκρωγία~~ in cadauere in-  
 fantis detegitur, quod quidem tum antece-  
 dentia probant, tum Cel. CAMPERI, cetero-  
 rum aduersarii, sequentia: — „Doch würde  
 „es sich zutragen können, daß die abgeriss-  
 „sene Schnur ein solches Bluten verursachte,  
 „daß das Kind davon stürbe, so wie es nach  
 „MAURICEAU Beobachtungen geschehen  
 „dieses bestätigt auch *de WIND* noch mit an-  
 „dern Beyspielen, und schließt mit Recht  
 „daß Kinder fürnämlich, die dicke Schnur  
 „ren haben, an einer solchen Blutstürzung  
 „sterben können. Doch in diesem Falle  
 „werden das Herz und die Behältnisse des  
 „Bluts im Körper leer gefunden werden.  
 „Es ist also nöthig, daß der Arzt in seinem  
 „Bericht anmerke, ob in dem Falle viel ode-  
 „wenig Blut in dem Körper des Kindes ge-  
 „funden

„funden worden. <sup>1)</sup> „ Igitur satis congrue negat *Gel. CAMPERVS*, ex solo deligationis defectu ad haemorrhagiam concludi posse, sed *κσεαγγισιν* eiusdem factae certum esse signum, abunde concedit.

## XXV.

*Vbi de haemorrhagia umbilicali quaeratur? Distinctio eiusdem in uterinam & infantilem.*

Quibus igitur iam fufe propositis, demum ad ea veniamus, quae tamquam theoremata de umbilico ponenda sunt. Itaque primo tenendum erit, suspicionem de haemorrhagia umbilicali incidere in omnem fetum, cuius mortis causa suspecta est. Vel enim infanti contigua adhuc sit placenta, vel non, atque in utroque casu vel deligatus sit umbilicus, vel non, nihil tamen impedit, quo minus mater, aut parentes, rel. vbi infanticidii suspicio est, haemorrhagiam aut permiserint, vel conscie, vel secus, aut non tam permiserint, quam potius promouerint; atque in utroque casu aut dolose, idque vel directe vel indirecte, vel culpose egerint, aut

<sup>1)</sup> l. c. p. 97 sq.

aut casus adfuerit: id, quod ex supra dictis facile colligi posse putò.

Igitur simul, ac de infanticidio quaeritur, videndum est, sitne hæmorrhagia ex umbilico secuta? Eadem vero, per supra proposita, satis certo eruitur ex *κεφαλαια*, sic, ut hæc aliquando deprehendatur, quum placenta contigua adhuc est, aut eadem soluta, umbilicus vel deligatus est, vel non; siquidem etiam post hæmorrhagiam (interdum a sero nimis aduocata obstetrice) vinculum iniicitur aliquando.

At licet de hæmorrhagia per *κεφαλαια* constet, tamen animaduertendum est, non numquam hæmorrhagiam ante infantis partum contingere, ut hic moriatur ante partum: quo casu vel contigua manet placenta, vel soluta est. Idem scilicet contingit a soluta placenta, quæ, vel ori uterino, vel alii parti adhaerens, ante partum soluitur, eo euentu, ut rediturus a fetu sanguis per placenta euacuetur, atque e contrario paucus ad eundem ducatur, plurimus per solutam placenta excernatur. Hanc vero hæmorrhagiam liceat *uterinam* nominare, ut discernatur ab altera, quam *infantilem* vocare liceat: utramque vero dicamus *umbilicalem*.

## XXVI.

*Quando haemorrhagia umbilicalis uterina adfit?*

Itaque, ad *haemorrhagiam umbilicalem*, eamque *uterinam* concludi debebit: quum

- 1) in cadauere infantis adest *κενεαγγυλα*, non explicanda per aëris inflationem, aut putredinem.
- 2) Certitudo adest, solutam esse ante partum placentam, ut vel per mensem, vel per hebdomades ante partum mater conquesta sit de excretionē cruenta uterina (*metrorrhagia*) tantā, ut aegrotans de eadem conquereretur.
- 3) Placenta, si adest, deprehenditur, saltem maximam partem, integra, levis in superficie, quae utero adhaesit. Nam quum sponte soluta sit placenta, ab artificiosa solutione vim ferre non potuit, ubi facilius deprehenditur inaequalis. Vereor, ne addam, eam esse exsanguem: etenim ut fetus periret, sufficit ipsius *ἀναμία*: potest vero partus contingere ante, quam sanguis ex placenta effusus sit, quod plerumque locum habebit. Hinc ubi de auxilio vel obstetricis vel



mulieris alius quaestio est, an subscribi possit harum relationi, partum aut praecessisse aut esse comitatam haemorrhagiam, placenta examini subiiciunda, & praecipue margo perscrutandus, an qua parte trunculus quidam vasorum umbilicalium conspicuae amplitudinis subito desinere obseruetur. Hinc infletur umbilici vena, atque vtraque arteria, dum placenta aquae tradita est. Prorumpens bulla circa marginem rupta vasa, & placentam separatam demonstrat, si reliqua vasa integra sunt <sup>m)</sup>..

4) Infans forte mortuus editus est, quod diiudicabitur alio loco, & probatur v. c. ex partus conditione & defectu respirationis, rel.

5) Aut debilis, idem comprobantibus argumentis: ubi cum impetu exturbatus; in terram concidens, exitiosam capitis contusionem iam facile suscipere potest.

6) Aut vegetus, ita etiam, ut respiret; ita probatur natus esse, ut contiguus maneret infans placentae, partus etiam fit

<sup>m)</sup> Cf. ADOLPH. l. c. p. 21.



fit in loco moderate calido, & solutionis placentae signa vel ante partum iam obtinuerunt, vel eadem per partum inducta est, dum mater genibus flexis pareret, & simul deficiunt signa alius mortis causae, aut his praesentibus mater saltem sponte indicat, infantem natum sic, ut in utero, iacuisse, & contiguitas placentae cum infante manet, aut alia concurrunt, quae suadeant, obtinuisse similem casum, ei, quem diximus §. XVII.

## XXVII.

*Quando haemorrhagia infantilis adsit? — Animadversiones.*

Ad haemorrhagiam umbilicalem, eamque infantilem, pro causa mortis habendam, argui debet; si

- 1) in cadauere infantis adest *avaipla*, non explicanda per inflationem aëris, nec vulnus latum, cruentum (cf. n. 4 sq.).
- 2) Deficit certitudo haemorrhagiae umbilicalis uterinae: & signa adsunt vitae infantis post partum. Imo
- 3) Maculae in linteis deprehenduntur, quibus obuolutus erat infans, *testante*

*matre*, easdem non esse a lochiis,  
(vt in obseruat. LXV. §. XV. pro-  
posita) <sup>n</sup>).

Vbi sequentia notanda erunt:

- 1) Non refert, an placenta contigua, an  
vmbilicus tenuis sit, an crassus, num  
solutus, nec deligatus, an e contrario  
deligatus sit, an abruptus, an abscissus,  
an longus, an brevis, an omnino ab-  
ruptus? Etenim exempla docent sub  
omni conditione dictâ factam esse hae-  
morrhagiam, certo id comprobante *νε-  
νεαγγισα*. Sic deligatus in cadauere erat:  
vmbilicus (ab obstetrice) in obseruatio-  
ne BÜTTNERI <sup>o</sup>): & laxa ligatura  
in exemplo, a Cl. BAYMERO <sup>p</sup>) ex-  
citato; sic abruptum vidi in haemor-  
rhagia

- 2) Satis congrue HEBENSTREIT: „Sed caueant  
„sibi fecantes, ne huic signo fidant, dubitare enim  
„fas est, an cruentatio ista ex fetus haud deligato  
„vmbilicali fune contigerit, an potius pro san-  
„guine illo habenda, qui lochiorum titulo, educta  
„placenta, aliquando etiam antè illam, effundi  
„ex vtero ita solet, vt haud raro infantes sangui-  
„ne materno tincti nascantur.” L. c. p. 422.

<sup>o</sup>) l. c. cas. 22. p. 62.

<sup>p</sup>) l. c. §. 32. p. 313.

rhagia vere infantili 4); sic satis longa vmbilici pars supererat in FABRICII<sup>1)</sup> & RUEF<sup>5)</sup>, V. Cl. exemplis, neque tamen minus haemorrhagia secuta erat.

2) Nihil attinet, vtrum frigus, an calor forte accusetur? nec aqua, in qua infans repertus est, finit adsumere, sanguinem per aquam esse euacuatum. Idem enim, bene monente BÜTTNERO<sup>2)</sup>, locum non habet, quum per artem sanguis sic elui non possit.

3) Κεραγγία tum solum potest per haemorrhagiam vmbilicalem infantilem explicari, quum a cadauere infantis putredo maior abest. E contrario, vbi putredinis maioris indicia adsunt, metuendum

E 4

est,

2) Quod per abruptum vmbilicum nihil dicatur sanguinis effluere posse, id ita interpretor, quod in exemplis, huic enunciationi originem praebentibus, aliae adfuerint causae, haemorrhagiam impediētes, e contrario statuam, arteriarum contractionem non eam esse, quae possit sanguinem effluxurum cohibere, id quod experientia vere comprobatur: aliquid tamen dandum est auctoritati, ad obseruationes prouocandi.

1) l. c. cas. II. p. 90.

5) l. c. p. 46.

2) l. c. Anw. zu Obductionsatt. pag. 59. v. Kind. p. 69 sq. ROEDERER de suffoc. sat. p. 51.

est, ne resolutus sanguis per non deligatum umbilicum euacuatus sit <sup>u)</sup>).

4) Quando vulnera simul adsunt, videndum, an ex his etiam deriuanda sit *νεαρύγλα*? quod diiudicatur ex vulneris conditione. Quum intra labia vulneris, musculos, & vasa cruor effusus deprehenditur, per vulnus etiam haemorrhagiam contigisse, patet. An vero ex umbilico haemorrhagia contigerit, ex rei adiunctis decidendum. Quod si ea vulneris conditio non obtinet, ex umbilico haemorrhagia contigit, & vulnera sunt post mortem inflicta (quod tamen certe determinari non potest, quum in aqua aliquamdiu delituit infans, quia sanguis tum ex vulnere elui potest).

5) Maculis confidi non potest, nisi adfuerit certitudo, eas non esse a lochiis, aut aliunde repetendas. Ex earum vero defectu in loco, vbi reperitur infans, argumentari non possumus ad haemorrhagiam vterinam.

6) Ks.

<sup>u)</sup> Cf. Cel. BOEHMERI d. de notabil. quibusdam, quae fetui in utero conting. poss. ad illustr. infanticid. Hal. 1775. pag. 10. not. a) & BÜTTNERI l. c. cas. 45.



6) *Κεραρυλα* non est effectus congestionis aut extrauasionis sanguinis, nisi maior fuerit, quam in infante locum habeat. Id enim dicta comprobant §. XX. sq.

7) Tamen haemorrhagia aliquando est effectus impeditae respirationis, quod diiudicatur ex signis impeditae respirationis & suffocationis alio loco proponendis, & inquisitione.

## XXVIII.

*Certitudinem haemorrhagiae quomodo adsequi nos possimus?*

Eruietur certitudo haemorrhagiae umbilicalis factae:

1) Sectione cadaueris infantis, ubi haec attendantur HEBENSTREITII: „In hoc negotio gerendo — ita procedant „secantes, ut venas maiores ubique in- „spiciant, venas iugulares, sinus durae „matris, venam cauam, venas mesar- „rhaicas, ipsumque venae portae trun- „cum; discindant hepar, videantque, „an sanguis intra eius sinus superfit, „ventriculum utrumque & utramque



„auriculam cordis examinent x). „ Ad  
 vmbilici & placentae vasorum conditio-  
 nem attendere adeo non refert, siquidem,  
 vt *ἀναίμα* statuatur adesse, non opus est,  
 vt omnes quidem infantis vasa sanguine  
 omnino destituantur, sufficit, eius tam  
 minimam copiam adesse, vt vitae du-  
 cendae non sufficiat y). Sic etiam, vbi  
 haemorrhagia cum vulnere complicata  
 est, vt mors ex ambobus intelligatur,  
 corpus infantis non omnino ex sanguine  
 reperitur, sed hepar sanguinis quid con-  
 tinet; siquidem ante, quam omnis san-  
 guis emanaret, mors per vulnus, &  
 debilitatem, ex haemorrhagia ortam,  
 secuta est. Sed nihilo minus haec con-  
 stitutio non mitigare poterit. Sed quo-  
 niam aliquando haemorrhagia adparens  
 adest, si inflatus aer est, comprobante  
 Cel. CAMPERI exemplo, in his opus  
 est, adsit certitudo, aërem inflatum non  
 esse. Cf. Comm. de pulm. §§. XXXII.  
 XLIII.

- 2) Rei adiunctorum fida relatione, a iudi-  
 ce efficienda, comparanda.

XXVIII.

x) l. c. p. 422.

y) cf. nota i) §. XXIV.

## XXVIII.

*Intentio matris circa infantilem haemorrhagiam  
ex medicis principiis illustratur.*

Quum per antecedentia iudex in deciendo ad intentionem matris circa haemorrhagiam respiciat, annon ex medicis principiis ea quodam modo declarari possit? quaeritur. Atque idem locum omnino habet. Itaque haec teneto :

- 1) Sunt feminae, quae ignorent, fetum in utero ope funiculi & placentae utero cohaerere, ut non adeo raro audiamus : „Das Kind, oder die Nachgeburt war angewachsen,“ vel „ich habe gar nichts von der Nabelschnur gewußt, auch nicht gesehen, daß es mit dem Nachfolgenden zusammengegangen, sondern es war gleich so (abgerissen).“ Inde vero inducuntur feminae, ut consilio partum stando absoluant, doloresque urgeant, ut fetus concidat, ab utero exturbatus, in terram. Id quod comprobatur voluntaria depositio infanticidae, quae indusia nihilo minus parata secum portabat <sup>2)</sup>).

In

<sup>2)</sup> cf. nota y) §. XVIII.

In hoc vero casu abruptus est umbilicus, quum erecta mater peperit. Quodsi quodammodo genubus flexis partum edidit, fetus sic in terram concidere potest, ut placentae solutio inde promoueatur, funiculus autem non rumpatur <sup>a)</sup>. In illo casu fetus subito in terram, interdum lapides, concidens, vulnus capitis facile contrahit, abruptus autem funiculus, quum arteriae se retrahant, haemorrhagiam non permittit plerumque; hinc vix *κεφαλὴ γυλά* aderit, nisi postea mater umbilicum praeciderit, nondum cessante arteriarum umbilicalium pulsu. In hoc casu, quando infans natus diu cohaeret cum placenta, tardius edita, edocente CAMPERO <sup>b)</sup>, haemorrhagia omnino contingere potest, quod obtinet etiam, quum aut placenta mox sequitur, aut umbilicus abscinditur; utrum vero haemorrhagia facta sit, discitur ratione dicta §§. XXVII. XXVIII. Quodsi genubus flexis peperit mater vix praesumenda erit eo consilio sic peperisse, ut infans in terram concidat; sed plerumque tum ad-

erit:

a) cf. nota r) §. XVII.

b) cf. §. XVI.

erit culposum infanticidium, si reliqua concurrunt. E contrario si erecta peperit, inquirendum erit, annon animus vel directus vel indirectus adfuerit? aut solum culpa?

- 2) Si praecisus est umbilicus, omne infanticidium locum habet; namque si cito satis soluitur umbilicus, vix fieri interdiu potest, quin mater haemorrhagiam animaduertat, quam aut consecuturam esse intellexit, vel iam de industria contingere finit, ut ex animo directo infanticidium committat: aut non animaduertit haemorrhagiam, tardius forte subsequenter, eam tamen subsequi posse sciuit, hinc infanticidium videtur ex intentione indirecta commisisse. Tum quoque mater ex intentione vel directa vel indirecta deligationem omittere potest, nulla tamen haemorrhagia contingit, quam omnino frigus, rel. impedire possunt. Aut ignorauit omnino, haemorrhagiam esse subsequenter, neque haemorrhagia statim subsecuta est; aut ignorauit deligatione haemorrhagiam impediri posse. Forte tamen animaduertit haemorrhagiam, & sciuit, deligandum



dum esse vmbilicum, vt ex intentione directa infanticidium committeret.

- 3) Si haemorrhagia nato contigit ex contigua placenta, tum culposum modo adesse videtur infanticidium: vix enim credenda est mater contingentem haemorrhagiam intendisse, quam si voluisset, praecidisset potius vmbilicum.

### XXX.

*Neque haemorrhagia testatur de vita infantis; nec placenta de fetus debilitate aut morte.*

An haemorrhagia facta testatur de vita infantis post partum? Ita statuunt plerique medicinae forensis scriptores. Sic v. c. HEBENSTREIT <sup>c)</sup> haec proposuit: „Quod si ergo illa vasa sanguine, vti ex haemorrhagia defunctis esse solent, vel vacua, vel maiorem partem depleta inuenerint, concludere ad neglectae deligationis effectum mortiferum certissime (haec bene; male sequentia addidit), atque simul in illo casu, vbi infans post natiuitatem haud respirauit, & pulmones eius in aqua descendunt, iudicare poterunt, nihilominus vixisse infantem, quia si mortuus natus esset, profundere sanguini.

c) l. c. p. 423.



„guinem haud potuisset. „ Ac FISCHER-  
 RVS d) haec VATERI sua fecit: „Vasa ex-  
 „sanguia non modo *haemorrhagiae*, sed &  
 „infantem viuum editum fuisse, certum in-  
 „dicium praebent: nulla enim effusio sangui-  
 „nis a partu, in vtero mortuo, expectari  
 „potest. „ Idem quidem VATERO, HE-  
 BENSTREITIO & FISCHERO ambabus  
 concedo: at poterat haemorrhagia, ex solu-  
 ta ante partum placenta, sequi, & causa esse  
 mortis infantis ante partum, idemque con-  
 firmaturus potius esset pulmonum descen-  
 sus in aqua. Aut per inflationem pulmonum  
 mortui nati haemorrhagia vmbilicalis produ-  
 ci potest, vt CAMPERI V. Cl. observatio docet.  
 Haemorrhagiam vero vmbilicalem vterinam  
 non adesse, comprobatur ex signis respira-  
 tionis post partum, atque ex grauiori cruen-  
 to vulnere, quod ante, vel in partu, suscipe-  
 re, ne matris quidem culpa, potuisset. Igi-  
 tur tunc etiam hoc signum, *κενέαγγια* inquam,  
 docet, viuum editum esse infantem. His  
 vero deficientibus, quamquam aliquando vel  
 nulla vulnera suscipit, vel natus non statim  
 respirat infans, tamen certitudo vitae post  
 partum

d) l. c. pag. 36. n. e) sentisne FISCHERI contra-  
 dictionem?

partum deficit, neque ex *νεβελγυλα* illa obtinetur; nisi confidas testimonio matris, cruorem inuentum, vel in loco, quo degebat infans, vel in lintheis obuium, esse a haemorrhagia, non a lochiis. Sed tunc res ad matris testimonium solum redit. „Aft viuus; „natus haud est, cui, cum deligatus funiculo; „lus haud esset, per eius arterias sanguis; „effluxit nullus: illud enim argumento est, „nascenti motum cordis non superfuisse. „Sunt verba *HEBENSTREITII* *e)*: sed erronea haec esse, probant exempla, vbi deligatus non est vmbilicus, infantes tamen superfuerunt, hinc certe aderat motus cordis: Et iam *TREWIVS* *f)* negauit, haemorrhagiae praesentiam de vita posse testari.

An placenta, infanti contigua, testatur de debilitate fetus, aut morte ante partum? Neutiquam. Etenim partim non adeo rara sunt exempla, vbi placenta iam ante partum soluta fuit, absque malo, adeoque idem obtinere potest, vt mox infansem sequatur: partim deprehenduntur in eiusmodi infantibus signa respirationis *g)*; igitur tum certe haec  
morte

*e)* 1. l. p. 402.

*f)* Comm. I. N. a. 1734. h. 28. p. 221.

*g)* cf. obs. b. par. LXVII. & §. XVI.

morrhagia vterina non obtinuit; sed si *νεκρωγία* adest, infantilis haemorrhagia contingit <sup>h)</sup>. Praeterea genubus inflexis quum mater peperit, facile non raro sequitur placenta.

## XXXI.

*Animaduerso.*

Vmbilicum, in primis breuiorem, aut infantis membris circumductum, aut per pudenda propendentem, vel a matre, vel fetu, conuulsionibus obnoxiiis, aliquando dilacerari, vult ALBERTI <sup>i)</sup>: quod attendi *νεκρωγία* praesente debet, & disci potest confessione matris, quomodo ipsa, & infans iam natus, se habuerint: nam ob situm infantis metuendum est, ne hic contingat haemorrhagia, quamquam, si abruptus est vmbilicus, non facile contingit.

## XXXII.

<sup>h)</sup> Debilitas etiam infantis, imo mors eiusdem, ex haemorrhagia vterina, matrem non absoluit ab infanticidii suspicione. Etenim si citra matris culpam placenta ab utero separatur, indeque haemorrhagia vterina contingit, aderit quidem infanticidium impune: sed adesse potest infanticidium culposum, dum graviditatem & partum celat mater, atque infans vel perit haemorrhagia vterina, vel partu secundo excludendus haemorrhagia gemellorum; imo adesse potest infanticidium dolosum, quando mater usa est, maxime ad finem graviditatis, pel-  
lentibus, alias abortum promouentibus, quae praesente dispositione matris haemorrhagiam, ope solutionis placentae, vterinam inquam, producere possunt.

<sup>i)</sup> l. c. §. IX.

## XXXII.

*Vmbilici constitutio varia quatenus indicet?*

Signa iam addantur necesse est, quibus diiudicetur, an abruptus sit vmbilicus, & quomodo id factum? Nisi resecta postea pars est, vmbilicus deprehenditur admodum inaequalis, fibrae scilicet eiusdem ruptura varia ratione soluuntur, hinc est fibratus. Idem vero quum ita abruptus est, ut caussa rupturae a parte rupta sit magis remota, pars quaedam aequalis, quasi incisa, conspicitur, vel quoad dimidium, reliquum fimbriatum est. Idem locum habebit, quando homo, fetu cum placenta nato, altera manu vmbilicum infanti proxime, altera placentae proxime, tenet & rupturam perficit; quod nisi probatur, in casu obuiio putandus est, fetus exclusus esse a matre erecta, ubi pondere, vmbilicus in primis iustae longitudinis, dicta ratione abrumpitur.

Sed fibratus etiam sit, oportet, quum soluitur instrumento obtuso. Sic concha soluitur feminae mediterraneae <sup>k)</sup>, aliae cultro obtuso, aut arbore vtuntur, ut hinc multa vi, & distensione opus sit, quibus inaequalis fit solutio. An ope catenae solui potest, unde certe inaequalis etiam fieret? Casus occurrit  
apud

<sup>k)</sup> G. PISO de Ind. vtr. re natur. & med. Amst. 1685. L. XIV.



apud b. parentem <sup>l)</sup>; qui idem negauit, siquidem mater sola catenam vix potuisset adeo tendere, vt etiam vmbilicum, quem vtrâque manu debuisset admouere, adhibere potuisset.

## XXXIII.

*Haemorrhagiae vmbilicalis infantilis caussae accessoriae.*

Ad caussas accessorias haemorrhagiae vmbilicalis, ab eadem tamen non seiungendas pertinent calor, aliquando balneum, arteriarum vmbilicalium ortus ex aorta, aut praesentia vnus tantum arteriae, quod adeo rarum non est <sup>m)</sup>, solutio facta ante, quam pulsus arteriarum vmbilicalium euauit, respiratio impedita, suffocatio: quae omnia eam vim habent, vt intelligas, qui contingere haemorrhagia potuerit, non eam, vt his solis haemorrhagiam tribuas. Itaque haec tum per se perspicua, tum alibi considerata, mitto, animaduersionem tantum adiungens.

Scilicet in gemellis, quibus aut vnica placenta, aut plures, vel connexae, vel disiunctae sunt, vno fetu iam nato, alter haemorrhagia

F 2

vie-

<sup>l)</sup> l. c. no. LXXVII.

<sup>m)</sup> HALLERI el. phys. T. VII. p. 496. In hoc casu neque facile fines arteriae se retrahere poterunt, licet abruptus sit vmbilicus, & maiorem & citiorem haemorrhagiam facilius permittit.



uterina interdum perit, si iam nati infantis umbilici pars non reuincitur, & alter in primis tardius excluditur <sup>n)</sup>. Vbi distinguendum est: vel enim uterque fetus exsanguis est, vel alteruter. Si alteruter, tunc vel adest certitudo, fetum viuum natum periisse haemorrhagia infantili <sup>o)</sup>; quorsum praeter *νενεαγγίαν* spectant maculae certae, & vitae fetus post partum signa; adeoque patet, illum casum non obtinere. Si uterque haemorrhagia umbilicali periit, tum vel adsunt signa haemorrhagiae uterinae, §. XXVI. proposita, ut uterque statuendus sit hac periisse, vel non. Si hoc, tum vel in utroque fetu signa haemorrhagiae infantilis adsunt, & vitae post partum signa, vel non. Si illud, negari debet haemorrhagia uterina: si hoc, in vno fetu adesse debent signa haemorrhagiae absque signis vitae post partum, quibus accedant depositio matris, alterum fetum tardius successisse, funiculum iam nati infantis deligatum non esse ex parte matris, & haemorrhagiae etiam certitudo, signa, qui tum dici poterit obiisse *haemorrhagia gemellorum*.

XXXIII.

<sup>n)</sup> HALLER T. VIII. P. I. p. 249. Cf. n. g) p. 44.

<sup>o)</sup> ut in obs. b. parentis LXV. §. XV.

## XXXIII.

*An de vita & morte testatur umbilicus?*

An de vita & nutritione testatur ipse umbilicus? „In specie de nutritione atque vita fetus, instante partu testari creditur funiculi umbilicalis habitudo, ratione cuius hic modo succulentus, candidior ac firmus, modo flauus, flaccidus, aridior, & facile lacerabilis cernitur: quorum illud, eum in utero uiuum, hoc emortuum, innuat. Licet ex his formatum iudicium aliquando fallat, dum nimirum idem in uiuo etiam edito minus rite deligatus, & aeris externi afflatum per aliquot horas tantum sustinens, faciem eiusmodi praeternaturalem frequentius induit: contra breui ante enixum, s. sub enixu, exspirans fetus succulentum & firmum praestat eundem, qui tamen de vita illius minime testari poterat. „ Sunt BOHNII <sup>p)</sup> verba, quae recentiores merito aestimare debuissent. „Tum chordae vasa, inquit ADOLPH <sup>q)</sup>, quae ultra ligaturam adhuc in extremo fine supersunt, attentionem merentur. Si coagulo sanguinis plena haec vasa, inde concludimus, foetum vita excessisse, aut dum

F 3

„utero

<sup>p)</sup> l. c. p. 338.

<sup>q)</sup> l. c. §. 6. p. 26.

„vtero gestabatur adhuc tranquillo, aut sub  
 „partu protracto. Namque foetus recenter  
 „nati ac viui vasa vmbilicalia cum fune, prae-  
 „ter notabilem cunctationem, discissa, sangui-  
 „nem illico fluxilem expellunt, seque exina-  
 „niunt, grumis vix vllis relictis. Tantum-  
 „que tribuo huic signo, vt, cum in fetus dis-  
 „sectione conspicerem, ligaturam vltra gru-  
 „mis sanguineis farta ac plena esse vasa vm-  
 „bilicalia, nullus dubitarem, reliquis etiam  
 „obseruandis nondum lustratis, pronunciare,  
 „fetus hunc post sua fata demum esse na-  
 „tum. „ Ego vero non perspicio, quid im-  
 „pediat, quo minus 1) vmbilicalia vasa repleta  
 sint in iis, qui post partum expirant, praeci-  
 pue quum haemorrhagia ex fune moriuntur:  
 2) in iis, qui haemorrhagia vterina moriun-  
 tur, aut vulnere, depleta aequae sint vasa vm-  
 bilicalia, ac in viuis natis.

## XXXV.

*A n i m a d u e r s i o.*

Κεφαλαιον absentia non absoluit matrem  
 a suspitione infanticidii culpae. Etenim in-  
 terdum, vbi nimirum debilis, ad sensum  
 mortuus, excluditur infans, ex partus ratio-  
 ne aegrotus, artificiali haemorrhagia vmbi-  
 licali, praesectione vmbilici, adhibito balneo  
 calidiori, rel. promota, iuuari potest infans,

ut respiret atque in vitam redeat, ut alibi doceri debebit. Id quidem artificium & mulieres plebeiae, & obstetrices paganae ignorant, eas tamen fugere hodie non debet, quae erudiuntur. Itaque quum mater per partum clandestinum auxilio peritae talis obstetricis de industria se subduxit, in eo culpa mortis infantis exstat, adeoque infanticidium culposum omissione commisit, dum aut umbilicum non soluebat, aut longiorem relinquebat, aut tardius soluebat, ut pulsus umbilicalium arteriarum iam deficerent, aut citius iusto deligaret, nec frictiones, balneumque, adhibenda esse, sciret.

## XXXVI.

*Conclusio. De vulnorum letalitate.*

Liceat addere, quod egregie confirmetur sententia mea de vulneribus proposita, scilicet non requiri ad homicidium, ut quis causam mortis proximam dederit, sed sufficere, quod remotam dederit, dum omnes infanticidium reputant, ubi medici docent, infantem, vivum natum, obiisse haemorrhagia umbilicali, nec Ictos dubitare, matrem capitis damnare, quum eius auctor fuit. At mater certo numquam poterit neglecta umbilici deligatione mortis causam proximam dedisse. Omissa enim deligatio, aut funiculi praecisio num-




quam haemorrhagiae umbilicalis vera causa esse poterit, siquidem inde nihil efficitur, nisi simplex vasis apertura, quae sane haemorrhagiae causa non est, utpote quae consistit in effluxu, supponente motum, cuius certe causa apertura non est, ut quotidie contrarium animaduertimus. Nihilominus quoniam causae motus vel naturales vel & praeternaturales nocere non potuissent, nisi adfuerit apertura, ut haec sit causa, *sine qua non*, dicta, omnes ponunt, & hanc conditionem, seu principium mortis, esse puniendum, aliquando & capitis. Nonne igitur mirandum est, qui fiat, ut iidem, qui procul dubio nihil contra iustam infanticidii huius poenam monent, non possint de aequali omnino vulnerum ratione conuinci? Itaque quidquid credant, doceantque, credant & doceant, nihil huc usque commouere me potuit, ut mutarem sententiam meam, quam facile essem mutaturus, si quis congrua obiiceret argumenta, ut ipse, qui iam libellum de vulnerum letalitate methodo, in parte 2. libelli mei de vulneribus retenta, conscripseram, non dubitavi, eum omnino mutare simul, atque vim legum saepe meditarum, magis magisque aestimaueram.

---



COMMENTATIO  
DE  
PULMONIBVS.





VICISSITVDINES SENTENTIARVM


D. E.

PVL MONVM

INFANTVM NVPER NATORVM

CONDITIONIBVS

EARVMQVE VSVS FORENSIS.



SECTIO I.

RECENSVS SCRIPTORVM SAECVLI XVII.



I.

**N**ulla de vita & morte infantum nuper natorum, earumque signis, apud scriptores medicinae forensis veteres, vt PARAEVM, FIDELÈM, ZACCHIAM, mentio ideo iniicitur, quoniam iudices medicis eam quaestionem non proponebant, in infanticidio subsumto vel solis rei adiunctis confisi, vel recentioribus temporibus inspectionem tantum forensem tum infantis, tum secundarum,

narum, admittentes: in cuius rei testimonium liceat saltem excitare G. BVDÆI aliquot casus, de annis 1679 <sup>a)</sup>, 1681 <sup>b)</sup>, 1684 <sup>c)</sup> ubi in ultimo sectio etiam admissa, nec tamen de vita & morte quaestio habita est, nec pulmonum conditio adnotata; sed de letalitate tum neglectae umbilici deligationis, tum vulnerum capitis, ex auctoritate iudicatum est <sup>d)</sup>.

## II.

C. A. C.

150.

Inter medicos tamen iam diu constitit, infantum, qui respirant, pulmonum constitutionem admodum recedere ab illa eorum, qui adhuc utero geruntur. Namque, pulmones in iis, qui adhuc utero geruntur, rubros, in perfectis vero animalibus, subalbos esse, ac respiratione substantiam carnis pulmonum ex rubra;

a) *Miscell. med. chir. pract. & for.* T. I. p. 106.

b) l. c. T. II. p. 51.

c) l. c. T. II. p. 119.

d) Atque hoc quidem ne mireris. Quem enim in iure criminali potissimum sequebantur, CARPZOVIVS qu. XVI. n. 12. adhuc statuit: in parricidio satis constare de corpore delicti, si cadauer hominis oculis subiicitur, licet nec vulnus, nec cicatrix, nec aliud signum in cadauere appareat, ex quo colligi possit, impias manus ipsi fuisse illatas. Contra quam sententiam insurrexerunt merito HARPRECHTUS & I. S. I. de BOEHMER.

ubra, graui ac densa, in albam, leuem ac  
 aram mutari; iam elocutus est GALENVS <sup>e)</sup>.  
 Atque, vt toto abhinc tempore, ita anatomici  
 tiam, saeculo XVII. clari, huius pulmonum  
 onstitutionis mentionem iniecerunt, v. c.  
 A. SPIGELIVS <sup>f)</sup>, I. S. PI. 1631.  
 NAEVVS <sup>g)</sup>, G. HARVEVS <sup>h)</sup>, 1641.  
 qui 1651.

e) *De usu partium* C. H. L. XV. c. 6. ed. Frob. Cl. I.  
 p. 425.

f) *De form. fetu* P. III. c. V. p. 52. ed. Frcf. 1631.

g) *De integr. & corrupt. virg. not.* ed. Lugd. B. 1641.  
 praef. p. 16. vbi haec adnotanda exstant: „Et  
 „praeterea sanguinem iterum attenuatum & ela-  
 „boratum in dextro cordis ventriculo, cuius systo-  
 „le pellitur in venam arteriosam, quem pulmones  
 „assumunt ad sui nutritionem, qui ideo posthaec  
 „magis albicantes, spongiosi & leues facti sunt, quam  
 „antea, & propter motum frequentem. „ Atque  
 ex maiori pulmonum pondere, sanguinisque ad  
 pulmones maiori congestione, insueto munere, &  
 excrementa contenta expellentium pulmonum im-  
 becillitate, repetit terrifica & letalia saepe nuper  
 natorum symptomata. Pergit: „Propterea factum  
 „est, fitque adhuc, vt maior fetuum editorum  
 „pars statim ab ortu intereat, aut saltem tres qua-  
 „tuorue aetatis annos non attingat: eorum vero,  
 „qui statim a natiuitate, vt diximus, excidunt,  
 „plurimi derepente moriuntur, vnde nutrices &  
 „matres saepe suffocationis eorundem accusantur.  
 „Et praeterea quoniam in cadaueribus eorum, si  
 „forte secta fuerint, pulmones crasso sanguine  
 „pleni & saturato rubore suffusi reperiuntur, hoc  
 „efficit, vt id ipsum quoque confirmetur ab iis,  
 „qui adsunt, aut praesunt, quoniam dicta negli-  
 „gunt. „

h) *De generat. animal.* L. ed. Lond. 1651.



qui primus, ni fallor, dixit, hanc pulmonum coloris differentiam indicium praebere, viuumne, an mortuum infantem matres peperint? Quamuis vero, albedinem pulmonum in fetu non nato aequae, ac adulto, se deprehendisse, G. CHARLETONVS <sup>i)</sup> edixerit; tamen refutatus postea est a I. DIEMERBROECKIO <sup>k)</sup>, multiplici experientia freto.

## III.

Inde vero ab anno 1663. Medici meminerunt natationis & submersionis pulmonum recentiorum. Nam Th. 1663. BARTHOLINVS <sup>l)</sup> non dixit solum, omnium anatomicorum consensu, pulmones in fetu rubere, sed & mergi, qui contra in adultis pallerent & naterent.

1667. Tr. SWAMMERDAM <sup>m)</sup> autem, ob aëris praesentiam fieri, edixit, ut, postquam animal semel tantum respirauit, pul-

i) *Oecon. anim.* p. 171. exerc. 8. §. 21. de respir.

k) *Anat.* p. 512.

l) De pulmon. substantia & motu d. ed. Hafniae 1663. & in *Malpighii opp.* T. 2. p. 349. ed. Lugd. Bat. 1687. 4.

m) *De respir.* c. 8. §. 2. & 3.

pulmones, aquis impositi, fundum non pererent.

Praecipue vero ab anno 1670. ex hac pulmōnum differentia natum est experimentum pulmonum natantium & submergentium. Etenim hoc anno in Anglia *Mal. THRUSTONIVS* <sup>n)</sup>, in Germania *C. RAYGERVS* <sup>o)</sup>, infan-  
tum, qui mortui nati erant, pulmones submersos, inflatos autem aquae supernatantes, animaduenterunt, vt *RAYGERVS* iam tum hoc experimentum haberet pro argumento indubitato, ad conuincendas infanticidas & indagandam veritatem, num infans in vtero mortuus, an demum post partum quocumque modo strangulatus vel occisus fuerit? Ille vero memoriae prodidit, fetus pulmones esse saturatae rubedinis, & graues, vt submergantur. Addit rationem, dum credit, vesiculas nondum esse impletas, vt se mutuo tangant, vnde fiat, vt sola fere vasa sanguifera & sanguis circumfusus obseruentur, & simul tanta densitas, rubedo & grauitas adsint.

I. DIEM-

n) *Diatr. de respir. usu prim.* Lond. 1670. Sect. II. p. 85.

o) *Misc. N. C. An. 6. Dec. I. obs. 202. p. 299.*

1672.

I. DIEMERBROECKIUS p),

vsque ad quintum mensem, pulmones fetus rubicundos & mediocriter densos, reperiri, postea paullatim mollescere, rariores & coloris subpallidi esse, exemplo comprobavit. In cadauere, VII. mense grauiditatis demortuae, offendit fetum, cuius pulmones minus quidem turgidos, atque in natis, mollitie tamen & colore ab horum pulmonibus parum distinctos inuenisse, & coram compluribus spectatoribus demonstrasse, refert. Pariter in fetu maturiori & perfecto, paullo ante partum extincto, colorem pulmonum rubicundum quidem magis, quam in nato, at simul non nihil variegatum, siue cinereum, mollem tamen & adeo spongiosam eius substantiam apprehendit, ut aquae injectae natarent.

1676.

Th. WILLISIVS q) animad-

uertit, prius rubicundam pulmonum fetus carnem, mox a respiratione mutari in subalbidam instar carnis elixae, quae quidem mutatio & possit a mera pulmonum inflatione perfici, „in quantum sc. pulmonum membranae & parenchyma *distenta* & in maio-

„ren-

p) *Anat.* L. II. c. 13.

q) In opp. de sang. accens. p. 36.

„rem capacitatem aucta sanguinem stagnan-  
 „tem discutiunt, & distrahunt. „

## III.

M. E T T M Ü L L E R <sup>r)</sup> monuit, 1676.  
 fetum, secundinis obuolutum, vel in  
 vtero, non respirare: „quoniam pulmones  
 „ – sunt contracti, atque compacti subsident,  
 „nec thoracis internae superficiei contigui &  
 „coëxpansi. „ Addit: „Quidam auctorum  
 „etiam pulmonum fetus in aqua subsiden-  
 „tiam contra respirationem in vtero addu-  
 „cunt. Quod itidem experienti, non satis  
 „cauto, imponere posse existimo. Cum enim  
 „ex hydrostaticis legibus constet, corpora  
 „omnia, aqua ipsa leuiora, in eadem super-  
 „natant, si sufficienti aquae quantitati immit-  
 „tantur; pulmones autem, vti membranosa &  
 „carnosa omnia, specifica grauitate aquis ce-  
 „dant; hinc tam fetus nondum respirantis,  
 „quam nati, pulmones supernatant possunt,  
 „si modo sit magna aquae quantitas illos cir-  
 „cumfluat. Adeoque non sequitur: pulmo-  
 „nes quia supernatant; Ergo foetus respi-  
 „rauit; nec vice versa. Nam quod quo-  
 rum-

<sup>r)</sup> In d. de abstrus. respir. hum. negot. resp. I. Neu-  
 kranz, Lips. 1676. in Opp. T. IV. p. 752.

„rumdam experientia velit, pulmones fundum  
 „petiisse, id ipsum iusto minori aquae quan-  
 „titati tribuendum, quam facile immissi pul-  
 „mones mole sua dispellere & ad lococeden-  
 „dum adigere, sicque subsidere, potue-  
 „runt <sup>s)</sup>. „

1677. Th. BARTHOLINVS <sup>t)</sup> in-  
 nuper nata flavescentes & candidos,  
 se vidisse pulmones, retulit, non rubros. Ta-  
 les etiam, monet, esse debere, quia in vtero  
 etiam respirer fetus, & GALENV M ceteros in  
 errorem seduxisse, vt ruborem respiratione  
 in albedinem mutari dicerent. Adiungit  
 simul: substantiam in fetu esse densiorem  
 non nihil & crassiolem, adeo, vt aquae in-  
 iecta mergatur, respiratione vero aëre suscep-  
 to, fieri leuem, mollem, laxam, raram & spon-  
 giosam, vt in aqua natet.

1685. M. ETTMÜLLERVS <sup>u)</sup> ite-  
 rum: „sensibilis, inquit, est pulmo-  
 „nis infantis viui, in vtero mortui, differentia;  
 „siquidem frustulum pulmonis infantis, non-  
 „dum editi, aquae immissum, fundum petit,  
 „viui

<sup>s)</sup> Hunc errorem, etiam a BÜTTNERO commissum,  
 refutatum legas, §. XXI.

<sup>t)</sup> *Anat. C. H.* ed. 3. p. 415.

<sup>u)</sup> *Instit. med.* §. 143. Opp. T. I. p. 42.



„viui vero supernatat eidem: & ex hac δο-  
 „κιμασία collectio fit infantis occisi. Cum  
 „enim pulmo embryonis sit crassior, nec sa-  
 „tis porosus, respiratione semel facta spon-  
 „giosus fit, & sic supernatat.”

## V.

H. FABRICIVS AB AQUA 1687.  
 PENDENTE \*) fetus pulmones  
 rubea, densa, & graui substantia esse dixit, quae  
 in natis esset subalba, tenuis, rara & leuis.

C. STALPART V. d. WIEL y) docuit, fetum  
 etiam in vtero respirare ratione diuersa: qui-  
 bus deinde etiam addidit sequentia: „Hinc  
 „fit, vt iudices rationem a medicis petant,  
 „an mater fetum interfecerit, an vero mor-  
 „tuus prodierit? Si enim ille intra vterum  
 „obierit, fundum aquae petunt pulmones,  
 „quia bronchia ac pulmonum cellulae, aqua  
 „repletae, pulmones reddunt grauiore*s* ita, vt  
 „supernatare nequeant, verum si vel per mo-  
 „mentum tantum respirauerit fetus, postea-  
 „que a matre interficiatur, pulmones neuti-  
 „quam fundum petent, sed semper superna-  
 „tabunt, — vnde pulmones leuiore*s* reddun-

G 2

„tur

\*) In opp. anat. & phys. ed. Lips. 1687. fol.

y) Obs. rar. med. P. II. obs. 32. p. 352.

„tur ita, vt ab aqua deprimi nequeant: nec,  
 „quidquid tandem feceris, aër omnis ex ar-  
 „teriae asperae ramis, lobisue pulmonum ex-  
 „pelletur, illosue tam arctos, vt quidem an-  
 „te, reddi permittet. „

1689.

Th. CRAANEN <sup>2)</sup>: „Contingit:

„saepe, inquit, vt, quamuis infans:  
 „uiuus nascatur, statim eius pulmo aëre to-  
 „taliter non infletur, sed secundum aliquam  
 „eius partem; & quamuis quaedam pars, ad  
 „quam aër non pertingit, fundum petat in  
 „aquam coniecta, non tamen sequitur, infan-  
 „tem esse mortuum in lucem editum: hinc:  
 „omnes lobi veniunt contrectandi, & singuli  
 „in partes conscindendi, quae successiue in  
 „aquam coniiciantur, & si omnes fundum  
 „petant, iudicium est certum, fetum in vie-  
 „ro mortuum esse, posset enim fieri, vt in-  
 „fans per momentum respirauerit, & sic:  
 „omnes lobi non possunt aëre repleti esse, sed  
 „aliqua illorum pars, quae aquae supernata-  
 „ret, interea dum maxima pars pulmonis  
 „fundum peteret, & sic iudex, si vellet a  
 „priori iudicium ferre, falleretur; hinc me-  
 „dicus, qui saepe in his casibus aduocatur in  
 „consilium, sese prudenter gerere debet, &  
 „quam

<sup>2)</sup> Tr. de homine p. 253 sq.

„quàm primum deprehendat, aliquam par-  
 „tem pulmonis aëre inflatam & aquae inna-  
 „tante, certo pronunciare poterit, fetum  
 „per aliquod momentum aut exiguum tem-  
 „poris spatium extra vterum vixisse & respi-  
 „rasse. „ — Monet etiam ex anatomicorum  
 suffragio, superiorem lobum dextri pulmonis  
 primo inflari, quo etiam in experimento cum  
 pulmonibus instituto aduertere iubet. Et:  
 „si aliquis lobus, inquit, colorem dilutiorem  
 „magis habeat prae aliis, i. e. ad albedinem  
 „magis accedentem, hoc est indicium mag-  
 „num & certum, aërem eius spatia occu-  
 „pare. „

HEYD. OVERKAMP IUS <sup>a)</sup> 1690.  
 ex submersione pulmonum conclu-  
 dit, infantem non respirasse, & per conse-  
 quens non vixisse; alibi tamen contendit, in-  
 terdum partus, in vtero defuncti, pulmones  
 aquae supernatare, quando nimirum sub ipso  
 enixus conatu mortem obierit, ipsumque in  
 vna femina quatuor eiusmodi partus obserua-  
 se, refert <sup>b)</sup>.

G 3

STEPH.

a) In oecon. animi p. 266.

b) l. c. p. 171. 268.

1690.

STEPH. BLANCARDVS c):

„Foetus in vtero a matre dependent  
 „non a sese, ita vt ipsi per pulmones non  
 „respirent. Et illud indubitatum est ex pul-  
 „monibus foetuum, qui ante partum obie-  
 „runt, eorum enim pulmones aquae inieci-  
 „fundum petunt; e contra si aër respirando  
 „vel arte illatus sit, numquam submersuri  
 „sunt.“

## VI.

Haec vero in primis tantum a medicis  
 acta atque adnotata sunt: vix autem in foro  
 experimentum pulmonum institutum fuit,  
 idemque ob medicorum dissensum  
 1682. factum est. SCHREYERVS d)  
 anno 1682. experimentum instituit,  
 atque in renunciatione eius mentionem inie-  
 cit, per submersionem pulmonum, infantem  
 mortuum natum esse, statuens; sed de eadem  
 variae incongruae natae sunt sententiae, vt

D. THO-

c) *Acad. Cartes.* p. 168. & in opp. T. I. p. 240.

d) *Eroert. und Erlaeuterung der Frage: Ob es ein-  
 gewiss Zeichen, wenn eines todten Kindes Lun-  
 ge im Wasser untersinket, dals solches im Mut-  
 terleibe gestorben sey?* Zycae 1691. 4. Hal. 1725.  
 1745. rec. p. 3. „Es sind olingefehr neun Jahr.“  
 scripsit 1691.



D. THOMASIVS <sup>e)</sup> matris defensor, sententiam RIVINI & LANGII, & facultatum medicarum, Francofurtensis & Vitebergensis, expiscaretur: hinc tarde in foro adhibita est.

Itaque RIVINVS & LANGIVS responderunt: 1683.

1) Pulmones cum hominum, tum animalium, & totos submersos, & dissectos, aquae supernatare, si respiratione dilatati essent.

2) Animalis cuiuscumque, vel mortui nati, vel ex utero facti, pulmones in aqua submergi, cuius rei rationes addiderunt.

Igitur, ex submersione pulmonum, concludi posse, statuunt, animal extra uterum non vixisse.

*Idem* etiam viri ad propositam quaestionem: an ex infantis 1684.

G 4

pul.

e) Idem in suis scriptis (Ged. und Erz. über allerh. iurist. Haendel. n. I. §. 6.) reliquit, SCHREYERVM quidem experimentum pulmonum instituisse, nihil vero de eo in actis deposuisse, quoniam haec nova esset de vita infantum sententia, non omnibus arridens, seque ideo eius nullam iniecis-  
sionem, quod metuerit, ne collega suum relationi nomen subscribere dubitaret.



pulmonum frustulo, aliquot dies post partum subsidente, argui possit, infantem ante partum mortuum esse? responderunt: in experimento, hunc in finem instituto, vituli viui nati pulmones, quorum pars inhumata, altera aquae tradita, altera aëri exposita fuit, ut omnes putredini subessent, aquae supernatafse: neque igitur putredinem, aut aliam causam, efficere, ut submergantur; hinc certo statui posse, submergentes pulmones:

1684. esse a mortuo nato f). De eodem casu quaesita facultas medica *Vindrina* respondit: „Est valde imo maxime: „probabile indicium, partum ante exitum ex: „utero materno fuisse extinctum, si eius pulmones submergantur in aqua g). „

1684. Ordo vero medicus *Vitembergensis* in eodem casu respondit, mortuorum quidem natorum pulmones in aqua submergi, neque putredine effici posse, ut aër, respiratione pulmonibus traditus, exeat, iidemque submergantur; nec tamen posse ex pulmonum submersione argui ad infantem, iam in utero mortuum: quoniam infans extra uterum absque respiratione aliquamdiu vivere posset in sequentibus casibus:

1) Si

f) l. c. p. 7 sq.

g) l. c. p. 14.

- 1) Si infans debilis est, aut pulmones & fauces mucus opplet.
- 2) Quando vmbilicalis funiculus circa col- lum ductus.
- 3) Quum infans pedibus nascitur, vt col- lum a partibus genitalibus constri- gatur.
- 4) Vbi fetus cum inuolucris nascitur, ea- demque non statim remouentur.

Atque in his casibus fetum occidi ante respi- rationem posse. Quamuis vero obseruatio- nes adducere non possent, in his casibus pul- mones fundum petiisse, edocentes, deficere tamen huc vsque obseruationes in contra- rium, edixerunt. Igitur in hoc etiam casu ad reliqua in primis rei adiuncta respexe- runt, & pulmonum experimento simul vsi sunt, vt infantem vel ante partum, vel in par- tu, mortuum esse dicerent <sup>h)</sup>.

Exstat vero de anno 1690. 1690.  
apud B V D A E V M. i) casus, vbi ex

G s.

pul-

<sup>h)</sup> l. c. p. 20 sq. Haec licet acta sint citius, quam ea, quae in §§. antec. adduxi, tamen quum non innotuerint ante ann. 1690. ideo illis subieci; siquidem medicorum nemo, quos in §§. antec. adduxi, ad ea respicere potuit.

i) l. c. T. IV. p. 27.

pulmonibus natantibus respiratio & vita post partum inferuntur.

## VII.

1691. Sequitur iam I. ZELLERVS cum I. D. MAVCHARTO <sup>k</sup>). Hi, primum historiam agni referunt, ad horam dimidiam viuentis, cuius pulmones in varia aquae quantitate fundum petierunt. Inter lobulos vnumprehenderunt, aqua vel muco simili, ac pectus, repletum, qui inflari non potuit: reliqui post inflationem supernatarunt. Inde concludunt:

1) „pulmones infantis in aqua demersos  
„non praebere indicium, istum vel ani-  
„mal extra vterum vitam numquam ha-  
„buisse, nec, viso phaenomeno, ab vl-  
„teriori examine suspectae personae &  
„vigore desistendum esse.

2) „Fetum respirare in vtero, hancque  
„pulmonum submerisionem illam nega-  
„re non posse respirationem.

3) „Vagitus vterinos non esse delirantium  
„vetularum dulcia somnia & gerras  
„ger-

k) I. ZELLER d. quod pulmonum infantis in aqua sub-  
sidentia infanticidas non absoluat, nec a tortura libe-  
ret, nec respirationem in vtero tollat. resp. MAVCH.  
Tüb. 1691. Hal. 1725. 1745. rec.

„gerrarum, sed eosdem veros in vtero  
 „nasci atque produci.“

Quod vt probaret, historiam addidit, vbi  
 pulmones infantis fundum petierant, nihilo-  
 minus mater & auia, torturae subiectae, elo-  
 cutae sunt, infantem in vase, fluidis repleto,  
 eiulasse (res omnino non concipienda).

I. C. WESTPHAL<sup>1)</sup>, phys. 1693.  
 prou. Delitientis, ex pulmonibus  
 rubicundis & nigredine deturpatis, non ex-  
 pansis, sed compactis, vt alia caro, quorum  
 lobi integri & disseci in aqua fundum pe-  
 tebant, conclusit, infantem non respirasse,  
 quamuis, eundem viuum editum esse, ex aliis  
 argumentis nihilominus erueret.



## SECTIO II.

### RECENSVS SCRIPTORVM SAECVLI XVIII.

#### VIII.

Iam producendus est I. BOH- 1700.  
 NIVS<sup>m)</sup>, acris experimenti pul-  
 mo-

D) VALENTINI pand. medico legal. cas. 46. pag.  
 853 sq.

m) D. *signa viui & mortui nati*, adi. tr. de vuln. letal.  
 p. 335 sq.



monum censor. I. Ad quaestionem: „an  
„eius, qui post enixum respirauit, pulmo-  
„nes in aqua semper fluctuent, siue, an  
„infantem, ex cuius cadauere tales extracti,  
„uiuum editum, hinc post partum demum  
„vel sponte exspirasse, vel enecatum fuisse,  
„certo asserere liceat? „ Negatiue respondit,  
quum mortui nati pulmones compactiores &  
submergentes inflatione ad natandum disponi  
possint, quod suis aliorumque obseruationi-  
bus comprobat: atque, idem obtinere in  
subsumto infanticidio, tum rationibus, tum  
casu quodam comprobat, vbi mortui infan-  
tis pulmones, ab obstetrice inflati, satis albi-  
cantes, aquae supernatabant. Tum 2) ne-  
gat ideo, quod fetus, in partu haerens, aeris  
quid admittere possit: 3) quod, si putredo  
adesset, experimento confidi nequeat. II. „An  
„submersio pulmonum de mortuo nato teste-  
„tur? „ Negat, quia 1) infans natus inter-  
dum viuit sine respiratione, quod compro-  
bat exemplis: 2) funiculo vmbilicali prolapso  
vis inferri possit, vt moriatur infans; hinc  
temerarium ac impium fore, dicit, has ab-  
soluere. 3) Pulmones saepius non omnino  
aëre distendi, vt frustum submergatur, aliud  
supernatet, imo casum adiungit; vbi pulmo-  
nes fundum petebant, mater tamen, infantem  
viuum



uium esse enixam atque enecasse constan-  
tissime adseuerabat. Contra colorem pulmo-  
num ea etiam attulit, quae hac de re CHA-  
RLETONVS & DIEMERBROECKIUS mo-  
nuerunt. — Circa idem tempus etiam *Barth.*  
KRÜGER <sup>n)</sup> experimenti pulmonum memi-  
nit. E contrario Facultas medica Giessensis  
de morte infantis a. 1701. circa pulmonum ex-  
perimentum iudicauit <sup>o)</sup>.

I. C. BECKER <sup>p)</sup>, qui in sub. 1704.  
merfis negat, indicium ex pulmoni-  
bus posse desumi, statuit certum & indubita-  
tum esse experimentum pulmonum in nuper  
natis.

Sequitur I. I. SCHOEPPER <sup>q)</sup>, 1705.  
Ictus, qui in dissertationis cap. I.  
sententias medicorum de experimento nostro  
exponit (vbi nihil noui: commendauit au-  
tem aquam tepidam, aut calidam, ad experi-  
mentum, quod merito a plerisque neglectum  
est). Cap. II. de effectu iuris agit, si pulmo  
infantis natet. Cap. III. de effectu iuris, si  
pulmo

<sup>n)</sup> In meth. sec. cad. Br. 1700. p. 18.

<sup>o)</sup> Valentini Nou. med. leg. cas. 47. p. 868.

<sup>p)</sup> In d. de submers. morte sine pota aqua. Giess.  
H. 1704. p. 49.

<sup>q)</sup> D. iur. de pulmone infantis natante & submergente,  
Rost. 1705. rec. Hal. 1733. 1747.

pulmo infantis submergatur, agit. Quae  
ulterius hic definiantur, non opus est.

1705. Liceat etiam meminisse, Fr. R V Y.  
SCHIVM „numquam, scribere, su-  
„pernataturum pulmonem, bene constitutum  
„si fetus in vtero materno moriatur<sup>r)</sup> : „  
quae ad putredinem spectare videntur.

### VIII.

1712. I. D. M A V C H A R T <sup>s)</sup> refert histo-  
riam infantis, per 18. horas viuentis,  
atque ex haemorrhagia umbilicali mortui,  
cuius pulmones, florido rubore praediti,  
compacti & graues, tam integri, quam  
in frustra dissecti, in aquam injecti fundum  
petierunt.

1715. Circa hoc tempus (nisi citius; careo  
veteri operum editione) G. B A G L I  
V V S <sup>r)</sup> haec elocutus est: „Pulmones fe-  
„tus, mortui in vtero matris, si extrahantur  
„ut in aquam ponantur, petunt fundum  
„mortui vero extra uterum, & aquae in-  
„iecti, innatant in ea. Quod signum ad de-  
„tegendam infanticidia est euentissimum.,,

I. van

<sup>r)</sup> Thef. anat. V. n. 40.

<sup>s)</sup> Eph. N. C. Cent. I. obs. 121. p. 247.

<sup>r)</sup> Opp. p. 445. d. de sang. & respirat.

I. van H O O R N <sup>u)</sup> negat, pul- 1718.  
mones infantis mortui nati per pu-  
trefactionem ita posse mutari, vt postea in-  
natent, sed post illam etiam fundum petere:  
aëris vero inhalatione ita mutari, vt eius, qui  
respirauit.

I. D. G O H L I V S edidit casus, 1717.  
quos, huc pertinentes, coniungere  
liceat. Occurrit casus, vbi ob VALEN-  
TINI & BOHNII obiectiones nihil certi sta-  
tui posse videbatur medico, hinc decisio iu-  
dici relinquebatur <sup>x)</sup>. Sequuntur vero alii,  
vbi, vixisse fetum post partum, ex natatione  
concludebatur. Collegium medicum Bero-  
linense quæsitum, ex submergentibus pul-  
monibus de vita & morte statui iuxta BOH-  
NIVM non posse, respondit, vixisse vero  
partum ex aliis argumentis conclusit.

Recensentur duo casus, vbi al- 1720.  
ter infans mortuus, alter viuus na-  
tus fuit. Infans, viuus natus, suffocatus,  
exhibuit pulmones coloris *subfusci*, natan-  
tes. Alter, exhibuit etiam pulmones colo-  
ris *subfusci*, qui integri & dissecti fundum  
pe-

<sup>u)</sup> In lib. suec. *forsta bref om suunkande och drifvan-  
de lungan*. Holm. 1718. ed. p. 5. 17.

<sup>x)</sup> *Acta med. Berol.* Dec. I. Vol. II. p. 111 sq. 123.

petebant, sed inflato aëre natabant. Ex eo infertur mors fetus in utero, & extrauasio sanguinis ξιβ, in capite obuia, constrictionis abdominis materni adscribitur. In notis negatur sententia HARVEI, colorem pulmonum embryonis mortui esse rubicundiores, & in spirantibus albedinem induere, siquidem in utroque casu color diuersus non fuit, viuus tamen pulmones natare, mortui fundum petisse, monet: in altera nota adiecta, experimentum pulmonum infallibile vitae post partum signum esse, statuitur y).

1721. Alibi ex pulmonibus natantibus vita infantis post partum infertur z)).

Alibi ex pulmonibus recentibus, coloris rubri, caerulei, sanguine plenis, submergentibus negatur vita post partum a).

1721. G. BEYERVS b) Ictus, utilem esse experimenti adhibitionem, cauete tamen procedendum in eo esse, monuit.

1) quod videndum, an cadauer adhuc recens, nam putredo efficeret, ut natarent pulmones.

2) quan-

y) l. c. Dec. I. Vol. IX. p. 55.

z) l. c. Dec. II. Vol. II.

a) l. c. Dec. II. Vol. VI.

b) In delictis iur. crim. ad art. 33 sq. n. 21 sq.



2) quando pars pulmonum scirrhusa esset, calculisque oppleta. (Ex imperitia rerum medicarum nata dubia mittam).

## X.

I. C. K V N D M A N N V S <sup>c)</sup> in 1722. infante, post tres hebdomades re-  
perto, inuenit pulmones aëre repletos, atque  
cum vesicula, aëre repleta, supernatantes;  
noluit tamen ob putrefactionem confidere ex-  
perimento; & reliqua neglexit, vt colorem.

L. H E I S T E R V S <sup>d)</sup> edidit 1722.  
programma, experimenti pulmonum  
fidei oppositum. Fetus enim, certo in vte-  
ro mortui, vt, partum absoluens, H E I S T E-  
R V S ex variis signis rite conclusit, pulmo-  
nes nigricantes & flaccidos inuenit. Vt  
praesentibus medicinae studiosis ostenderet  
idem, quomodo fundum peterent pulmones  
mortui nati, experimento instituto, eos praeter  
expectationem tum integros, tum dissectos,  
aquae innatantes vidit. Fetus in vtero mor-  
tuum

c) Eph. Vratlsl. a. 1722. Vol. XXII. p. 462 sq.

d) Pr. quo ostenditur: ex pulmonis fetus innatatione vel  
submersione in aqua nullum certum infanticidii signum  
desumi posse. Helmsf. 1722.



rium fuisse ex putredine, foetore, liuore, epidermidis a cute recessu, aliisque certum erat, nec flatum vllum pulmones distendisse, nec respirasse ferum, ex capitis incuneationis ratione & colore nigricante concludit.

1722. C. VATER<sup>e)</sup> eadem fere, ac BOHNIVS, proposuit.

1723. H. Fr. TEICHMEYER<sup>f)</sup> non veram solam, sed verissimam esse pulmonum docimariam, professus est. Intuitu putredinis contra BEYERVM haec protulit: „Wir haben genommen die Pulmones derer „todt gebornen Kälber, und selbige zu 3-8. „Tagen lang faulen lassen, und sie im Wasser probiret, da wir denn gefunden, dafs sie: „zwar nicht so geschwinde zu Boden fallen, „und etwas leichter zu seyn scheinen, iedoch „haben sie niemalen oben schwimmen können, sondern sind successiue gesunken, und „zu Boden gefallen.“ Negat itaque putredine, vel maiori, pulmones aut leuiores aut grauiores reddi. Inflatione pulmones dilatari, vt supernatent, concedit. Infantem suffocari posse sub partu 1) ab vmbilico, 2) ab ore:

e) In d. de infanticidii imputari signis diagnosticis. Viteb. 1722. th. 12.

f) Inst. med. leg. ed. 1723. p. 238 sq.

ore vteri, vtrumque casum a medico decidi non posse; sed deberi a iudice inquisitione inuestigari. De suffocatione verba fiunt.

## XI.

M. ALBERTI g) ea recenset, 1725.  
quae haecenus adnotata sunt, de hoc  
experimento a Claris viris dicta, vbi haec  
demum profert: „Licet in quibusdam casi-  
bus illud experimentum caute applicari de-  
beat, tamen concurrentibus aliis circumstan-  
tiis ad decidendum partum viuum omnino  
admitti, & propter alios defectus, quos pru-  
dens medicus bene discernere debet, neuti-  
quam reiici debet: quando vero hoc expe-  
rimentum suscipitur, tunc pulmones mini-  
me putredine infecti, — neque scirrhis op-  
pleti esse debent.”

L. HEISTERVS h): „Pul. 1727.  
mones, inquit, qui non respirarunt,  
collapsi & nigricantes reperiuntur, atque  
aquae iniectioni fundum petunt.”

H 2

I. I. GEEL-

g) *Iurisper. med.* T. I. Cap. IX. §. V. p. 179.

h) *Comp. anat.* ed. Nor. 1727. p. 101.

1728. I. I. GEELHAVSEN <sup>i)</sup>, „pro-  
 „pria experimenta non habet. Pul-  
 „mones, qui respirauerint, a pure, suffocatio-  
 „ne, posse ponderosos fieri, credit, & in aqua  
 „subsiderere; natatæ vero, quibus inhalatus aër  
 „sit in os, etsi numquam spiritum homo  
 „duxerit <sup>k)</sup>.”

1728. FR. HOFFMANNVS <sup>l)</sup> negat, pul-  
 monum in aqua subsidentiam indu-  
 bie arguere, fetum in utero esse mortuum,  
 sed in eo fallere experimentum, contendit.  
 Adducit obseruationem, vbi infantis, iam  
 per aliquot hebdomades extra uterum viui,  
 atque a matre suffocati, pulmones in aqua sub-  
 mergebantur. Itaque monet, pulmonum vasa  
 lustrantur, an sanguine crasso infarcta sint?

1728. M. ALBERTI <sup>m)</sup> iterum in  
 vires experimenti inquit, & §§.  
 pri-

i) D. de pulmonibus neo-natorum, aquae supernatantibus,  
 vel in ea subsidentibus, pro eruendo signo certiori

1) facti partus viui, vel mortui. 2) Factae vel non  
 factae respirationis. 3) Commissi vel non commissi  
 infanticidii. Prag. 1728. 4.

k) Sunt verba HALLERI in Boerh. studii medici  
 methodo, p. 351.

l) D. de laesionibus externis, abortiuis, venenis, ac phil-  
 tris, Hal. 1728. Opp. T. VI. p. 213. obs. XI.

m) D. de pulmonum subsidentium experimenti prudenti  
 applicatione. Hal. 1728. 4. & in I. M. T. III.  
 d. a. p. 76.

primis de eo in genere loquitur, §. 4. ea considerat, quibus pulmones ad natandum disponerentur, atque in primis de putredine agit, monetque, fetum, in vtero mortuum, posse suscipere aquam putrefactam ambientem, ut pulmones supernatarent expansi. §. 5. continuat argumentum, atque in primis animaduertit, praesente pectoris hydrope, fetus pulmones posse in vtero corrumpi, ut nant: & casum adducit, vbi mater, fetum mortuum excluderat, in cuius pectore compresso magna extravasatae & semiputridae colluuiei, sanguineae, lymphaticae, copia delituit, & pulmones semicorrupti natabant. Pulmones etiam, monet, subesse morborum constitutionibus, ut pulmonum substantia expandatur, sicut alia viscera tympanitica fierent, ut pulmones protuberantiis cellulosis & hydatidibus afficiantur. §. 6. Adicit monita, ut secantes inquirant, an fetus & mater cachexiae, hydropi, tympaniti, obnoxii fuerint? §. 7. Quando fetus in vtero detineretur, & instans partus ob varia accidentia retardaretur, posse fetum deniter respirare, ut vesiculae expanderentur, contendit. Varia itaque monita subiungit, ne hoc tamen sine ratione adsumatur. §. 8. Docet, fetum, qui sic respirasset, posse sub partu suffocari,



vnde iterum cautelas adfert. §. 9. Pulmones fetus mortui, inflatos ab obstetrice, aut adstantibus, natare, monet. §. 10. Animadvertit, pulmones interdum submergi, licet infantes viui nati sint, sed debiles; aut ita concretas esse vel conformatas laryngem aut asperam arteriam, ut respirare non possit fetus, cuius rei se exemplum obseruasse, refert. Sic etiam interdum ipsos pulmones esse conformatos, ut intimior compages concreta sit, hinc sollicitè in harum partium conditiones esse inquirendum, monet. §. 11. Subesse etiam adultorum pulmones variis conditionibus, ut submergerentur.

1730. A. O. GOELICKE <sup>n)</sup>, pulmonum infantis conditiones de vita eius certum nobis indicium praeberè, docuit.

## XII.

1731. E. ERICHTER <sup>o)</sup> sectionem in infante instituit, neque vero in pulmonum conditionem speciatim inquisiuit a. 1688. (dec. 2. c. 7.) & 1690. (dec. 9. c. 5.).

Alibi

<sup>n)</sup> D. de pulmonum infantis in aqua natatu vel subfidentia, infallibili indicio, eum vel viuum vel mortuum natum esse. Fref. ad Viad. 1730.

<sup>o)</sup> In digest. med. L. & Bud. 1731.



Alibi (dec. 7. c. 2.) refert, pulmones aquae immiffos nataffe, a. 1723.

M. SCHVRIGIVS *p*) recen- 1732.  
fuit fcriptores, de experimento pul-  
monum agentes.

L. HEISTERVS *q*), iterum 1732.  
contra pulmonum natantium expe-  
rimentum infurgens, refert hiftoriam infan-  
tis, qui per nouem horas debilis vixerat,  
cuius pulmones nullam differentiam, refpectu  
fimul nati, atque examinati, mortui infantis,  
ostendebant, vt denfi, nigricantes, prorfus  
collapfi, in aqua fubmergerentur *integri*.

I. D. GOHLII *r*) cafus ali- 1735.  
quot huc refero, vbi ex pulmonibus  
profunde rubris, fanguine repletis, atque in  
aqua fubfidentibus, vitam poft partum nega-  
uit *s*), aut ex pulmonibus diftensis & natan-  
tibus, vitam poft partum adfuiffe, ftatuit *t*).

H 4

Ex

*p*) In fialogia pag. 398. auctores indicauit modo.

*q*) D. de fallaci pulmonum infantum experimento. Helmft.  
1732. 4.

*r*) Medicina pract. clin. & forenfis ed. a S. Schaaſch.  
Lipf. 1735.

*s*) p. 2. l. c. c. 4. 24. 49. n. 1.

*t*) p. 2. l. c. c. 5. 28. 49. n. 3.

Ex pulmonibus non distentis, at cruore multo repletis & natantibus, ad suffocationem peractam conclusit <sup>u)</sup>).

1735. A. VATER <sup>x)</sup> in diss. th. 7.

meminit experimenti pulmonum, idemque certissimum & indubium de respiratione inchoata ac vita infantis extra vterum signum esse, docet, eidem tamen soli non esse fidendum. Proponit casum infantis semiputridi, cuius tamen thoracis viscera a putredine libera erant, & pulmones in aqua fundum petebant. Adducit huic perquam similem casum, vbi pulmones etiam submergebantur, flatu immisso, aquae supernatantes.

1736. D. BOESSEL <sup>y)</sup>, litteras ad

TREWIVM daturus, meminit infantis dissecti, admodum putridi, cuius pulmones integri, & in lobos dissecti, aquae inatabant, atrorubentes, densi compactique, ob vesiculas, exteriori pulmonum membranae adhaerentes: in frustula vero dissectarum partes internae, a vesiculis liberae, fundum pe-

<sup>u)</sup> I. c. c. 49. n. 2.

<sup>x)</sup> D. qua valor & sufficientia signorum infantem recens natum vivum aut mortuum editum arguentium examinatur. Viteb. 1735. 4.

<sup>y)</sup> Comm. Litt. Norimb. a. 1736. hebdom. I. p. 3.

petebant. Hinc, ad monitum HOFFMANNI attendendum esse, monet.

I. P. KRESSIVS ICtus 2): 1736.

„Res, si experimentum recte insti-  
 „tuitur, inquit, si pulmo 1) probe separatus  
 „ab arteria & venarum ramis, 2) integer,  
 „non in partes scissus, & 3) non putrefactus,  
 „aquae iniicitur, ita se habet: pulmones na-  
 „tantes certo arguunt, infantem vixisse, sed  
 „pulmones subsidentes non aequè certe ar-  
 „guunt, infantem editum non vixisse. Nam  
 „si femina partum suffocet, stranguletque  
 „pulmonem in eum intrusus sanguis aggra-  
 „uat, vt non natet. Item si femina partu-  
 „riens aquam intret, aut paludem, & infan-  
 „tem in ipso partu excludat & eiiciat, ob ces-  
 „santem respirationem, natatio quoque ces-  
 „sat. „

### XIII.

Mentio iniicienda est liti, quae 1739.  
 circa hoc tempus in Frisia a V. Cl.  
 agitata est. R O V K E M A chirurgus, & P. I D E-  
 M A, S C H E L L I N G E R & W I E R D S M A,  
 medici, negant, infantem ruptis membranis  
 H 5 in

2) In comm. in C. C. C. art. 131. p. 417. ed. Han-  
 1736. 4.

in vtero & vagina, respirare posse, quum infans conuolutus sit & pectus compressum, & necesse sit, vt infans capite, pectore, atque abdomine natus sit. P. IDEMA ad observationem prouocat, vbi puer, nuper exclusus, respirare non potuit, extensus potuit. Negant hoc B. IDEMA & CROESER, vterque infantem in vagina clamantem audiuisse dicit. Negat igitur vterque, experimento pulmonum confidi posse, quum infans, in vtero, & capite natus, in vagina, respirare possit: 2) quod infans natus aliamquamdiu absque respiratione viuere possit a).

CII

a) Cf. BERN. IDEMA *gedagten van het dryuen en Zinken der Longe*. Leeuwarde 1739. 4.

ROELOF ROUKEMA *natuurlike Stellinge*, rel. ibi 1739. 4.

B. IDEMA *vervolg der gedagten*, ib. 1739. 4.

I. H. CROESER *Kort ontwerp, verwattende de waar vorzaetz der eerste inademing*, Gröning. 1740. 4.

PET. IDEMA *aanmerkingen on Croesers verhoog* 1741. 4.

I. H. CROESER *nader berigt*, Gröning. 1741. 4.

B. IDEMA *noodige tuschen insprak over het dryuen* cet. Leeuw. 1741. 4.

Cf. etiam CAMPER l. m. c. p. 511q. & MAL-  
LERI bibl. anat. T. II. p. 318.



Cl. OVELGÜN <sup>b)</sup> quoque de experimento pulmonum natantium & submergentium egit, nec credidit sufficere.

A. LEYSERVS, Ictus: „Ab 1740. initio medici, inquit, magnifice de „artificio singulari, quod supra captum no- „strum sit, quodque *die Lungenprobe* appel- „lant, loquuntur. Pulmones nempe infanti „mortuo excindunt atque in aquam conii- „ciunt, & sollicite, num illi supernatent, an „demergantur, spectant, hoc nobis postea „renunciant, & inde coniecturam, vixeritne „infans, an mortuus in lucem venerit, fa- „ciunt, hancque coniecturam multis infallibi- „lem videri perhibent, sed tamen multos „etiam celeberrimos medicos eum flocci face- „re & ridere, fatentur, ac tandem argumen- „tum hoc, si non omnino certum, tamen non „prorsus spernendum esse addunt. Istiusmo- „di ambiguis medicorum responsis homines „immolare non audemus, quia nec tormenta „semper ex iis decernimus, sed reas non- „numquam ad iurandum saltem adigimus, in- „primis quando ex circumstantia aliqua, in- „fantem non vixisse, probabile est. — Non „peccant tamen magistratus, pergit, qui expe- „ri-

b) A. N. C. vol. 8. app. p. 50.



„rimento hoc, dum crimen infanticidii inue-  
 „stigant, vtuntur. Etsi enim plene non pro-  
 „bet, addit saltem ceteris rationibus aliquod  
 „pondus, & grauius pro innocentia reae, le-  
 „uius contra illam, ex notissimo defensionis  
 „& reorum fauore <sup>c)</sup>. „

1742. G. H. EISENMANNVS <sup>d)</sup> etiam,  
 nescio quibus argumentis, experi-  
 menti pulmonum certitudinem oppugnauit.

1743. I. B. MAZINVS <sup>e)</sup>: „Ego qui-  
 „dem, inquit, qui de pulmonibus  
 „hydrostatica experimenta diligentissime age-  
 „re curauim, in fetibus humanis, & ouibus  
 „semper detexi pulmones rubicundos & san-  
 „guineos, pulmonibus natorum confimiles.  
 „Fateor quidem, me aliquando fetuum pul-  
 „mones nigricantes & obscuros obseruasse:  
 „cum in vtero nimis perdurauerint sine vita,  
 „aut in feminis aliqua exceperint corruptio-  
 „nis rudimenta, verum talis status praeter-  
 „naturalis est. „ Mitto, quae de respiratione  
 fetus in vtero protulit.

T O R.

<sup>c)</sup> Medit. ad pand. Vol. IX. Lips. 1740. 4. Sp. 601.  
 p. 705. — p. 723.

<sup>d)</sup> In thesib. med. varii argum. Argent. 1742. p. 3.

<sup>e)</sup> Op. III. 54.

TORREZIVS *f*) recenset ca- 1750.  
 sum infantis, mortui die post par-  
 tum 12., cuius pulmones in aqua submerge-  
 bantur. Negat itaque, per hoc experimentum  
 absque errore posse colligi, an fœtus respiraue-  
 rit, nec ne? neque eius ope de infanticidio aut  
 matris innocentia iudicari posse. Quamuis  
 enim infans respirasset, tamen pulmones sub-  
 mergi, 1) quando infans esset suffoca-  
 tus: 2) pulmones scirrhusi, calculosi, aut  
 purulenti essent: 3) vbi iusto minor aquae  
 quantitas adhiberetur: comprobantibus ipsius  
 obseruationibus, contendit. E contrario, eos-  
 dem natare, statuit: 1) si iusto maior aquae  
 copia adhiberetur; 2) si putredo adest.

C. F. KALTSCHMIED *g*) in 1751.  
 adiecta obseruatione sistit casum in-  
 fantis, octo dies post partum mortui, vbi  
 pulmo dexter, colore pulchro rubicundo, al-  
 bicante,

*f*) Memoir. presentes a l'acad. R. des Sc. de Paris  
 T. II. Auserles. Abh., welche an die K. Acad.  
 der Wiss. zu Paris von einem Gelehrten einge-  
 sendet, aus dem Fr. Th. 2. übersetzt von F. W.  
 BEER, Leipzig 1754. 8. pag. 156 sq. Cf. vo-  
 GEL's n. med. Bibl. Th. I. 4. p. 306 sq.

*g*) Pr. de experimento pulmonum infantis aquae iniecto-  
 rum, adiecta obseruatione de dextro pulmonum lobo  
 inferiori, aquae supernatante, sinistro fundum peten-  
 te, Ien. 1751. 8.

bicante praeditus, supernatabat, sinister. vero collapsus, obscure ruber, pituita obstructus fundum petebat. Inde comprobare studeo supra propositam enunciationem, non ex solatatione vel submersione aliquid concludi posse, sed colorem pulmonum simul aestimandum esse. Hinc ex natatione pulmonum & colore albo rubicundo certissime inferri posse, infantem post partum vixisse. Quod si natantes gauderent colore obscuro rubro aut subfusco, inquirendum esse, an putredini fuerint subiecti?

1751.

F. E. CANGIAMILA <sup>h)</sup> etiam docimasiae pulmonum fidem ad diiudicandum infanticidium in dubium vocauit.

## XIII.

1753.

I. E. HEBENSTREIT <sup>i)</sup>, haec tenus proposita enarraturus, varias egregias adiecit animaduersiones. Itaque docet, viuere infantes natos absque respiratione, quamuis pulmones submergantur, vixisse tamen dici debere, si circuitus sanguinis post partum continuauit: & monet, e

pu

<sup>h)</sup> In embryologia sacra. Milan. 1751. Palermo 1755.

<sup>i)</sup> *Anthrop. for.* Sect. II. Memb. II. Cap. II. §§. 231 p. 402 sq.

pulmonibus submergentibus ad mortem ante  
natiuitatem non valere consequentiam. §§.  
23 sq. Pulmones eorum, qui respirarunt, ali-  
quando submergi, concedit, sed ad HEIS-  
TERI obseruationem monet, pulmones de-  
buisse dissectos in aquam coniici, dubitat  
enim, an omnes particulae descensurae fuif-  
sent? Statuit, submersionem, fetum haud re-  
spirasse, docere, omnemque fetum, cuius pul-  
mones, & integri, & dissecti, merguntur,  
& cuius vita per signa sanguinis fusi non  
patescit, merito haberi pro mortuo nato: pul-  
mones igitur esse discindendos, quum in de-  
bilibus, & subito post partum mortuis ob  
vim illatam, respiratione minus dilatarentur.  
Hinc vita, inquit, si vel minimam particu-  
lam pulmonum natare intelliges, se manife-  
stabit, poteritque inde ad vitam infantis,  
post partum actam, concludi., §. 26. Ma-  
iorem adesse vitae post partum certitudinem,  
si pulmones toti natant, tres tamen dari mo-  
dos, vbi & hoc suspectum: 1) *vbi fetus in*  
*utero respirat*; quem vero casum numquam  
in foro occurrere, monet, nam in HEISTE-  
RI casu, a BOHNIO & ALBERTI allega-  
to, vbi capite ossi pubis insistant, opus esse  
obstetrici, hinc & HEISTERVS auxiliatri-  
ces manus praeberere debuisset. 2) *Vbi ob-*  
*ste-*



*sterrices pulmones, aëre inflando, distendunt;*  
monet, idem euidens esse per testes, & du-  
bium superesse, an inhalatio, ob mucum, in  
faucibus collectum, aërem ad pulmones com-  
pellere possit. §. 27. 3) *Vbi putredo adest* :  
regerit, se mortuorum in vtero fetuum pul-  
mones, data opera ad summum putredinis  
gradum prouectos, semper demersos vidisse.  
Monet, alios ideo falli, quia pulmones in aqua  
in qua putrefacti fuerunt, ad superficiem fe-  
rantur, quum columnae aqueae densitas, a pu-  
tredine & abrasis pulmonum putrescentium  
fibris orta, descensui pulmonum resistat.  
hinc eosdem, in aquam puram coniectos  
fundum petere. Neque facile in infante adeo  
putrescere pulmones, vt in illo experimento.  
quod si esset, ne quid definiatur, cauendum  
esse. §. 28. Explodit sententiam, fetum in  
vtero respirare. §. 29. Negat etiam, fetum  
media sui parte natum, esse respiraturum  
siquidem vel mox totus nasceretur, vel ta-  
lis esset partus, qui a matre sola absolui non  
posset, neque pectus deduci posset, quod ad  
respirationem requireretur, si os vteri vali-  
dissime infantem amplexeretur, illiusque tho-  
racem teneret, & veluti strangularet. §. 29.  
Hinc concludit, firmum esse principium me-  
dicinae legalis, viuos editos esse, quorum pul-  
mones narent. §. 30.



C. F. ESCHENBACH <sup>k)</sup> 1753.

in vitulo vidit, putredine pulmones  
ad natandum disponi, ita, vt in summo eius  
„gradu, quamuis fortissime manu expresso li-  
„quore putrido, statim ab initio aquae (pu-  
„rae), cui immittebantur, supernatarent, nec  
„vlla ratione antea fundo accederent. „

## XV.

P. C. FABRICIVS <sup>l)</sup> fetus 1754.  
mortui pulmones, sanos, atrorubentes sq.  
& compactos, submersos in  
aqua, in qua putredini dati erant, exemptos, in  
aquam puram coniectos, supernatantes vidit.  
Fetus etiam subputridi & mortui nati pul-  
mones, atrorubentes, a putredine immunes,  
& integros, & dissectos, submersos in aqua  
vidit, vnus tamen eorum inflatus, subrubicundus & spongiosus factus supernatabat.  
Alter aquae diu traditus, non in illa solum,  
sed in alia, puteali & niuea, supernatabat.  
Diutius idem, per mensem, aqua detentus,  
in eadem & pura aqua submergebatur. (Nu-  
per

k) *Observ. anat. rarior. cont. obs.* 12. p. 182.

l) *Samml. med. Responfor.* ed. I. II. p. 202 sq.

per adiunxit casum de anno 1758. prioribus; similem). Inde haec infert:

- 1) Pulmones infantis, ante respirationem mortui, nisi putredini subsunt, neque aër iisdem inspiratus est, submerguntur.
- 2) Pulmones, exemptos ex infante subputrido, ubi tamen ipsi a putredine immunes sunt, submergentes, indicare, prioriter etiam casu certius, nullam factam esse respirationem. Quodsi supernatarent, contrarium, nisi aër inspiratus, indicare, contendit.
- 3) Quando pulmones ex putrido infante sumti sunt, experimentum nihil decidere posse, quum putredo omnino efficiat, ut supernatent. Exemplis, quibus, pulmones putridos, qui in putrida natarunt, in aqua pura submersos esse, constitit, explicat per varium putredinis gradum. Et, quum aliqui pulmones per putredinem pondere augeri, scripserunt, idem a maiori putredine pendere, docet, siquidem praesens putredo summa aërem euolueret, ut submergerentur.

G. C. DETHARDING <sup>m)</sup>, 1754.  
hactenus propofita exponens, cautio-  
nes neceffarias addidit, nihil vero noui pro-  
tulit.

I. G. ROEDERER <sup>n)</sup> do- 1754.  
cuit, docimafiam pulmonum sub  
certis conditionibus fallacia carere, dum  
enim pulmones natant, reliquis visceribus  
submergentibus, infantem poft partum re-  
spiraffe, concludi iure poffe. Quodfi cum  
pulmonibus totum corpus aquae innatat, ob  
praefentem iam putredinem nihil certi erui  
poffe. Aëris autem in os inhalationem pulmo-  
nes dilatare non poffe, ftatuit, nifi infans ipfe  
fpiritum duxerit, hinc, ob inhalationem poffi-  
bilem non fallacem fieri docimafiam pulmo-  
num, arbitratur.

## XVI.

A. de HAEN <sup>o)</sup> monet, pul- 1756.  
mones fcirrhofos, induratos, in  
adultis etiam fundum petere, imo ceterum  
leuiiores vna deorfum trahere. Hinc: „Plu-

I 2

„res

<sup>m)</sup> D. de cautione medici circa cafus infantidii. Rost.  
1754. §§. 14 fq.

<sup>n)</sup> Satur. de fuffoc. Goett. 1754. p. 19. 20.

<sup>o)</sup> Rat. med. Tom. II. Cap. IX. p. 123 fq.

„res nunc relationes, inquit, ad iudicem  
 „factae, argumentum habent ex abscissa por-  
 „tione pulmonis, innatante vel submersa  
 „aquis. Nonne hinc in procliui fit, ut son-  
 „tes feminae absoluantur, fallanturque iudi-  
 „ces? – Vagire etiam interdum infantem  
 in partu, capite iam natum, mori tamen ali-  
 quando eundem sub partu, ubi pulmones  
 nataturi essent, quamvis mortuus natus es-  
 set; hinc, corrigendas esse artis regulas, con-  
 tendit.

1758. A. de HALLER *p*) pulmones  
 fetus mortui putredini dedit, & vi-  
 dit, eos in *eadem* aqua post septem dies super-  
 natare: atrorubentes antea pulmones colorem  
 rubicundum induerunt, & bullis aëreis repleti  
 sunt. In pluribus mortuorum ante partum  
 reperit pulmones atrorubentes, submergen-  
 tes, post lenem vero inhalationem supranata-  
 bant vel frustula, vel integri, ita, ut etiam  
 digitis compressi aërem non amitterent. – Pul-  
 mones infantis, cuius cadauer putorem spi-  
 rabat foetidissimum, erant atrorubentes, ad  
 tactum duriusculi, atque integri aequae, ac dis-  
 secti, fundum petierunt. Atque in pluri-  
 bus

*p*) *Sec. mem. sur plus. phenom. de la respir. a Lausanne*  
 1758. Sect. IV. Exp. 118 sq. p. 340 sq. & opus-  
 min. T. I. p. 319 sq.



bus experimentis natatio cum colore pulmo-  
num, roseo, subrubro, subpallido, con-  
iuncta fuit, vti submersio incidit in pulmo-  
nes compactos, atrorubros. Tamen pul-  
mones animalium, vacuo spatio suffocato-  
rum, sanguinem quidem ostenderunt effu-  
sum in cellulosam pulmonum, sed natarunt;  
color autem aut non mutatus fuit, aut atro-  
ruber. „Deinde, ipse inquit, non modica  
corruptio requiritur, vt pulmones natent,  
mediocris natationem non impedit. — Cum  
regula generalis de pulmone supernatante  
ad vitam fetus concludat, cumque rarum sit,  
infantem in eo breui per vaginam itinere,  
aëre prius hausto, mori, credo matri, infan-  
ticipii reae, vnici illius casus probationem in-  
cumbere, in quo infans in transitu per vagi-  
nam mortuus sit.,

IGN. RVTH <sup>q)</sup> monet, ex 1759.  
pulmonum natatione concludi non  
posse, fetum viuum natum esse, quum re-  
spirare in vtero possit, prono hiantem in va-  
ginam ore, post aquas ruptas: hinc certum  
quidem esse, infantem respirasse, sed vel in  
natiuitate, vel post natiuitatem. Ceterum

I 3

plera-

<sup>q)</sup> D. de infanticidio, Prag. 1759. §. 3 sq. in  
KLINKOSCH diff. T. I. no. 7. p. 159 sq.

pleraque, haëtenus dicta, recenset, nihil noui addens, & caute vtendum esse experimēto, docens.

1759. Eodem etiam tempore ARNOLDVS V. D. LAAR <sup>r)</sup> edidit dissertationem, & docimasiae pulmonum fidem fecit ad diiudicandam infantis vitam <sup>s)</sup>.

## XVII.

1761. I. B. MORGAGNVS <sup>t)</sup> ad plurima, haëtenus tradita, respiciens, monet: „priusquam ex horum subsidentia arguamus, mortuum infantem editum esse, indicia magnae eius imbecillitatis quaeremus ex matris praegressis, aut praesentibus etiamtum morbis, ex partus difficultate, ex cadaueris ipsius infantis constitutione, aliisque eiusmodi: quorum si nulla sint, neque alium obstat, quin mortuus emissus fuerit, non dubitabimus. Sed contra euidens erit, non posse nos fidere signo proposito, si quando pulmones non illa naturali, & fetus propria, sec

<sup>r)</sup> De pulmon. in aquis innatatione, vel subsidentia infantis recens nati, Lugd. Batav. 1759.

<sup>s)</sup> Cf. Nov. comment. soc. sc. Goett. T. VI. p. 44.

<sup>t)</sup> De sed. & caus. morb. ep. XIX. art. 45 sqq.

„sed morbosa grauitate praeditos, animaduerti-  
 „teremus, vel quod scirrhusi, vel inflamma-  
 „ti, vel infarctu quocunque alio affecti sint,  
 „vt, vel si adulti hominis essent, non pos-  
 „sent tamen, in summa aqua consistere,  
 „quod plerique, & nos quoque interdum  
 „experti sumus., Negat suffocationem se  
 oculis subducere posse. „Namque vt huius  
 „externa omnia deessent indicia, at certe  
 „alia ac soleat esse in fetu pulmonum consti-  
 „tutio, & *amplificatum praesertim volumen*  
 „admonerent, ne tametsi in summa aqua innata-  
 „rent, huic signo temere crederemus., Monet,  
 discindendos esse pulmones; praesente vero  
 putredine de vita infantis statui non posse.  
 Casum, vbi infans ob difficilem partum  
 aërem ducere posse & mori in vtero ad-  
 huc creditur, statuit, adiutrices manus re-  
 quirere, vt neque occultari, aut fingi pos-  
 sint, quae aut praecedunt, aut comitantur,  
 aut subsequuntur. Quoad aëris inhalatio-  
 nem addit: si per nulla interna aut externa  
 vis, adhuc viuenti illatae, indicia, calum-  
 niam liceret euincere, matri credendum esse,  
 cum aduersaretur nulla ex ceteris rei  
 adiunctis, neque pulmonum distensio maior  
 esset, quam quae ea quidem ratione effici in  
 recens mortuo fetu, experimentis in eam

rem sedulo habitis, possit. Igitur, prudenter adhibito experimento utentum esse, docet.

1761. A. de HALLER <sup>u)</sup>, haec aestimans, haec proposuit :  
 dicta aestimans, haec proposuit :  
 „Sed in homine utique ab hoc phaenomeno satis fidum signum repetitur, ex quo cognoscatur, num vivus in lucem editus puer respiraverit, num in utero materno prius vitam amiserit, quam sit in lucem editus. Vixit certe puer, cuius pulmo aquis innatat, neque vitium subrepere potest, nisi vel in os inflatus aer fuerit, quod verum respirationis genus est, vel putredo, neque ea modica, tantum produxit aeris, ut pondus specificum pulmonis, aliunde equidem aere exigua portione maius, aquae pondere, minus factum sit. Id minor putredo non efficit, maior praestat. Neque tunc error in medici effato locum habet, si levi operae voluerit explorare, num & reliqua viscera natent. Id si viderit, non aer, in pulmonem per respirationem receptus, causam erit natandi, sed aer, ex humoribus carni- busque per communem legem putredinis expeditus.,

„Con-

<sup>u)</sup> *Elem. phys.* T. III. p. 279 sq.

„Contra poterit fieri in adulto homine  
 „aliquando, in fetu rarissime, vt pulmo  
 „calculis, scirrhis, aliaue materia morbose  
 „grauis in aqua subsideat, etsi quam maxi-  
 „me respirauerit. Vidi sanguinem ex rup-  
 „tis per funestam peripneumoniam vasis in  
 „pulmonem effusum, vt tamen nataret:  
 „vidi scirrhos, calculos, & lymphaticum  
 „coagulum, vt minime tamen subsideret. —  
 „Etiam a coagulo lymphatico pulmonem vi-  
 „di subsedisse. Inde, si inaequalis infarctus  
 „fuerit, aut perinde, aërem non aequali-  
 „ter totus pulmo receperit, poterit alia pars  
 „pulmonis submergi, alia natare. Poterit  
 „etiam in puero, partu vero excluso, qui  
 „tamen prae debilitate aërem nondum duxit,  
 „pulmo fundum petere, etsi aliquantum se  
 „agitauit. „

## XVIII.

C. C. SCHMIEDEL <sup>x)</sup> refert 1763.

obseruationem, vbi infantis putridi  
 pulmones submergebantur, atque alius, ex  
 vtero matris mortuae exempti, vbi antea  
 submergentes post 7. 16. dies natabant. Non  
 aërem, per putredinem euolutum, sed euo-

I 5

lutio-

x) D. de pulmon. natantibus, resp. I. G. HUEBÉR,  
 Erl. 1763.



lutionem fibrarum & mutationem in mucum  
efficere natationem §. V. p. 8. Si contingat,  
ut pars pulmonum attollatur, id maceratio-  
ni tribuit idem §. XI. p. 19.

1764.

I. TRAVG. ADOLPH y)

primo (§. 12.) de suffocationis peri-  
culis ob mucum verba fecit, deinde (§. 13.)  
pectoris dissectionis rationem tradidit, postea  
(§. 14.) pulmonum experimenti meminit &  
(§. 15) oppositiones Cl. VV. cum refutatione  
(§. 16.) proposuit, denique de vi experimen-  
ti (§. 17.) statuit. Quod sollemne attinet  
experimentum, aquae quantitatem adhibitam  
& vasis diametrum & profunditatem exactius  
definiendam esse, docet, atque in instituendo  
experimento obseruandas cautelas tradit. In-  
de arguit: „*Omnium frustulorum mergen-*  
„*tium* notatu dignissima animaduersio, quia  
„inde partum non respirasse concluditur;  
„cuius non numquam causa humor, pulmo-  
„nes replens. *Quorundam saltem mergen-*  
„*tium*, si vitium intra foetum latet, scirrhus;  
„aut farciens humor, aut sanguis effusus, aut  
„inspiratio in completa causa habetur. *Quo-*  
„*rumdam supernatantium*, quamquam reli-  
„qua

y) D. de infanticidii notis, sectione legali detegendis.  
Helmst. 1764.

„qua frustula descenderint, indicium imper-  
 „fecta respiratio. *Omniū superficiem aquae*  
 „*tencntium* significatio, quod natus aut post  
 „plenissimam respirationem defunctus, aut  
 „putredine rarefactus., (p. 50.) – „Pulmo  
 „itaque foetus, qui spiritum nondum duxit,  
 „densus & ruber in aqua praeceps datur, nisi  
 „putredine ita fuerit mutatus, vt, cum aliis  
 „visceribus, iam sublime teneat, nisi porro  
 „aëre sufflato forsan leuitatem consequi possit.  
 „Pulmo autem, qui inspiratione, quamuis  
 „vnica, quamuis imperfecta, aërem conce-  
 „pit, natat in aqua, ni totus, tamen in par-  
 „tibus quibusdam suis, natatque solus, dum  
 „reliqua viscera (capsulae suprarenales, thy-  
 „mus, lien, hepar) merguntur. Sola putre-  
 „do intensior pulmones simul cum aliis visce-  
 „ribus nando aptat, respirationisue obscurat  
 „diagnosin. Aëris sufflatio quid possit, in  
 „dubio relinquimus. Os vero infantis, aper-  
 „turae vteri propinquum, non sufficit pro aëre  
 „hauriundo., (§. 17.).

C. G. B Ü T T N E R <sup>2)</sup> dubium, 1765.  
 ratione putredinis experimento pul-  
 monum oppositum, inde soluit, quod in mor-  
 tuis

<sup>2)</sup> *Abh. v. e. zweiköpf. Misgeb. Kön. 1765. 4.*  
 p. 11 sq.

tuis color esset attroruber, & vasa pulmonalia sanguine destituerentur (atque ob sanguinis defectum pulmones etiam reliquis visceribus tardius putrescere statuit). In viuo nato, sed suffocato submergi quidem pulmones, posse tamen hunc casum discerni ex vforum pulmonalium sanguineo infarctu. Vbi vero infans a liquore amnii suffocaretur, deprehendi epiglottidem erectam, fauces, asperam arteriam cum bronchiis eo liquore esse repleta, atque in his esse spumosum sanguinolentum. Pulmones caeruleos & rubicundos supernatare. In iis, qui apoplectici ob incuneationem capitis obirent, deprehendi cor & arterias magnas in superficie inflammata, pulmones vero submergi, & deficere sonitum, ex eorum dissectione alias prodeuntem.

1765. A. de HALLER <sup>a)</sup> ergo in pulmones aërem ducit, inquit, eos, hactenus paruos, seroso humore plenos, dilatat, mutat ex atro rubentibus, paruis, solidis, in aqua etiam falsa merfis, in leues, spongiosos, innatantes, magnos, plenos aëre & subalbidos.

A. de

<sup>a)</sup> In pr. lin. phys. ed. 3. Goett. 1765. pag. 433. §. 948.

A. de HALLER <sup>b)</sup> addit 1766.  
 quaedam ad ea, quae supra propo-  
 fuerat de hoc argumento, & sic concludit:  
 „Haec omnia, & alii euentus, qui iudicium  
 „dubium admittere videntur, eo consentiunt:  
 „1) pulmonem in fetu, qui non respirauit,  
 „constanter fundum in aqua petere. 2) Nisi  
 „putredo aërem euoluerit, vt spuma pulmo-  
 „ni adhaereat. 3) Pulmonem, qui semel ab  
 „inspiratione aëre répletus sit, cetera sanum,  
 „in aqua natare, nisi valde imperfecta fuerit  
 „inspiratio, & 4) nisi morbus euident pul-  
 „monem densum reddiderit. „

Eodem tempore etiam C. G. 1766.

LVDWIGIVS <sup>c)</sup>, de experimento  
 pulmonum verba fecit, ita, vt ad haëtenus pro-  
 posita respiceret & experimento fidem faceret.

### XVIII.

C. F. IAEGGER <sup>d)</sup> pulmones 1767.  
 infantis putridi submersos vidit, &  
 per 8 dies ita subsistentes. In alio post 40 dies  
 nondum emergebantur, & in alio, in putri-  
 da

<sup>b)</sup> Elem. phys. T. VIII. add. p. 161.

<sup>c)</sup> Instit. med. for. §. 246 sq.

<sup>d)</sup> D. de fetibus recens natis iam in viro mortuis &  
 putridis, resp. I. C. C. STÖER, Tüb. 1767.

da aqua detenti per 24 dies in fundo vasis restitabant. Statuit pulmones infantis, in utero mortui, per putredinem ad natandum quidem disponi, leui vero pressione effici, ut fundum petant: Pulmones, ex fetu valde putrido defuncti, soli, sine ulteriori maceratione statim aquae innatarunt. Sub membrana sua extrema in minimis vesiculis aërem mobilem, propellendum, reclusum habuerunt, quo per incisionem & compressionem emissio, mox mergebantur. (p. 21.) Alios tres casus pulmonum, ex fetibus in utero mortuis, minus foetentibus, defunctorum, proponit, qui omnes, aquae iniecti, merfi sunt: ex quibus concludit, communi thesi, prudenter adplicatae, qua pulmones respirantium in aqua natare, non respirantium mergi, adstruxerunt, suum stare honorem; sed pulmones supponi sanos, vndique sibi aequales, excludi vero vitiosos. (p. 23.).

1767. FR. TARTAROTTI de EICHENBERG <sup>e)</sup> recenset pleraque, quae adducti haecenus scriptores memoriae prodiderunt, & concludit: 1) licet pulmones fetus

<sup>e)</sup> D. de fallaci pulmonum experimento, in acad. oenipontana def. 1767. in Cl. de WASSERBERG opp. min. fasc. III. p. 134 sq.



fetus, aquae fundum petens, hominem extra matris vterum non vixisse, saepe demonstret, non esse tamen signum, a vitae extra vterum suspicione in omni casu absoluens. 2) Natationem pulmonum non esse certum & infallibile signum, fetum extra vterum vixisse. Monet itaque, hoc experimentum non esse quidem negligendum, sed illi soli confidi non posse.

I. Fr. FASELIVS *f*) respira. 1767.  
tionem infantis post partum confirmari statuit ex pulmonum colore albo, densitate minori & natatione, & volumine aucto. Solum vero experimentum sollemne negat sufficere, ut de vita & morte tuto iudicetur, ob putredinem, inflationem, & quod absque respiratione aliquamdiu viuere iam natus potest.

I. F. EISENHART *g*) ICTus, 1767.  
Celeb. pulmonum docimasiae utilitatem his agnouit: „Man schliesset, dafs, „wenn die Lunge auf dem Wasser geschwommen, das Kind zuerst gelebt habe, und „nachmals umgebracht worden seyn müsse; „ob schon viele berühmte Aerzte hinlaenglich „er-

*f*) Inst. med. leg. §§. 185. 187.

*g*) In Erzähl. v. bes. Rechtsh. Halle 1767. 8. p. 98.

„erwiesen haben, daß diese Probe keinen  
 „zuverlaessigen Beweis von dem Leben oderr  
 „Tode eines Kindes abgebe (*Heister*), und  
 „es zwar, wenn die in das Wasser gewor-  
 „fene Lunge unterfinke, ein unbetrügliche  
 „Zeichen sey, daß das Kind todt und nicht  
 „lebendig gewesen seyn müsse, hingegen  
 „aus dem Schwimmen noch nicht geschloß-  
 „sen werden koenne, daß selbiges vorher  
 „gelebet habe, so wird doch dieses Mittel in  
 „solchen Vorfaellen mit Nutzen gebraucht.“

1768.

I. P. B A V M E R <sup>h)</sup>, V. Cl. sta-  
 tuit, non esse confidendum pulmo-  
 num ponderi soli, aut colori soli, sed, ambo-  
 bus simul sumtis utendum esse, monet.

1768.

G. H. K A N N E G I E S S E R <sup>i)</sup>  
 V. Cl., docet, docimasiam pulmo-  
 num dubiam deprehendi, nisi sollicitè adhi-  
 beatur, quum fetus ante partum absolutum  
 interdum respiret: 2) quod inflatione alie-  
 na, & putredine accedente, pulmones nata-  
 rent: 3) quod submergerentur pulmones,  
 morbose constituti.

I. I. L.

<sup>h)</sup> Pr. de colore, densitate & crassitie pulmonum fetus  
 qui respiravit, & eius, qui non respiravit, Erf. 1768.

<sup>i)</sup> Cf. inst. med. leg. §§. 537—744.

I. I. L. NEYDECK <sup>k)</sup>, in ex- 1768.  
perimenti pulmonum vim inquirens,  
eque scriptoribus raptim quaedam sumpta pro-  
ponens, nihil noui protulit, praeter casum  
infantis, mortui caesonis, cuius pulmones  
non fuisse compactos & supernataſſe, refert,  
vnde comprobare ſtudet enunciationem: fe-  
tum in vtero aliquando reſpirare. (Mater  
poſt ruptas ante aliquot horas aquas e viu-  
is diſceſſerat). Negat, in foro confi-  
di poſſe huic ſoli experimento, &, ſi alia  
conſiderentur, hoc non opus eſſe, contendit.

A. P O R T A L <sup>l)</sup>, ope ſectio- 1769.  
num, ſollicite inſtitutarum, adnota-  
uit, quod plerique neglexerunt, vtrumque  
bronchiorum ramum primarium diſſerre ab  
inuicem. Dexter ſcilicet, quarta parte ſiniſtro  
crasſior, & hic illo quinta parte longior  
eſt; ſiniſter ramus & magis deorſum & re-  
trorſum inflexus eſt: quae quidem directio  
pro

k) Libellus inſcribitur: *Ob, wann und wie das Experiment von Obenſchwimmung und Unterſinkung der Lunge — in rechtl. Folge zu beurtheilen ſeye*, ſ. l. 1768. 4. p. 27 ſq.

l) In mem. de Paris 1769. p. 549 ſq. Cf. Samml. auſerleſ. Abhandl. zum Gebr. practt. Aerzte, T. I. F. 3. p. 3 ſq.

pro aetate differt. In fetu, qui nondum respiravit, ramus sinister magis inclinatus est ad dorsum & inferiora, quam in eo, qui respiravit; & in nuper nato, ramus dexter magis ad superiora ductus est, quam ante partum.

Deinde membranam etiam internam bronchiorum examini subiiciens, deprehendit, eam constare fibris longitudinalibus parallelis, atque efficere in primis in eo loco, ubi ramus sinister oritur, notatu dignam valvulam, natam partim ex membrana, partim ex superiori cartilagine huius rami, interius eminente. In fetu, qui nondum respiravit, ramus sinister magis inflexus est, & valvula magis eminet. Simul vero, ac dexter pulmo aërem hausit, dexter ramus sursum ducitur & valvula retrahitur. Ramus dexter, libere quaquaversum movetur, si opus est; e contrario sinister ab aorta amplectitur, ut haec eius mutationes sentiat, & contra; siquidem, nimium repleta sanguine, aorta comprimere ramum dictum poterit, atque impedire, quo minus aër subire pulmonem sinistrum possit & sufficienter distendere. rel. — In fetu, qui non respiravit, aorta inflexa est retrorsum & supra rami sinistri latus. Simul vero,

vero, atque infans respirat, & pulmo inprimis sinister, ramus dictus attollitur simul cum aorta, atque, vt ramus versus anteriora ducitur, ita quoque aortae directio mutatur. — Ex variis experimentis, in animalibus viuis institutis, colligit auctor, sub quauis respiratione aortam sursum & antrorsum duci, quum vero pulmones collabuntur, deprimi & retrahi ad dorsum. — Ex aliis experimentis, vbi pulmo dexter exhibuit respirationis & inflationis signa, quibus sinister destituebatur, concludit, dextrum citius respirare, quam sinistrum, nisi sanguis, aut mucus, pulmōnem dextrum oppilauerit, vt aër sinistrum subiret; idemque forte per omnem vitam locum habere. Cuius rei hanc addidit rationes, quod bronchiorum ramus dexter esset amplior & capacior sinistro, longiori & angustiori, & membrana praeterea ex parte occluso, vt aër hic maiora, pulmonem subeundi, deprehendat impedimenta, quam illic: aortam etiam & ductum Botalli, sanguine referta, comprimere sinistram ramum, vt difficultates augeantur, adiungit.

Ex quibus omnibus, praeter alia, concludit, in medicina forense etiam haec attendenda esse.



1770. Ill. KOCHIVS, ICrus <sup>m)</sup>, „sed de ea re, inquit, inter medicos nondum transactum est; deinde ex subsidentia pulmonum certo concludi nequit, quod infans post partum non vixerit, & infanticidium commissum non sit. Potest enim post natiuitatem aliquamdiu sine respiratione infans viuere. Nec videntur cautiones BEYERI & TEICHMEIERI omne dubium tollere. -- Interim subsidentiam pulmonum pro defensione cautus defensor allegabit. „

1770. I. S. F. de BOEHMER <sup>n)</sup> autem: „Hoc certum, inquit, experimentum pulmonum fallax, nec apodicticum esse, adeoque fidem potissimum ex circumstantiis cuiuscumque facti facere. Huc enim redeunt omnia, quae ab oppugnatoribus contra illud allegantur, si paullo curatius examinantur. Ast ideo eius fides non proscribenda, aut, casu obueniente, id prorsus negligendum. „ Ita ingenue iudicat LEYSER, in med. ad pand. XXXVII. his verbis: „Non peccant magistratus, qui experimento hoc, dum crimen infanticidii inuestigant, vtun-

<sup>m)</sup> Instit. iur. crimin. ed. 3. Ien. 1770. 8. §. 723.

<sup>n)</sup> In medit. in inst. C. C. Hal. 1770. ad art. 131. p. 557.

vtuntur. Etſi enim plene non probet, addit ſaltim ceteris rationibus aliquod pondus.,

## XX.

C. G. BÜTTNER <sup>o)</sup>, pulmo- 1771.

nes largiri infanticidii certitudinem, ſi omnia ſimul ſumantur, docet §. 50. Nam, ſolam natationem nihil probare poſſe, monet, ſiquidem putredo pulmones facile ad natationem perduceret, vt caſ. 59. 60. adi. comprobarent, quamuis interdum nihil in eo efficeret putredo, vt pulmones putridi ſubmergerentur, caſ. 61. 62. 63. 69. — §. 51. Quoad colorem docet, in mortuis natis eſſe eundem atrorubrum, ſubſcuſum, in iis, qui parum reſpirarunt, eſſe hic illic ſubrubrum, qui bene animam duxerunt, eſſe omnino laete rubicundum. Monet autem, ne ſoli fidatur colori, ſe enim ipſum obſeruauit caſum infantis ſuffocati, caſ. 29., cuius pulmones gauiſi eſſent colore ſcuſo. §. 52. Negat etiam, ſoli veſicularum diſtenſioni confiſi poſſe: obſeruauit enim 1) caſum infantis, 6. menſ. mortui nati, vbi & veſicularum aliqualem diſtenſionem & rubicundum obſeruauit colorem. 2) Ab aëris inflatione poſſe ſic diſten-

K 3

di

<sup>o)</sup> L. de infanticidio, §§. 50 ſq.

di pulmones, vt eadem signa adsint, cas. 72. Contra R O E D E R E R V M statuit, posse omnino inflatione pulmones distendi, licet nulla praecesserit respiratio, quum praeter casum 72. aliquoties ipse periculum fecerit, pulmonesque adeo dilatauerit, vt natarent. Igitur H E B E N S T R E I T I I quoque animaduersionem, fore, vt mucus infantis inflationi resistat, nullius esse ponderis, qui ipse pulmones facile potuisset inflare. §. 53. Hinc concludit, nec soli natationi, nec colori soli, nec vesicularum distensioni soli confidi posse, sed haec tria debere coniungi, vt de respiratione iudicaretur, ac videndum in primis esse, num vasa sanguinem contineant, quod ope pulmonum dissectionis cognoscatur. §. 54. Contra T O R R E Z I V M monet, suffocationem ex infarctu sanguineo cognosci, nec pulmones facile scirrhis laborare, teste sua ipsius experientia, ex 70. infantum sectione nata. §. 57. Neque iusto maiorem aquae quantitatem efficere, vt pulmones natent, quod sua experientia confirmat. Nec putredinem dubium reddere iudicium, quum signis propositis simul adhibitis nitatur. Ceterum animaduertit, in mortuis natis pulmones ad vertebrae esse collapsos, & carni rubrae similes, hinc pericardium non esse tectum; in iis ve-

ro, qui aërem hauserunt, omnino rectum esse pericardium.

I. W. BAVMER *p*) recenset 1771. obseruationem, vbi pulmones, ex infante subputrido desumpti, colore carneo praediti, compacti, & versus dorsum contracti, nullo modo expansi, nec pericardium cum corde & thymo regentes, & toti, & in frustula dissecti, pertinaciter innatarunt, experimento aliquoties repetito.

E. G. BOSE *q*), V. Cel. haëtenus 1771. relata refert, additque, in suis experimentis pulmones, etiam putridos, fundum petiisse, vel ex fetu mortuo, vel ex putrido infante exempti fuerint, donec summa accesserit putredo. Bene autem monet §. 14.: „Qui „debilem natum esse volunt infantem, non „adstruere, sed confirmare debent opinionem: „& signa aderunt, quae docere poterunt, an „recte supponatur debilitas.”

*p*) In act. philosoph. med. soc. acad. scient. Hassiac. Frcf. & L. 1771. p. 121 sq.

*q*) D. II. de diagn. vitae foetus & neogeniti, Lips. 1771. §. 9 sq. & p. 28.

## XXI.

1772. C. L. LIEBÈRKÜHN <sup>r)</sup>, V. Cl.,  
 relatorum multa recenser, atque ex-  
 perimenta, in brutis instituta, refert (male:  
 tamen nulla mentio iniicitur in plerisque; an  
 respirauerint, an secus, quis pulmonum co-  
 lor, an sani fuerint? rel.). Statuit: „Fluctua-  
 „tionem pulmonum certissimum esse indi-  
 „cium, aërem pulmones intrasse, & submer-  
 „sionem, aërem pulmones non intrasse, cer-  
 „tam esse docimasiam. „ §. 6. Putredinem  
 negat, etiam duobus experimentis, efficere, vt  
 submersuri natent. §. 7. Neque efficere,  
 vt submergantur nataturi §. 8. Concludit:  
 „natationem pulmonum indubitatum vitae  
 „infantis extra vterum esse signum, quando  
 „aërem pulmones non aliter, nisi per respi-  
 „rationem post partum intrasse constat. „  
 §. 11. Porro: „submersionem pulmonum, nisi  
 „fetus vi aliqua interfectum fuisse constat,  
 „certum esse indicium, mortuum exclusum  
 „fuisse fetus. „ §. 12. Monet etiam, inhala-  
 tionem esse facti, hinc non esse praesumen-  
 dam, sed probandam ab inquisita. De eo  
 vero numquam quaerendam esse, quum idem  
 esset, ac docimasiam non instituere. §. 16.

P. A.

<sup>r)</sup> D. iur. de experim. pulm. natant. & submerg.  
 praef. V. Conf. H. I. O. KOENIG, Hal. 1772.



P. A. MARHERR <sup>s)</sup> „dum in 1772.  
 vtero haesit, inquit, pectoris caui-  
 tatem habuit minimam, pulmones paruos,  
 denſos, compactos, pauco ſanguine per-  
 meabiles, in aqua fundum petentes, nec  
 praerogatiua ab aliis viſceribus diuerſos. —  
 Nunc vero, dum respirare coepit infans,  
 omnia haec mutantur; pulmo collapsus,  
 compactus antea, explicatur pro ratione dila-  
 tati pectoris, explicantur ſimul pulmonalia va-  
 ſa, & a compreſſione liberantur.,

C. E. ESCHENBACH <sup>t)</sup> ple- 1775.  
 raque de experimento pulmonum  
 meditatus, pulmones, ſanos ſupernatantes,  
 cum certitudine, a iudice ponenda, non eſſe  
 inflatione dilatatos, nec putridos, probare di-  
 cit, neonatum respiraffe, hinc viuum fuiſſe  
 excluſum. §. 134. de copia & temperie aquae  
 adhibendae; de colore & extensione pulmo-  
 num, de fallaci ſubmerſione, de putredine,  
 ſi in notis bene egit, ad d. §. Proponit dubia,  
 contra experimentum ab auctoribus prolata,  
 reflex, §. 135. Ad quae reſponder. §. 136. &  
 indagatiōem, an inflatio in os facta ſit, num-  
 K 5 que

<sup>s)</sup> Praeleſt. in H. BOERHAAVE inſtit. med. T. 3.  
 p. 704. Cf. HALLERI el. phyſ. T. 3. p. 243.

<sup>t)</sup> Inſt. med. leg. ed. 2. §. 134 ſq.

que membranis illaesis partus natus sit? iudici ciuili inquirendam relinquit.

1775.

I. G. ZIERHOLD <sup>u)</sup> monet, non repugnare, fetum laborare aliquando hydrope pulmonum vero, tumque fore, vt omnia adsint signa, quae alias simul sumpta docere putant, fetum respirasse: Igitur disquirendum esse, an is morbus adsit, quod ex lymphae profusione sub discissione pulmonum cognosci possit.

1775.

B. PARENTIS huc liceat referre casus, ad infanticidium pertinentes. Idem vero ex pulmonibus atrorubris, collapsis, in aqua subsidentibus, ad non peractam respirationem conclusit, neutiquam vero inde ad absentiam vitae post partum concludi posse, monuit <sup>x)</sup>. E contrario ex pulmonibus subrubellis, vesiculis distentis, & pulmonum natatione, vitam post partum collegit <sup>y)</sup>, simul vero ad alias conditiones respexit.

*Ipsæ*

<sup>u)</sup> D. de notab. quibusd., quae fetui in vtero & partu contingere possunt, ad illustrandum infanticidium, pr. Cel. BOEHMERO, H. 1775. §. 6.

<sup>x)</sup> Samml. med. Gutachten, Leipz. 1776. resp. 63. 64. B. 65. A. 66. 68. 79.

<sup>y)</sup> l. m. c. c. 67. 64. A. 65. B. 69. 70. 71. 73. 74. 76. 78.

*Ipse* etiam monui, ob neglectam 1775.  
 natationis theoriam factum esse, vt  
 TORREZIVS crederet, maiorem aquae  
 quantitatem efficere, vt pulmones submer-  
 suri natarent, & contra, vtque BÜTTNE-  
 RVS ad suam experientiam prouocaret, &  
 sub varia aquae quantitate eundem se ob-  
 seruasse euentum, referret. Itaque theoriam  
 natationis proponens, non opus esse sollicita  
 aquae quantitatis aestimatione probasse mihi  
 videor <sup>2)</sup>).

H. A. WRISBERG <sup>a)</sup>), V. 1776.  
 ill., a. d. 24. Jun. 1775. in confesso  
 societatis regiae scientiarum Goettingensis  
 praelegit observationes & experimenta, ad  
 pulmonum docimasiam confirmandam institu-  
 ta. Postquam autem plures scriptores, qui  
 vel pulmonum docimasiae nimium iusto tri-  
 buerent, vel nimium eius fidei detraherent,  
 adduxit; „Errant omnino, inquit, & graui-  
 „ter errant, qui pulmonum experimentum  
 „ad caedem infantum confirmandam prima-  
 „rium & infallibile appellant, eidemque neg-  
 „lectis

<sup>2)</sup> In editis b. parentis obseruat. Medic. Gutachten,  
 p. 203 seq.

<sup>a)</sup> Obs. ad confirm. docim. pulmon. institut. in actor.  
 acad. Goett. T. VI. p. 41 sq. Goett. 1776.

„lectis omnibus cautelis & circumstantiis so-  
 „li confidunt. Errant pariter, qui omnem  
 „probandi valorem huic docimasiae denegant,  
 „& dolendum est omnino, egregios viros,  
 „BOHNIVM, ALBERTI, HEISTERVM  
 „constantissime contra pulmonum experimen-  
 „tum declamasse. Prudentiores autem, me-  
 „diam ingredientes viam, cum magnis in ar-  
 „te viris, HALLERO, CAMPERO, DA-  
 „NIELI, BOSIO, docimasiae, debita sub  
 „encheiresi institutae, suum probandi valorem  
 „restituunt, plus verò exinde probari nolunt,  
 „quam experimenti theoria, pulmonum con-  
 „ditio, rerum in fetu obseruatarum circum-  
 „stantiae, aliaque argumenta postulant. „

Quid de argumento nostro proferre ve-  
 lit, his exponit: „Praemissa primo breui  
 „theoriae recensione, cui pulmonum doci-  
 „masia vtut principiis hydrostatico-physicis  
 „nititur; *paullo post* subiungam, qua ratione  
 „pulmones, aqua nunc leuiores facti, denuo  
 „maiori grauitate specifica imbui possint:  
 „tertio loco, quaenam partes C. H., vt ipsi  
 „pulmones, ad natandum disponuntur: quar-  
 „to ex aduersariis ad famosissimam obiectio-  
 „nem respondebo, an foetuum pulmones, qui  
 „certissime mortui nati sunt, & eadem ratio-  
 „ne

„ne expansis perfecte similes sint, & eadem  
 „ratione natent: vltimo tandem loco aliquot  
 „corollaria docimasiae vsum partim illustran-  
 „tia, partim limitantia, subiungam., Dolen-  
 dum vero Cel. auctorem non nulla in aliud  
 tempus distulisse.

Igitur monet 1) sibi multis experimentis  
 constare, grauitatem specificam pulmo-  
 num fetuum, tam abortiuorum & im-  
 maturorum, quam maturorum, esse ad  
 aquam fontanam purissimam, vti 14:  
 13. vel 20:19., vel vt 28:27, vt pul-  
 mones, aëre nondum mutati, 15<sup>a</sup> circiter  
 parte aqua communi grauiores sint (&  
*Sauagesius*, in embryologia, rationem  
 pulmonum ad aquam fecit vt 450:434.  
 vel vt 30:29.).

2) Inde fit, vt tum integrum animal, non  
 putridum, nec aut viuum a natura, aut  
 ab arte, ad natandum dispositum, sub-  
 mergatur, tum mergantur ossa, carti-  
 lagines, viscera, muscoli, vasa, nerui:  
 subito cerebrum, renes, cordis frustu-  
 la, hepar, testiculi, prostata, thyreoidea:  
 paullo lentius lien, thymus, placenta  
 humana, *pulmones, respirationem non-*  
*dum experti*, frustra cutis, musculorum-  
 que,



que, intestinorum, vesicae, cet. Tardius etiam cellularis tela mollior, membranae reliquae, partes, pinguedine refertae, tardissime varii praeter adipem humores. Tum „sufficit, inquit, si „pro medio quasi numero adsumimus, „totum C. H., sic pulmones integros, „respiratione nondum mutatos, ii. vel 12. „circiter parte aqua purissima esse specificice grauiore, quae grauitas paullo „maior mirorue est.”

- 3) Pulmones facile aërem suscipiunt, indeque fit, ut innatent aquae, possunt vero incapaces fieri ad natandum. Quamuis enim aqua vel a viuo hausto, vel iniecta, pulmones non possit ad submergendum perficere, ut tum Cel. auct. experimenta instituta comprobant, tum HALLERI (op. min. T. I. p. 321.), & ROEDERERI (de suffoc. fat. p. 50 sq.) al. obseruata; possunt tamen sanguis, scirrhi, materiae tephaceae, rel. Hinc „ut vero his morbis, inquit, aëre iam „expansi & leuiore facti, pulmones denovo grauiore fieri possunt, sic ante „natiuitatem partim in utero materno, „partim sub enixu, scirrhis, induratio- „ni-

„nibus a sanguine congesto & vesiculis  
 „impacto ad subeundam respirationem  
 „absolute incapaces reddi possunt. „  
 Itaque scirrhorum pulmonum fetuum  
 praematurorum dua exempla recenset.  
 „In aperto thorace partus, fine 6. mensis  
 „nati, dexter pulmo paruus, duriusculus,  
 „coloris fusci, integer, & in frustula dis-  
 „sectus, in aqua fundum petebat. Sini-  
 „strum pectoris cauum a scirrroso pul-  
 „mone ita replebatur, ac si fortissima  
 „aëris inflatione distentus esset, vt re-  
 „moto sterni quasi cum renisu prorum-  
 „peret. Totus pulmo in scirrhum du-  
 „riusculum fusci coloris mutatus erat :  
 „in aquam proiectus fundum cito quae-  
 „siuit. „ Et sic in alio fetu.

## XXII.

I. KIERNANDER <sup>b)</sup> de ex- 1776.  
 perimento pulmonum fuscis egisse, illi  
 vero non soli confidere, & contra inflatio-  
 nem in os monuisse, dicitur, vix pulmones  
 ob mucum facile dilatari posse, vnde vnus  
 obitus nataturus, alter submersurus esset.

I. C.

b) *Utkast til Medicinal-Lagfarenheten &c. Nordström*  
 1776. 8. *Murray med. pr. Bibl. T. II. p. 428.*

1776. I. C. QVISTORP, Ictus c), haec  
 proposuit. „Obwohl aus der guten  
 „Beschaffenheit der Lungen des Kindes zu  
 „folgern ist, daß die Geburt des Kindes wirk-  
 „lich lebendig gewesen sey (HARPRECHT  
 „dec.) so kann jedoch die Gliedmaessigkeit dess  
 „Kindes, und das noch nach der Geburt  
 „gedauerte Leben desselben durch die be-  
 „kannte Lungenprobe nicht bewiesen wer-  
 „den, indem ein Kind zwar hat lebendig  
 „seyn, allein schon selbst bey der Geburt,  
 „und ehe es von der Mutter gekommen,  
 „sein Leben verlieren koennen (BOHN.  
 „KRESS.). Einige Rechtslehrer (LEYSER)  
 „wollen die Lungenprobe als einen Beweis  
 „der Unschuld, oder als einen Vertheidi-  
 „gungsgrund zugelassen wissen. Andere  
 „(EISENHART) behaupten, daß man  
 „zwar aus dem Schwimmen der Lunge  
 „das Leben des Kindes nicht mit Gewissheit  
 „schliessen koenne, daß man aber aus dem  
 „Sinken der Lunge den Tod des Kindes  
 „bey der Geburt folgern müsse. Noch an-  
 „dere (de BOEHMER ad art. 131. C. C.)  
 „verwerfen die Lungenprobe, wenn von  
 „der Verurtheilung die Rede ist, und las-  
 „sen

c) In den Grundf. des teutschen peinlichen Rechts,  
 2. A. Rost. 1776. 8. §. 271. p. 421 sq.

„sen sie zu, um darauf die Erkaenntniß der  
 „Tortur zu bauen. Da iedoch bewaehrte  
 „Aerzte (HEISTER, ROEDERER) zeigen,  
 „dass die Lungenprobe überhaupt dasieni-  
 „ge nicht leiste, was man sich gewoehnlich  
 „von derselben zu versprechen pflegt; so  
 „kann man dieselbe auch nur bey andern  
 „gegründeten Merkmalen; wodurch das  
 „Leben des Kindes bey und nach der Ge-  
 „burt schon an sich genugsam bewiesen  
 „wird, als ein blosses Hülfsmittel zulaf-  
 „sen (ZELLER). Ein solches Hülfsmittel  
 „ist iedoch die Lungenprobe nur sodann,  
 „wenn die Lunge frisch, und noch nicht  
 „in Faecniss gerathen ist, wenn sie von al-  
 „len Arterien sorgfaeltig abgesondert und ge-  
 „reinigt worden; wenn die Lunge nicht al-  
 „lein, da sie noch ganz ist, sondern da sie  
 „in Stücken zerschnitten worden, auf dem  
 „Wasser schwimmt. (HEBENSTREIT,  
 „TEICHMEYER, LIEBERKÜHN). „

P. CAMPER <sup>d)</sup> v. Cel. negat, 1777.  
 infantem citius respirare, quam vti

posset

d) *Abh. v. d. Kennz. des Leb. v. d. Todes b. neugeb. Kind. aus dem Hollaend., Frkf. und L. 1777. 8. Prodiit quidem liber iam Leov. 1774; sed quum A. ad hanc versionem, quaedam huc facientia addiderit, eum hic posui. — S. III. p. 43 sq.*



posset partibus omnibus, respirationem absoluentibus, hinc omnino non posse in vtero, siquidem vterus, effluxis etiam aquis, adeo se contrahat, ut vi tantum extendatur. Itaque testatur, se obstetricantem saepius animaduertisse, infantem natum, ab umbilicali autem funiculo retentum, non citius vel respirasse, vel clamasse, quam omnino natus esset: e contrario obseruauit, infantem, ad abdomen usque natum, clamasse, retardatum ab umbilico. Sub putredine tanta, ut omnia capitis ossa statim eximi potuissent, pulmones tamen, ea etiam corruptos quodam modo, fuisse submersos. — Et sic plures subiungit obseruationes, ubi maior aderat in mortuis natis putredo, nec tamen minus pulmones submergebantur. p. 62. sq. Triplicem usum praebere experimentum, statuit: 1) certitudinem corporis delicti. 2) Ut iudex inquisitionem facilius absoluat. 3) Ut mater absoluator negans, se viuum peperisse. p. 64.

Quando pulmones infantis putridi natarent, nihil certi concludi debere; & licet respirauerit vixeritque infans, tamen non esse crimen, ream absolvere. p. 65. In renunciatione vitam & respirationem non posse separa-



parari, sed debere vnum idemque esse, quamuis infans natus non semper statim respiret. p. 76.

Seçt. V. Inhalationem aëris, vix credit, matrem esse suscepturam, neque alium quempiam, nec facile posse perfici. p. 82. Si infans, putredine corruptus esset, atque institueretur experimentum, cor esse solvendum, monet, ne aër, in corde euolutus, errorem producat. p. 84. Nuper adiicit obseruationem sequentem. Obseruauit in duobus infantibus, mortuis natis, (quos per aliquot horas in aqua tepida, & dein calida posuit, vt aequarent iam viuos natos, quorumque pulmones erant atrorubri & subnigri, & particula abscissa submergebatur), inhalato per os admotum aëre: 1) abdomen increuisse ab aëre, intestina distendente, vt faeces aluinae prodirent. 2) sanguinem ex umbilico effluxisse magno impetu. 3) pectus dilatatum esse. Pectore aperto, adparebant pulmones coloris rosei, & aëre repleti natabant. p. 87. Testes adducit V. G. & G. COOPMANN S. Testatur etiam, se in illis, atque alio mortuo nato, aërem facile inflare potuisse.

Señt. VI. misericordis esse, statuere toties, editum esse mortuum infantem, quoties pulmones fundum petunt, nec certi quid edicere, quum in putridis natant: e contrario quum natant in non putridis, viuum natum esse, edicere. Monet, euitandam esse enunciationem, infantem *vel in partu; vel post eundem*, vixisse, quum, ipso iudice, sub partu nulla fiat respiratio. Neque medici esse, quod fecerit CROESER, (omnes tamen, quorum est, merito faciunt) iudici indicare, quibus modis infans enectus sit?

## XXIII.

1777. I. C. R V E F <sup>e)</sup> V. Cl. breuibus tradit, certum esse vitae signum pulmonum natationem; & mortui nati submersionem testari de morte ante partum. In suffocatis pulmones fundum quidem quoque petere, sed tum vasa sanguinea esse referta, quod in aliis non essent.

1777. G. G. P L O V C Q V E T <sup>f)</sup>, V. Cl. contendit, natationem pulmonum docere, pulmones aërem continere: §. 145. qui vel per respirationem, vel per inflationem, illuc peruenisset. Quoad inflationem

e) Unterr. von Criminalfaellen, Nürnberg. 1777. p. 37 sq.

f) Abh. v. d. gewaltsam. Todesart. Tüb. 1777.

tionem monet, & ICtos & Cl. ESCHEN-  
BACHIVM male negare, eamdem non prae-  
sumendam esse ab infanticida: hic enim illam  
praesumptionem esse admittendam, quum de  
eo quaereretur adhuc, an sit infanticida?

§. 146. Pulmones putridos natate quidem,  
sed submergi expressos. Si itaque post ex-  
pressionem natent, per respirationem aërem  
in pulmones peruenisse; si submergantur  
post eam, causam esse aërem, putredine  
resolutum.

§. 147. Ex submersione conclu-  
di posse, pulmones aërem non continere,  
inde vero non sequi, vt infans mortuus na-  
tus sit, atque adsentit ZELLERO, non  
liberare submersionem ab inquisitione.

Mergi pulmones, morbo laborantes, mucos,  
vel sanguine, oppletos: idemque inprimis  
obseruari in variolosis.

§. 148. Praeter ex-  
perimentum sollemne alios dari diiudican-  
dae respirationis modos, nimirum: 1) ant-  
lia pneumatica vtendum esse; 2) colore;  
3) densitate pulmonum, manu admota &  
visu diiudicanda. 4) eorumdem incremento.

§. 149. Maiorem sanguinis copiam pulmo-  
nes continere, desumptos ex infante, qui re-  
spirauit. §. 150. Hanc copiam cognosci visu,  
diametro vasorum aucta, & pondere aucto,  
vt differentia esse videatur vnciar. ij. Hinc no-

uum proponit experimentum. Vult, periculis multis inueniatur ratio ponderis totius corpusculi infantis ad pulmones, tum eius, qui respirauit, tum illius, qui non respirauit: & tunc in casu obuiio, primum pondus totius infantis, tum pulmonum eiusdem, adnotandum esse, statuit, atque ex hac ratione diiudicandum esse, an pondus accederet ad rationem 1. aut 2. Suppeditat rationis exemplum. Hoc experimentum magni habendam esse statuit, vbi putredo adesset, quum inde pondus absolutum parum mutaretur; & disci eo, an aër inflatus sit? quum nihil sanguinis tum ad pulmonem peruenisset.

§. 151. Negat denique, has mutationes certi quid probare, posse quidem certo statui, infantem vixisse, vbi signa §§. 146. 149. 151. adessent; sed, quum eadem deficiunt, concludi non posse, infantem mortuum natum esse.

1778. I. G. B A V M E R V S g), V. Cl., sermonem instituit de pulmonum experimento, nihil noui proferens, imo negligens, quae nouissima erant. Testatur tamen, „se in plurimum recens natorum dissectione

g) Med. for. p. 316 sq.

„ctione nunquam aliquod scirrhi vestigium  
 „inuenisse. „

ANONYMVS in Ephemeridi- 1779.

bus Gottingensium <sup>h)</sup> ex CARRAR-

DI Essais &c. haec retulit & adiecit: „Hr.

„P O R T A L habe einen Fall bestimmt, in wel-  
 „chem die Aerzte über die Kindermoerde-  
 „rey rathen koennen, wenn der rechte Lun-  
 „genflügel vor dem linken Athem holt: wie  
 „Hr. P O R T A L entdeckt habe, so koenne es  
 „geschehen, daß der eine Lungenflügel  
 „schwimme, obschon der andere sinkt. (Die-  
 „ser Irthum wird schwerlich entstehn; wenn  
 „ja der rechte Lungenflügel einen Vorzug  
 „hat, so wird es schwer seyn, daß grade in  
 „der Zwischenzeit, ehe die linke Lunge sich  
 „ausdehnt, ein Kind Athem zieht. Und  
 „wenn es geschähe, so würde nichts daraus,  
 „als höchstens ein Zweifel, niemals aber  
 „eine Verurtheilung eines Unschuldigen er-  
 „folgen koennen.) „! Quae omnia me non  
 perspicere, confiteri non erubesco.

I. C. L O D E R <sup>i)</sup>, V. Cl. nu- 1779.

per quoque edidit programma de

L 4

nostro

<sup>h)</sup> G. A. Zugabe, 24 Stück.

<sup>i)</sup> Inscríb. pulmonum docimofia in dubium vocatur  
 ex noua anatomica obseruatione, Ien. 1779. per-  
 tinet



nostro argumento: „At dixeris, inquit, difficilius esse cognitu, vtrum infans ipse, cuius pulmones aquae supernatant, aërem duxerit, an mater, de cuius vita sollicita, eidem, etsi mortuus ex utero venerit, aërem in fauces inflauerit. Audio. Verum pulmones infantis in clauso thorace, ne folle quidem adhibito, aëre satis repleti & distendi possunt, quia, quod ad respirationis negotium requiritur, musculorum intercostalium, abdominalium, aliorumque & diaphragmatis auxilium, post mortem cessat, adeo, ut vacuum thoracis, vel maximo impetu, eum in modum minime dilatari possit, quo certissime ampliatur, vbi infans ipse aërem duxerit \*).

„Docimasiam pulmonum, etsi magnam veritatis speciem prae se ferat, dubiam tamen esse, nisi alia argumenta accedant, ex quibus aut innocentia, aut commissum crimen feminae, infanticidii causa accusatae, erui possit, egregie mihi probavit exemplum observatio, cuius iam mentionem faciam. „

Ad-

tinet ad I. I. G. BERGMANN d. de plethora sub ill. GRVNERI praef. hab.

\*) l. c. p. 7.

„Adferebatur fcilicet mihi nuper cada-  
 „uer infantis praematuri, qui horas tredecim  
 „vixerat. Pondere aequabat libras duas,  
 „longitudine pollices parafinos 13. Aperto  
 „thorace, animaduerti cum non nullis audito-  
 „ribus, pulmones collapfos, eodemque colo-  
 „re tinctos, quo gaudent in illis infantibus,  
 „qui numquam aërem duxerunt. Exempti  
 „pulmones in aqua fubfidebant, id quod  
 „etiam factum eft cum a corde & thymo fe-  
 „parati, iidemque in fruftula minima diffecti  
 „effent; at aquae, fale communi faturatae,  
 „innatabant. In cauffam vero inquirens, cur  
 „huius infantis, qui testibus pluribus, vocem  
 „ediderat, tredecim horas vixerat, & placida  
 „denique morte occubuerat, pulmones aquae  
 „limpidae non innatarent, nullam earum cauf-  
 „farum, quarum antea mentio facta eft, in-  
 „ueni. Pulmones enim nec fanguine, nec  
 „muco, nec materia tophacea repleti erant,  
 „nullumque in iis fcirrhorum veftigium ap-  
 „parebat. Pergens in diffecando cadauere,  
 „reperi foramen cordis ouale hians & aper-  
 „tum, viam per ductum arteriofum Botalli  
 „valde liberam, & ductum venofum in abdo-  
 „mine peruium <sup>k)</sup>. „

L 5

*Ipfè*

<sup>k)</sup> l. c. p. 8. 9. Iudicium in aliud tempus diftulit.

*Ipse* iam ante plures annos incidi in experimentum, quod tum quidem cum aliquot amicis communicaui, iam ante annum vero cum nonnullis V. Cel. communicaui, ut & placuerit Ill. BALDINGERO <sup>l)</sup>, eius descriptionem edere, quam repetam §. XXXV sq. Eius vero descriptionem dare, quum de letalitate vulnerum libellum ederem, me tum prohiberi, iam in eius praefatione dixi: & spero, intellecturos esse aequos rerum arbitros, me censuram Cl. PLOUCQUETI <sup>m)</sup> non mereri, quum facile quisque crediderit, me facile in ea quoque incidere potuisse, quae PLOUCQUETI experimentum solum constituunt.

Et sic quidem, missis, ad casus varios pertinentibus, speciliarioribus de docimasiae vi Cl. virorum sententiis, haecenus prolatis addam animaduersiones.



## SECTIO

<sup>l)</sup> Neues Magaz. für Aerzte, T. 2. f. 1. p. 42 sq.

<sup>m)</sup> Abh. von den phys. Erfordern. der Erbtaehigk. der Kinder, p. 145. n.

## SECTIO III.

## ANIMADVERSIONES.

## XXIII.

*Infanticidium aegre definitur.*

**V**bi de mortis causa infantum nuper natorum non constat, vel ob grauiditatem celatam, ob partum clandestinum, ob res egenas matrum, matrimonio etiam obstrictarum, cet., mors nuper natorum suspecta est, ibi de infanticidio quaestio est. Et tum quidem, vtrum casu, an culpa, num dolo, eoque vel directe, vel indirecte, vel matris, vel aliorum, infantum mors producta sit? quaeritur. Quum vero infans etiam naturali omnino morte decedere, & mater etiam saeuire in mortuum infantem, adparenter viuum, aut alius quis infantem, per naturam debilem mortuum, laedere varia ratione, possit: atque infanticidium dolosum, culposum, casuale, impune, & ante partum, & sub eodem, & post illum perfici queat, hos casus discernere inuicem & ab adparenti nos posse, omnino oportet. Olim quidem iudices inquisitione ad eruendum verum vsos esse, & tor-

men.

menta etiam in vsum vocasse, medicorum vero iudicium neglexisse; supra monui. Sed lubricae nimis eruendi veri rationi infisti non potest. Ne enim matres vel per vitae taedium, vel per vim adhibitam, eloquantur veritati repugnantia, metuendum est. Quid? quod aliquando infans adparenter modo viuit, mouet, ex superstitie etiam post mortem irritabilitate, artus, vel debilis animam haurire nititur, & decedit suffocatione naturali; vbi, si matris intentionem posueris, infantem viuentem occidendi, metuendum est, ne, omnino non secuto effectus, solum nocendi propositum, tamquam infanticidium, idque dolosum, puniatur.

## XXV.

*In eo detegendo iuuat pulmonum scrutinium.*

Itaque vt idem euitarent, iam praecedenti saeculo operam dederunt, eumque in finem in foro adhibuerunt pulmonum experimentum: vt, inquam, in primis discernerent, viuumne, an mortuum, infantem mater peperisset, atque num occidisset, aut secus? Et tum temporis, ob GALENI<sup>n)</sup> effa-

n) „Quippe in confesso est, inquit, & spirationem a „vita, & vitam a respiratione separari non posse: „adeo,



effatum, respirationem a vita & vitam a respiratione separari non posse, existimabant. Hanc vero sententiam iure esse explosam, ex argumentis supra adductorum virorum sufficienter constat, *siquidem certum quidem est, vixisse infantem, qui respirauit, statui vero in vniuersum nequit, eum non vixisse, qui non respirauit*, vt hinc ZELLERVS bene moneret, respirationis absentiam non liberare ab inquisitione.

Sed adnotatione in primis dignum est, VV. Cl. tum, quum in forum induceretur experimentum, statuisset, ante partum, vel in partu infantem occidi non posse. Sic enim OVERKAMP IVS <sup>o)</sup>: „Quomodo fetus in „partu, & extra partum, antequam respirat, occidi possit, non intelligo, siquidem „occidere est aliquem violenta manu vita „priuare, & quod non respirat, vere non „viuit, iam vero embryonem non respirare, „ergo nec viuere, constat, ergo nec occidi „posse sequitur. „ Itaque experimentum, quod docebat, num quis occisus esset infans, an

„adeo, vt viuentes non spirare, & spirantes non „viuere, sit impossibile. „ *De locis adfect. L. VI. Cap. 5. Cl. IV. p. 80.*

<sup>o)</sup> l. c. p. 268.

an fecus? quod ope respirationis factae, vel non factae, signorum decidebatur, summae tum utilitatis habebatur.

Quum vero, licet haec sententia erronea sit, nihilo minus ope signorum, testantium, factam esse veram respirationem, certissime de vita infantis iudicari possit, quamvis supersint aliquando casus, ubi vitalitatem infantum per haec erui nequeat, respirationis tum effectus, tum signa, examini subiiciamus, atque, quae huc faciunt, breuiter exponamus, ut, quid in ea virorum Cl. opinionum diuersitate statuendum sit, diiudicari facilius possit.

## XXVI.

*Fetus in utero non respirat.*

Fetum in utero, usque ad instantem partum, non respirare, hodie inter omnes constat p). Argumenta eo redeunt, quod nullus:

p) HALLERI elem. phys. T. VIII. p. I. p. 397 sq. p. 400. haec habet: „Nunc quidem certum est, „in fetu longe plerumque pulmonein densum esse, „hinc compressos annulos asperae arteriae pulmonalis, neque aëri facile accessos. Porro pulmonis aërea vasa, ipsamque fistulam spiritalem flauesciente & subrubello muco plenos esse constat, „ut saepe necesse sit, eum de pusionis ore soluere, „ut vomitu demum idem reiiciatur. „

lus aër, neque a matre per sanguinem, neque per externas partes & membranas ad fetum venire possit, quod alia sit circulatio in fetu, & infante nato quidem viuo, sed non respirante, ac in eo, qui respirat: imo quod color pulmonum infantis, qui non respirauit, sit attroruber, pulmones collapsi, sanguine destituti, atque aquae iniectioni submersuri sint, quae omnia in illis deprehenduntur, qui ante respirationem mortui sunt.

De colore pulmonum possis dubitare, quod CHARLETONVS, & MAZINVS, imo etiam quodammodo DIEMERBRÖECKIUS, pulmones in iis, qui non respiraue-  
rant, albicantes deprehenderunt, quod quidem ipse nuper quoque obseruaui; eosdem veronon semper esse collapso, ex ALBERTI <sup>9)</sup> ZIERHOLDI, & WRISBERGII monitis patere arbitror. Sanguinis autem defectus non tantus mihi quidem esse videtur, quantum plerique medici statuunt, vnde error omnino facile nasci potest. Nimirum quamuis alia sit sanguinis in fetu circuitus ratio, vt ope cordis in pulmones parum sanguinis veniat, quum per foramen ouale maxima pars ex dextra cordis aure in sinistrum sinum trans-  
eat,

9) Cf. §. XI. 1728.

eat & per ductum arteriosum plurimum a pulmonibus auertatur; tamen sanguinem ad pulmones etiam deferri, negari non potest, siquidem, praeter arteriam bronchiale, pulmonalis etiam arteria, in fetu maior, quam aorta, sanguinis aliquam copiam ad pulmones transfert, quamvis plurima ad aortam per ductum arteriosum feratur, ita, ut aestimantibus BOERHAAVE & HALLEROTertia pars sanguinis massae sanguineae in fetu per pulmones transeat<sup>1)</sup>. Atque ex eo intelligi posse puto pulmonum colorem, pondus, & aegritudines. Namque rubicundius ideo sunt pulmones, imo subfusci, in iis, qui nondum respirarunt, quia multum rubri sanguinis continent: in iis vero, qui respirarunt, vesiculae distenduntur, unde rubor minuitur, comprobante experientia. Imo idem causa mihi esse videtur submersionis, ut metuam, ne discissis vasis, atque expressor etiam sanguine, saltem efficiatur, ut pulmones mediis in aquis haereant. Porro pulmonum, aegritudines scirrhi nimirum, & calculi, & hydrops, intelliguntur, siquidem, ut pulmones crescant & nutriantur, sanguis requiritur, qui vitio laborare potest, ut haec illa inde

<sup>1)</sup> BOERH. prael. in inst. Vol. 2. p. 171. n. 9. & p. 174.

inde oriatur aegritudo. Neque igitur subscribere BÜTTNERI aliorumque sententiae possum, qui, aditum sanguinis ad pulmones fere omnino negligentes, statuunt, ex profusione sanguinis, ex pulmonum vasis inter discindendum animaduertenda, disci, an fetus respirauerit, nec ne? Ac nuper quoque ad vasorum pulmonalium conditionem in mortuis natis (quod euictum erat) animum sollicite aduertens, vasa vidi omnino turgida sanguine, qui exprimi facile poterat.

Quod denique submersionem pulmonum attinet, qua ad negandam respirationem in vtero vtuntur multi; animaduertendum est, eos casus, vbi pulmones, exempti ex mortuo nato, natarunt, maxime ob conceptam putredinem natasse, eisdemque scriptores, qui talia referunt, aut varia neglexisse, aut descriptionem leuem exhibuisse; vt igitur ei enunciationi omnino fidendum sit, fetum ad partum vsque in vtero omnino non respirare.

## XXVII.

*Neque effluxis aquis in vtero aut vagina fetus respirat, vno casu excepto.*

Sed iam quaeritur, an possit fetus respirare, si membranae ruptae sunt & aquae

M

effluxae?



effluxae? Quamuis enim HEBENSTREITIVS, MORGAGNVS, alique, monuerint, tales esse partus, vt mater in quaestionem criminalem non incidat, siquidem eadem sola hos absolvere non possit; summi tamen viri non videntur attendisse, aliquando etiam matres, legitimo matrimonio <sup>s)</sup> obstrictas, & obstetrice <sup>t)</sup> vtentes; aut aliis testibus parturientes <sup>u)</sup>, infanticidii suspectas esse, imo posse quoque infantem ante partum occidi, & sub partu. Igitur vt pateat, an, quae aut matres, aut adstantes de partus ratione deponunt, veritati consentanea videantur, an secus? haec quaestio omnino attentione digna est, quamuis de respiratione ea alias quaestio non sit, nisi sub laborioso partu.

Igitur ruptis membranis & effluxis aquis, tum in vtero, tum in vagina, infans respirare non poterit, licet praeter alios id contingere posse, & HALLERVS <sup>x)</sup> docuerit, & huc possint varii casus referri, vbi pulmones natarunt, exempti ex fetu, mortuo ante par-

s) E. C. ALBERTI l. c. T. III. c. 17.

t) E. C. ALBERTI l. c. T. IV. c. 5.

u) Vt in BÜTTNERI cas. 73.

x) *pr. lin. phys.* §. 926. *el. phys.* T. VIII. p. I. p. 401.

partum. Hos enim casus per putredinem, aut aliud vitium, potius explices, & attendas, omnino non posse respirationem absolui, nisi omnes partes, eandem absoluentes, natae & liberae fuerint; siquidem infantis thorax ab hepate maiore, ab intestinis, meconio turgidis, ab utero, arctius se constringente, aut ipso situ infantis, in vagina incommodo, & resistentibus, perinaei cute, partibusque, vaginae vicinis, a situ oris, plerumque directo versus cauum ossis sacri, & vagina resistente, adeo comprimitur, ut respiratio peragi non possit, ad quam solus aëris accessus ad infantem, ob partus rationem debilem, omnino non sufficit. Hinc etiam HALLE-RO y) non videtur probabile, „eo in situ „posse fetum se mucos, pulmonem inficiente, liberare, & ita diaphragmate uti, ut capite deorsum protuso, incommodissimo in situ, & inspirare, & cum vagitu respirare possit. „ Vagitus vero, & vterinos, & sub partu contingentes, quod attinet, ei partim ad historias fictas referendi sunt, partim, bene monente Cel. CAMPERO, errori locus est, siquidem mater, linteo quodam tecta, infantem edit, ut infans absconditus, atque ad abdomen usque natus, vagire tum

M 2

fa.

facile possit, quod imponit medico, obstetrici adstanti, neque accuratius inquirenti, ut pro vagitu vterino habeat eum, qui non est. Hinc etiam viri, in obstetricia arte celeberrimi, ROEDERERVS, CAMPERVS, GEHLERVS, WRISBERGIVS, negant, respirare infantes in vagina. Alii viri clariss. ideo in primis negant, quod respirationem praecedere debeat thoracis dilatatio, in illo casu non peragenda. Negant itaque ROEDERERVS, WRISBERGIVS <sup>2)</sup>, BOSE <sup>a)</sup>, GEHLER <sup>b)</sup>, VV. Cel.

Tamen attendi debet, fetum, natum capite, pectore & abdomine, retentum vero ab umbilico, pedem obuolvente, respirare omnino posse, monente etiam & obseruante Cel. CAMPERO; is vero solus erit casus, tumque infans pro nato fere habendus est. Igitur, ubi respirationis signa adsunt, inquirendum, an hic casus obtinuerit. E contrario, quando infans pedibus, abdomine, & pectore ad caput vsque natus, respirare posset creditur, retentus ob collum, a partibus genitalibus constrictum, aut a latis humeris,

total

2) pr. de respir.

a) Respir. fet. D. I. §. 7.

b) Pr. de prima resp. fet.

tota partus ratio respirationem non permit-  
ter. Vbi vero arte educitur infans pedibus,  
& vel ob nimiam capitis molem absolutam,  
vel relative ad compressam peluim, retinetur  
caput, statuunt aliqui, vt B. IDEMA, RÔE-  
DERERVS, infantem respirare posse; seque  
thoracis dilatationem obseruasse, vterque,  
vagitum audiuisse, ille testatur. Cel. GEH-  
LERVS <sup>c)</sup> tamen in omnibus fetubus, quos  
eduxit artificii ope, nullum respirationis  
signum vidit, licet soluto capite clamarent,  
vel ad vagiendum adhibita opera excitaren-  
tur. Itaque dubitari licebit de partu hoc  
*difficili.*

## XXVIII.

*Infans natus non semper mox respirat.*

Infans autem natus respirare poterit:  
sed inde non sequitur, vt respiret. Primo  
enim, quando fetus cum membranis integris  
nascitur, neque eaedem mox remouentur,  
saltem citius, quam circuitus sanguinis ad  
modum illius in vtero adhuc perdurat, in-  
fans ob defectum respirationis decedit. Dein-  
de idem etiam ante partum & in partu eius-  
modi interdum subest conditionibus, quæ

M 3

effi-

c) l. c. p. 10.

efficiunt, vt iam natus non respiret. Vel enim ex partus difficultate, nata a capitis incuneatione, vmbilici circa partem infantis, praecipue collum, obuolutione, vel ob solutam ante partum placentam, debilis infans nascitur, aut a hausto liquore amnii, aut abundantibus faucibus, aspera arteria imo pulmonibus, muco subrubro, aqua submersorum instar, rhoncho laborans editur; imo in his casibus non prius respirat, nisi variis adiutus fuerit auxiliis, alibi commemorandis, imo facilius etiam moritur. Denique debilis, nuper editus, conuolutus potest ore incumbere rebus, aëris introitum impediens, aut ex vagina proditurus incidit in aquam, latrinam, aut liquoris amnii in vase, matri supposito, factam collectionem, aut impediunt lingua ad palatum adiuncta, curua corporis figura, plica colli, super pectus adducti \*).

Quodsi de his quaestio incidit, partim de his medicus iudicare poterit, tum ex signis debilitatis, in cadauere conspiciundis, tum ex iis, quae deponuntur ad acta, fide digna, partum concernentia.

XXVIII.

\*) HALLER el. phys. T. 3. p. 225.



## XXVIII.

*Respirationis effectus commemorantur. Thoracis incrementum. Volumen pulmonum auctum. Vesicularum distensio. Color. Copia sanguinis aucta. Ponderus imminutum.*

Sed iam accedamus ad respirationis effectus, huc pertinentes.

Respiratione, notum est, cauitatem thoracis modificari, in adultis ea quidem lege, ut tum augeatur, tum in pristinum statum redeat cauum. Atque in infante nuper nato, credas, thoracis cauum dilatari in ratione virium, cauum diducentium aequae, ac in adulto, simul vero pulmones irruentis aëris tantam suscipere copiam, ut, post vegetam saltem respirationem, pulmones fiant pleurae contiguae, repetita vero inspiratione, & maxime per vagitus, sic credas diduci cauum thoracis, atque ab iterum valide sic hausta aëris copia diduci pulmones, hacque diductione adeo inuitari sanguinem in pulmones, ut iidem, maiori sanguinis copia obruti, non possint ad eum pristinum statum reduci: sed thorax capacitate aliquatenus, ad certam tamen mensuram, augeatur. Id vel ex ratione grauitatis specificae pulmonum adultorum ad

infantum credas, quae est  $= 30 : 1.$ , dum ea totius corporis est  $= 8 : 1.$  *d*).

Per hanc rationem explices, qui fiat, ut infans *debilis*, qui non sufficit producendae sibi ei capacitati thoracis, possit vagire & respirare aliquamdiu, & tamen exhibere pulmones, in aqua subsidentes, fuscis, siquidem tantumdem videtur sanguinis ad pulmones inuitare ut ii sint aqua specificè grauiore, non eam aëris copiam suscipere, quae sanguinis pondus superet. Explices etiam, cur hic pulmonum infarctus inducatur ab omni debilitate, vel sit a capitis incuneatione, vel a cohibita circulatione per collum, umbilicum, pulmones, & cur huic medeatur modica vasorum depletio per haemorrhagiam umbilicalem. Explices demum, cur impedimentum respirationis haemorrhagiae umbilicali faueat, respiratio bene peracta impediat.

Hanc dilatationem vero non produci credas ab inhalatione pulmonum, sed statuas, inhalatione solum pulmones ad id volumen perducere, ad quod perducere potuissent a debili respiratione, ideo vero natum credas, quod nullus per imitatum solum respirationem sanguis possit ad pulmones in mortuo infante inuitari.

In-

*d*) Cf. HALLER *el. phys.* III. 243.

Inspiratione bronchia, & cum iis pulmones in vniuersum longiora, latiora, & profundiora fiunt: quod dum fit, necesse est, vasa etiam sanguifera fiant longiora, latiora & diametro ampliora: quae mutatio ab irruente aëre feruatur, vt tamen aliquatenus imminuatur expiratione, mox subsequente: „quo enim arctius in feru pulmo compressus est, eo post partum maiorem dilatationem subire est idoneus, quoad finem perueniat suae ad dilatationem aptitudinis. Haec caussa est, quare tanta, a primis respirationibus in pulmone mutatio sequatur, vt etiam ab vnica nant, qui ante eam vniam respirationem in aqua subsidebant,, <sup>e</sup>). Inspiratio vero, quae capacitatem vasorum auxit, deriuat sanguinem versus pulmones, vnde variae etiam, ratione circuitus sanguinis, contingunt mutationes, quas iam mittere lubet.

Incrementum pulmonum in vniuersum satis omnino magnum est in iis, qui bene animam duxerunt: eius enim, qui non respirauit, pulmones collapsi ad dorsi vertebrae conspiciuntur, pectoris cauum non omnino replent, nec pericardium adeo tegunt: eius vero, qui respirauit, pulmones pectoris cauum implent,

M 5

ma-

<sup>e</sup>) HALLERVS in el. phys. T. VIII. p. 2. p. 2.

magisque pericardium abscondunt, vt mire-  
ris, hoc signum, ab ETTMÜLLERO &  
WILLISIO iam commemoratum, paucis  
de hoc argumento scriptoribus celebrari.

Vesicularum distensio, atque aërea re-  
pletio, quibus nititur primario volumen pul-  
monum auctum, magni quoque habenda est,  
siquidem eadem & factam respirationem ple-  
rumque indicat, & cognoscitur facile tum  
per sonitum, inter pulmonum dissectionem  
percipiendum, tum per experimentum sol-  
lemne.

Color etiam pulmonum respiratione mu-  
tatur. Is enim in iis, qui non respirarunt,  
est ruber, atroruber, subfuscus, sit respira-  
tione dilutior, carni recenti similis, albidus,  
pro maiori, vel minori, sanguinis copia prae-  
sente varius *f*).

Vasa

*f*) Colorem pulmonum respiratione mutari, certum  
est, quod vel experimentum inflationis pulmonum  
mortui nati, respirationem imitantis, confirmare  
potest; eius vero causam aegre definiueris. Ex-  
tensio pulmonum, elasticitas, persistens post mor-  
tem, vt sonitus percipiatur, lenitas pulmonum,  
respiratione producta, rel. suadent accessum prin-  
cipii inflammabilis. Is vero ruborem potius in-  
tendere debet. An proprie, quod vulgo aër vo-  
catur, graue illud, acidaeque naturae elementum,  
principio inflammabili non destitutum, id prae-  
stat?

Vasa pulmonum sanguifera crescunt diametro & longitudine, vt inde, si aliquamdiu respirauit infans, nec mox per haemorrhagiam sanguis a pulmonibus reuulsus est, inde congrue de respiratione facta iudicare possit, qui rationem vasorum in mortuis nativis & viuis, aliunde certa ratione, nouerit. Atque ea vasa turgent interdum sanguine, pulmones adeo obruente, vt spontanea g) suffocatione, vel leuiori accedente frigore, obeat infans, aut quum de industria suffocatus est. E contrario, qui minus respirauit, sanguinisque maiorem copiam haemorrhagia amisit, exhibet vasa, interdum haud dilatata, neque obruta sanguine.

Sed pondus etiam specificum pulmonum imminuitur respiratione, quamuis sanguinis maiorem copiam acceperint, si aliquamdiu durauit vegeta respiratio, ob aërem largiter susceptum, vt aquae iniectioni supernatent, aut, si debilis fuerit respiratio, mediis in aquis  
hac-

- g) Est suffocatio a congenita infantis plethora ex tar-  
do forte partu rel. nata, aucta congestionibus ad  
pectus, quibus mederi licet per haemorrhagiam  
umbilicalem, vt pateat, matrem, quae tarde funi-  
culum umbilicalem praecidit, vt ne levis quidem  
haemorrhagia contingat, neque posse infanticidi-  
um committere, atque illa, quae iusto citius  
soluit funiculum.



haereant : atque hinc experimentum sollemne.

Notari vero oportet, nisi libera fuerit respiratio, nec diu durauerit, non omnino hos effectus vtrumque pulmonem largiri, sed hunc tantum, vel illum eorundem lobum, ita tamen, vt, monente CRAANEN, & consensiente Cl. PORTAL, imprimis facilius superior dextri pulmonis lobus aërem suscipiat.

### XXX.

*Experimentum pulmonum sollemne quid doceat?  
Monitum.*

Ergo horum effectuum omnium aër, respiratione haustus, caussa est. Cuius praesentiam varia ratione detegere possumus. Igitur videamus primo, quid sollemne experimentum valeat. Quodcumque corpus leuius est fluido, quod eius spatium occupare possit, supernatat, si grauius est, submergitur; & si grauitas specifica vtriusque aequalis est, mediis in fluidis haeret, quocumque posueris. Atque ibi quantitas fluidi nihil mutat, nisi id, quod, quum corpus, fundo impostum, a fluido superiori supprimatur, & contra in superficie depositum ab inferiori fluido susti-

sustineatur, vt, in vtroque casu corpus, mutata ratione, locum non seruet, grauitati suae conuenientem, sed a maiori fluidi copia difficultas rite iudicandi augeatur, submersurum attollatur, supernataturum submergatur <sup>h)</sup>. Igitur in admodum numerosis experimentis pulmones infantum, aut integri submergebantur vel supernatabant, vel in mediis aquis haerebant, aut, dissectorum pars supernatabat, altera submergebatur: rel. Si supernatant pulmones, aqua leuiore, si fundum petunt, grauiore, si in mediis aquis haerent, eiusdem specificae grauitatis esse, omnino euictum est: quum *caute* instituitur experimentum, sic, vt pulmones manu mediae aquae altitudini tradantur, atque ad variam altitudinem ferantur <sup>i)</sup>. Eam leuitatem ab aëre pendere, facile comprobatur, ex frequentiori etiam pulmonum submergentium inflatione, qua efficitur natatio. Igitur quum in aliis etiam exemplis mortuorum ante partum,

h) Cf. theoria natationis apud b. SEGNERVM in *phys. elem.* §§. 173 sq.

i) Per huius vero rei neglectum explices observationes, explicatu difficiles, dum pulmones infantum, qui vere respirarunt, fundum petierunt, aut eorum, qui non respirauerunt, pulmones natarunt id quando per aliam manifestam causam explicari non potest.

tum, ex vtero sectorum, infantum pulmones submergantur, ii vero non respirauerint (§. XXVI.); atque e contrario eorum, qui viui nati sunt, & ad tempus vixerunt, natantes exhibeant pulmones, quin aër, respiratione adductus, causa sit leuitatis & natationis, dubitari nequit.

Haec vero quamuis certissima sint, tamen, licet caute instituas experimentum, caue, concludas, vbi pulmones fundum petunt, aër non est, neque respiratio celebrata est; nec, vbi pulmones natant, aër est, ergo celebrata est respiratio. Nam quod *primum* attinet; ex data historia constat, pulmones interdum in iis fundum petere, qui respirauerunt, sed suffocati sunt, imo in adultis etiam ob morbos, scirrhus, calculos, rel., quibus etiam aliquando, testibus MORGAGNO, WRISBERGIO, fetus obnoxii esse possunt, submergantur: in iis vero aërem adfuisse, quis negauerit. Quod *alterum* attinet, interdum nullus aër ad pulmones peruenit, sed natant vel ob putredinem, vel ob hydatidem adnexam, forte, ut ALBERTI coniicit, aliquando ob tympaniti similem pulmonum morbum, vel ob aërem, mortuo nato ab aliquo inflatum ob inflatum aërem, mortuo nato, ab aliquo.

## XXXI

*Putredinis vis in pulm. exper. Animaduersio.*

Ulteriore[m] vero aestimationem desiderant putredo & inflatio. Diuersas esse scriptorum de putredine sententias, historia data edocet, idemque niti arbitror diuersis putredinis gradibus, & in periculis adhibita solertia. Quum eas observationes aestimamus, quas Cl. VV. instituerunt cum pulmonibus, ex cadaueribus subputridis desumptis, videtur omnino, statuendum esse, putredinem nihil omnino erroris suggesturam esse. Etenim non metuendum esse, ne pulmones, qui aëre, per tracheam suscepto, hoc iterum putredine orbentur, per numerosa experimenta & observationes constat, vt haec tuto mitti possint. Quod vero ad illam quaestionem attinet, num pulmones possint putredine aërem, per tracheam haustum, simulare? deprehenderunt haud pauci scriptores, pulmones, ex subputridis infantibus exemptos, sanos, a putredine vel omnino liberos, vel parum mutatos, in aqua subsidentes: & si quondam narrabant, alia argumenta conspirabant, infantem omnino viuum respirasse. Igitur ea experimenta, quae cum pulmonibus, in aqua putredini datis, instituta sunt, omnino nos

morari vix possunt: siquidem subputridus infans, qui pulmones aut bene constitutos, aut vix mutatos, adhuc largitur, inquisitioni adeo subtili aptus esse potest, sed alius, qui putredine adeo est correptus, ut pulmones inde admodum sint mutati, disquisitioni omnino, me quidem iudice, ineptus iudicandus est.

Ut tamen, ad illustrandum argumentum, de natationis causa, circa pulmones submersuros, putredine ad natandum dispositos, quid addam, mihi quidem pulmones non tam ob euolutum putredine aërem, quam ob euolutum, fibris inhaerens & putredine solutum principium, grauitate imprimis conspicuum, & separatum, natare videntur. Id enim patere, arbitror, ex frequentibus experimentis, ubi pulmones in eadem aqua, in qua putredinem conceperant, natabant; aquae vero purae iniectioni, imo expresso etiam liquore putrido (ut Cl. ESCHENBACH testatur), submergebantur: illa enim aqua, ob illud principium graue, quo iam imbuta erant (quod comprobare videntur particulae fibrarum solutae, vasis fundum petentes) specificè grauior reddita, omnino efficere potest, ut pulmones submersuri natent. Idemque comprobatur casus, relatus ab ALBERTI<sup>k</sup>). Id

verum

k) §. XI. 1728. d. §. V.



vero adnotatione & aestimatione omnino dignum est: namque si pulmones putridi non natant ob aërem euolutum, certissimum est, eorum volumen non increuisse, hinc volumen pulmonum certius indicat, num aëre distenti sint pulmones, an secus <sup>1)</sup>. Et licet etiam putredo efficiat, ut pulmones natent per volumen auctum, huius tamen incrementum tantum modo est, ut alia fiat grauitas specifica pulmonum ad aquam, ea scilicet, quae natationem efficiat, non tantum, quantum per respirationem mutati pulmones sistunt.

## XXXII.

*Inflationis vis in sollemni exper. pulmon.*

Inflationi pulmonum mortui nati infantis non obstare mucum, in pulmonibus & faucibus haerentem, quod metuunt v. c.

H E-

- 1) Cel. PRINGLE monet, carnem, putredini datam ante, quam odorem putridum spargeret, aquae innatasse, idemque tribuit particulis aëreis adhaerentibus, quamuis nudo oculo nullae aëris conspicerentur vesiculae adhaerentes. *Op. Ed. Brand. p. 508.* At quum iudicium non comprobet experientia, nihil obstat, quin dictae causae natationem adscribamus.

HEBENSTREIT & ROEDERER, ex institutis a BÜTTNERO & CAMPERO experimentis constat, quibus etiam discimus, inde ratione coloris, voluminis, (quod tamen mecum restringit Cl. LODER) ponderis diminutionis, infantum mortuorum pulmones illis viuorum adeo reddi similes, vt omnino metiendum sit, ne hic errorum fons oriatur. At quamuis negari non possit, aliquando in foro occurrere casus, vt BOHNII & BÜTTNERI, vbi de peracta inflatione quaestio est, tamen ibi per testes res satis euicta erat, atque an fides habenda sit depositionibus, ex aliis rei adiunctis diiudicari poterit. Quod vero PLOUCQUETUS moneat, & solam matrem posse inflationem perficere, nec praesumendam esse infanticidam, quum de eo quaestio sit; animaduertendum esse, arbitror, praesumptionibus in foro quidem eiusmodi non esse locum, neque in bonam, neque in malam partem, sed in matrem, infanticidii suspecta, adesse omnino, quae efficiant, vt de infanticidio quaeratur; ac mater, quae varia perfecit, atque inter haec inflationem vt infantem refocillaret, sponte idem edicat, & modum, quo peregerit, tum, quae praeter ea egerit, deponat, atque in alia rei adiuncta inquiratur, necesse est, vbi de hac re facile

facile constabit: sed absque his inflationem praesumere, est, mere possibilia aestimare. Hinc & G. BEYERVS <sup>m)</sup>: Inspiratio aëris ab aliq. facta (non infante ipso, s. respiratio) numquam fit similis, si quae sola & aliorum ope destituta. prolem illegitimam pepererit. Hinc, si reliqua suadent, respirasse infantem, haec iudicans edicat, inquisitioni relicturus, an de inflatione quaestio sit, vbi argumenta & rei adiuncta, depositionesque aestimanda sunt.

## XXXIII.

*Experimentum sollemne, & quae addiderunt BAVMERVS & BÜTTNERVS, non sufficiunt, ut tuto de respiratione iudicetur.*

Igitur experimentum sollemne docet, infantem respirasse, quum pulmões natant, desumpti ex infante non putrido nimium, & cui aër post mortem inhalatus non est: itaque in eo laude dignum est. At dantur casus, vbi infans vel per horam, vel per aliquot dies respiravit, eiulavit, vbi tamen pulmões submerguntur, quum suffocatus obiit. Hunc casum ex eo decernendum esse putauerunt KALTSCHMIEDIVS & Ch. BAV-

N 2

ME-

<sup>m)</sup> l. c. ad art. 33. n. 27. cf. LIEBERKÜHN l. c.

M E R V S , quod moneant, non fidendum esse soli experimento, sed coloris rationem simul aestimandam esse. Quamvis vero in plurimis, qui suffocati post peractam respirationem obiisse statuuntur, pulmones, maiori sanguinis copia obruti, & submergentes, colore tamen rubicundo, aut iis simili deprehendantur, qui vere respirarunt, adeoque suffocatio videatur ex colore diiudicari posse; tamen animaduertendum est, interdum pulmones subfuscus esse in suffocatis, licet nagent, ut in BÜTTNERI cas. 29., ut inde verendum sit, ne color etiam cum subsidentia interdum coëxistat, quod etiam re ipsa locum habuit in HEISTERI exemplo (a. 1732.), aliisque. Et color etiam in infantibus, mortuis natis, rubicundus, aut albicans, deprehenditur, aut per inflationem factam in eum mutatur subfuscus: contra in mortuis natis, sed putridis, subfusci natant pulmones, ut in HEISTERI (1722.) observatione: Igitur neque sollemne experimentum, nec color, sufficiunt interdum ad diiudicandam respirationem.

Addidit igitur BÜTTNERVS vesicularum distensionem & sanguinis maiorem in vasis pulmonum accumulationem. Sed ipse,

vesi-



vesicularum distensionem in mortuo nato 6. mensium fetu se obseruasse monuit cum colore subfusco, igitur hic fetus videri potuisset suffocatus esse, si aetate maior fuisset. Et, quod sanguinis maiorem copiam attinet, cf. ea, quae dixi §. XXIX., & adnotetur, requiri, vt obducentes eam constitutionem probe nouerint, nec sanguis reuulsus fuerit.

Igitur, quum pulmones fundum petunt, aliqui superesse casus iure omnino videntur, vbi respirauit infans, ex his criteriis non detegendi; sed vt iidem, si fieri potest, decidantur, ideo imprimis opus est, ne casuum copia, vbi de vita, ob respirationis signorum defectum statui nequit, hinc ad alia solum respiciendum est, praeter necessitatem adaugeatur. Ergo videamus,

## XXXIII.

*De antlia pneumatica & thoracis incremento.*

Antlia pneumatica vtendum esse, nuper Cl. PLOUCQUETUS statuit, eius tamen vsum non exposuit. Haec vero proposuit HALLERVS <sup>n)</sup>: „Idem aër, qui in pulmo-

N 3

„ne

<sup>n)</sup> *Elem. phys.* T. III. pag. 282. Nituntur SEN-  
GVERDI, BOON, KVHNBAYM, GVIDE,  
VERATTI, MVSSCHENBROECK, BEL,  
WOLFF, HALES, alior. obseruatt.



„ne latet, sub campana vitrea, subtracto aëris  
 „externi comprimentis prelo, pulmonem aut  
 „excisum, aut in pectore relictum distendit;  
 „vt mire turgeat, & denique crepet, vsque  
 „dum omnis aër de aspera arteria exiuerit.  
 „Tunc enim contrarius est inanis spatii effe-  
 „ctus, & idem pulmo aëre reddito nunc ru-  
 „ber, compressus, sanguine effuso plenus,  
 „denique, sed sero, (aut numquam) in aqua  
 „densatus subsidet. Si vero aspera arteria li-  
 „gata fuerit, vt aër de pulmone fugere ne-  
 „queat, nabitur idem, neque soliditatem il-  
 „lam induet, quam in vacuo spatio dereli-  
 „ctus. Diuersitatem euentus Cl. VERA-  
 „TUS recte per longiorem, vel breuiorem,  
 „in vacuo spatio moram interpretatus est.  
 „A breuiore mora aëris multum in pulmone  
 „remanet, idemque expanditur. Diutius si  
 „pulmonem in vacuo spatio reliqueris & iste  
 „aër extrahitur, & inanes supersunt vesicu-  
 „lae, cum sanguineo, systemate imperuio.  
 Sed ex hoc experimento si vel certi quid erui  
 possit, vereor tamen, in foro adhiberi possit,  
 quum partim physici raro videntur anthia  
 pneumatica gaudere, partim non absque diffi-  
 cultatibus ad locum, vbi infans delitescit, de-  
 portari poterit. Et verendum est, ne aër  
 ipsarum fibrarum pulmonalium educatur.

Haec

Haec enim alibi HALLERVS <sup>o)</sup> proposuit: „Pulmo fetus in vacuo spatio non turget. Id puto nimium. *Non valde* CROE-SERVVS. „ Haec itaque mittamus.

Thoracis e contrario dilatatione (cf. §. XXIX.) videmur vti nos posse ad varia definienda. Primo enim, quum incrementi limites certi dari debeant, ratio erui poterit, quantum increuerit thorax respiratione, comparato, remotis tum integumentis communibus, tum musculis, ossa, thoracis compagem constituentia, regentibus, ambitu externo thoracis, ope filii circumducti cognito, cum longitudine spinæ dorsæ thoracicæ & altitudine, seu distantia sterni a vertèbris dorsæ, hisque omnibus denuo cum volumine pulmonum & cordis & glandula thymus comparatis. Deinde hac thoracis capacitate, collata cum longitudine infantis, ex repetitis experimentis constabit, num ea sit a respiratione aucta, an non mutata. Porro hac thoracis capacitate, a respiratione solum producta, comparata cum volumine pulmonum constabit, num volumen pulmonum sit auctum a respiratione, an ab inhalatione, an non mutatum, an parum.

N 4

mu-

<sup>o)</sup> *Elem. phys.* T. VIII. p. I. p. 403.

mutatum, forte a putredine. Denique, num  
vegeta fuerit respiratio, an fecus.

### XXXV.

*Nouum nostrum experimentum describitur.*

Aliud iam experimentum nuper proposuit idem Cl. PLOUCQUETUS (cf. §. XXIII.); quod cum alio combinandum ante eum arbitrabar. Hoc autem illi in eo simile est, quod pondus quoque, sed alia ratione, aestimatur.

Nimirum, corpus quodcumque in fluido, in quod submergitur, tantum amittere ponderis, quantum fluidum, quod eiusdem spatium occupare possit, sit exhibiturum; e contrario fluidi grauitatem in eadem ratione increfcere; hinc corpora eiusdem ponderis, diuersae vero magnitudinis, in fluido diuersum pondus amittere, vt maior volumine plus perdat, & fluidum pondere augeri, pro voluminis corporis submersi ratione, ex physicis notum est. Quum vero volumen pulmonum respiratione increfcat, vt differentia omnino notabilis intercedat inter infantem, qui respirauit, eumque, qui non respirauit; idem tamen a plerisque auctoribus neglectum sit, vt videatur congruum satis

fatis criterium, ob neglectam comparationem, paucorum attentionem excitare; arbitrabar, merito hoc experimentum in foro adhiberi, vt de voluminis ratione constet, ab obducentibus alias aut neglecta, aut non satis certo definita. Igitur pulmones rite eximantur, vasis maioribus deligatis, ne aqua irruat, cum corde staterae bonae notae adfigantur, & notato aequilibrio, submergantur in sufficienti aquae quantitate (opus est alto vase), tumque animaduertatur, quantum in aqua ponderis amittere videantur. Deinde a corde soluti pulmones soli submergantur, vt cordis pondus detrahatur, vbi, quum pulmonum infantis, qui respirauit, natatio experimenti fidei detrahare quid posset, pulmonibus aut antea notum, aut postea explorandum, & deinde subtrahendum, pondus adiciatur, vt integri in aqua submergantur. Satis autem notabilis differentia inde animaduertenda esse mihi videtur, saltem ad 2 - 4 vncias; inprimis quum sale communi saturata aqua adhibetur. Quo enim grauius fluidum est, eo maior effectus vterque: vt tum plus perdant pulmones submersi, tum plus ponderet aqua. Proficuum quoque esset vasi, in quo pulmones submerguntur, adnectere vitreum tubulum, aut vas capillare, sub an-



gulo obtuso illi adplicandum; cui simul congrua ratione scala addatur. Quoniam enim pulmones, submersi in aqua, tantum aquae simulant, quantum volumine e locó suo dimouent, aqua in vase adscendat, oportet, in adnexo vase vero ad adaequatam altitudinem simul euehitur, secundum physica principia, ut differentia, pro volumine pulmonum varia, congrue sic ope scalae possit animaduerti p).

### XXXVI.

*De eiusdem laudibus & vituperationibus.*

Sequitur ut de eiusdem experimenti laudibus & opprobriis dicam. In iis casibus, ubi infantes respirauerunt quidem, sed suffocati sunt, & pulmones exhibent submergentes & subfuscis, rei veritas erui potest, si-  
qui-

p) Instrumentum ad hanc rem aptum videtur esse vas, paratum ex ferro, per malleum attenuato (Eisenblech), cui ad latus adplicetur vitreus tubulus, insertus cochleae, ex orichalco confectae, tubulum ferreum, illum ab iniuriis externis defendentem, illumque tenentem, recipienti.

Ob natationem pulmonum, qui aëre turgent, opus est, ut pulmones inserantur vasculo, confecto ex filis argenteis, ut mediante hinc adiecto pondere pulmonum natatio impediatur. Ne vero inde in experimento error emergat, quid vasculum cum pondere mutet in aquae incremento, videndum & subtrahendum.



quidem volumen auctum testatur, factam esse respirationem: Itaque quando pulmones fundum petunt in aqua, subfusi sunt, nec volumen auctum ostendunt, certi esse possumus, infantem non respirasse & postea suffocatum esse; sed animam non duxisse. — Ne regeras, velim, Cl. LODERI observationem. Vnica enim, quae contrarium suadet, licet omni sollertia facta videatur, observatio poterit enunciationes contrarias, frequentissimis observationibus stabilitas, infirmas reddere. Quod pulmones in exemplo LODERI fundum peterent, id explicarem ex eo, quod infans suffocatione naturali (cf. §. XXIX.) mortuus esset; atque in eius testimonium profundum eorum colorem, & qui adfuisse videtur, alius mortis causae defectum adducerem. Obstat tantummodo, quod pulmones collapsos dicat. Sed quomodo collapsus pulmonum conciliari tam cum vita, ad 13. horas producta, quam cum clamore infantis possit, fateor, me non adsequi. Quis enim credat, clamorem aut posse citra pulmonum distensionem fieri, aut pulmonum distensionem, tum respiratione, tum clamore productam, posse iterum evanescere, quum milles millena exempla contraria existant? Igitur collapsus pulmonum ad solum Cl. LO-

DERI oculorum testimonium redit, quod tam diu liceat in dubium vocare, donec circa volumen pulmonum ceteriora eruuntur obseruata. Facilius enim credam, infantem natum posse citra respirationem aliquamdiu persistere, ut in BOHNII exemplis, quam statuam, pulmones infantis, qui respirauit & eiulauit, posse esse collapsos. Atque utinam Vir Cl. ante, quam in frustula secaret pulmones, aërem inhalasset, sicque quonam euentu pulmones adhuc dilatari possent, attendisset! — 2) Quum pulmones subputridi infantis natant, inprimis si vera sunt, quae monui §. XXXI., ut volumen putredine non increascit, vel parum tantummodo, maior adest certitudo, pulmones natant ob respirationem peractam. 3) Si pulmonum quaedam pars scirrhis, aut calculis est oppleta, sic, ut pulmones integri fundum petant, dissectorum vero pars tantum submergatur, altera supernatet; & hic ob volumen, auctum non tantum quidem, quantum in aliis, sed auctum tamen, diiudicari potest, imo in subputridis certius, idem pendere a respiratione & morbo. Idem obtinet, quum vnus pulmo respiratione tantum dilatatus est, alter morbo laborat, ut in KALTSCHMIEDII exemplo.

Opprobrio tamen experimento nostro verti poterit, quod volumen auctum interdum adsit, reperendum vel ab aëre, inhalato post mortem, vel a morbo, hydrope pulmonum, hydatidibus, pure: imo in scirrhis, calculosis pulmonibus deficiat. Sed si scirrhi sunt, aut calculosi, pulmones, aut hydrope laborant, aut hydatidibus stipati sunt, ita quidem, vt respiratio omnino peragi non posset, tantum sane erit vitium, vt de eo satis constet. Si pars tantum scirrhi, calculi, hydrope laborat, &, quod reliquum est, respiratione distensum, idem indicaturum est experimentum. Quod vero inhalationem attinet, fatendum quidem est, inde volumen increfcere, vt errori locus sit, sed ad eam partim respondi §. XXXII.; partim alia ponderis ratione (quae est altera experimenti pars) in vsum vocata, & hic casus discernitur: nimirum iam ponderis exploratione vtendum erit, a PLOUCCUETO etiam proposita. Igitur si volumen exploratur, pondusque adnotatur, quod perdunt pulmones, aëre distenti, tumque absolutum \*) pulmonum

\*) Hoc autem requirit, vt admissio aquae caueatur ratione dicta §. XXXV. Quodsi caute deligatis vasis hoc explorasses, posses tum pulmones staterae adfixos submergere; licet enim vel aqua irrueret, id nihil nocere posset.

num pondus exploratur in infantibus, qui respirarunt, nec tamen respirarunt, atque utrumque coniungitur, constabit, num aër respiratione, an inflatione, pulmones subierit. Ponamus enim, in infantibus utriusque generis pulmones in aqua perdere  $\xi ij$ , ponderis vero absoluti pulmonum infantis, mortui nati, rationem ad eam viui esse  $= \xi viij : \xi x$ . : tum ex eo facile poterit iudicari, num infans respirauerit, an aër inhalatus sit mortuo: quod in putrido etiam infante maiorem omnino largitur certitudinem. Igitur, quod desiderat PLOUCQUETUS, aegre definienda ratione grauitatis pulmonum ad totius corpusculi pondus non opus est: sed sufficit, rationem experimentis stabilire, vbi dubitationi nullus locus est, posteaque in obuiis casibus videndum, ad quamnam rationem pulmonum conditio accedat. Praeterea vero pondus absolutum pulmonum tam in mortuis natis, quam in viuis explorandum est: ut, si opus est, ea ratione uti possint physici.

Iam ponamus pulmones, respiratione auctos, perdere in aqua  $= 5$ , inhalatione auctos  $= 4$ . neutro modo auctos, s. mortuorum  $= 2$ . putredine aliquantum auctos  $= 2\frac{1}{3}$ .  
Gra-



Gravitatem specificam autem pulmō-  
num mortuorum, esse  $= 6$ , & sanguinis  
iacturam expertorum  $= 5$ , putridorum  
 $= 5\frac{1}{2}$  : inhalatione his aequalem, respira-  
tione  $= 8$ , & suffocatione  $= 9$ .

Tum in mortuis natis, nec inhalatio-  
nem, nec putredinem expertis, ratio volu-  
minis ad gravitatem erit  $= 2 : 6$ , eorum-  
dem sanguinis iacturam expertorum  $= 2 : 5$ ,  
eorum putridorum  $= 2\frac{1}{3} : 5\frac{1}{2}$ ; inhalationem  
expertorum  $= 4 : 6$ , aut  $4 : 5$ , aut  $4 : 5\frac{1}{2}$ ;  
respirationem admissorum  $= 5 : 8$ , suffo-  
catorum  $= 5 : 9$ .

## XXXVII.

*De utilitate porro.*

Igitur mihi quidem tanti habendum  
esse hoc experimentum videtur, vt viros  
celebres, qui facile in hanc rationem inquire-  
re possunt, rogem, in id inquirant, si attentione  
dignum videtur; atque, quae adnotarunt,  
cum re publica litteraria communicent.  
Adeo congruum ad detegendam respiratio-  
nem mihi videtur experimentum, vt, si lo-  
co sollemnis inde a saeculo in vfu fuisset (si  
vel aliquando leuem errorem suggerat) ta-  
men



men non tot produxisset, quot proh! dolor effecit sollemne, paucis abhinc annis, quantum licebat, monitis, in primis BÜTTNERI, sero limitatum. Quamuis enim & reliqua signa idem ulterius comprovent, iis tamen cautelis non opus est, ut dissectione, sollicita, pulmones aquae tradendi, methodo. Et quamuis videatur nostrum experimentum eodem niti fundamento, ac sollemnis docimasia pulmonum, scilicet volumine maiori, specificam etiam gravitatem pulmonum minuente in nuper natis, ut iam natent antea submersuri: eadem tamen gravitas mutatur a putredine & ab aliis causis, ut voluminis incrementi iustam mensuram nostrum experimentum magis suppeditet, quam vulgare.

Neque igitur ulterius locum habere possunt haec a Cl. ÉSCHENBACH proposita: „inflatio iudici civili merito relinquatur detegenda, quoniam medico nullum sui vestigium restans offert.„ Quod si verum esset, fere metuendum, ne inflatio, clam peracta, habeatur pro respiratione. „Quin etiam, inquit MORGAGNVS, ut in omne scelus prona quorundam hominum sunt ingenia, posset inimico in mulierem animo quispiam, aut quaequam, in cuius manus  
„infans,

„infans, mortuus editus, peruenisset, clam  
 „omnibus id fecisse, vt immerentem calum-  
 „niaretur, quasi spirantem occidisset, — haec  
 „magis, ne medicis ac iudicibus sint prorsus  
 „incognita, attingenda a nobis cenſeo, quam  
 „vt in vulgus emanent, non aliter ferme, ac  
 „quae de venenis neceſſario ſcribuntur. „  
 Hic iam locus, non terret, quum dicta ad  
 §§. XXXII. & praeced., & hoc meditor, quod  
 in foro vix quis eo animo videatur aërem  
 eſſe inflaturus, vt matrem grauaret, quum  
 vix euentum praeuideat, fore, vt pulmones ſi-  
 miles reddantur infanti, qui respirauit. Vt  
 vero diſcernatur ſollicite is caſus, nihilo mi-  
 nus opus eſt. Ponamus enim, infantem mor-  
 tuum natum eſſe, eidemque inflari aërem, eo  
 euentu, vt plurimus ſanguis per vmbilicum,  
 non deligatum, expellatur, vt accidisse dici-  
 tur in CAMPERI exemplo. Perficere quis  
 id poteſt bono animo, rem ipſam non indi-  
 cans, quod metuat, ne ob euentum, non ex-  
 ſpectatum, in poenam incurrat. ludicabitur  
 is infans viuus natus eſſe, quum pulmones,  
 ex ſollemni experimento natantes, albicantes,  
 ſpongioſi, teſtari videantur de reſpiratione,  
 imo qui HEBENSTREITIVM ſequuntur,  
 κενεαγγίαν, ſeu haemorrhagiae ſigna, habe-  
 bunt pro ſignis vitae poſt partum. Nonne  
 O hinc

hinc turpes errores! Néc tamen facile is effectus metuendus est, vt deficit in BÜTTNERI exemplo, cas. 72. in primis quum ab obstetrice suscipitur inflatio, vbi vmbilici ad erit deligatio, nisi ipsa malo animo egerit. Ponamus e contrario, infantem obiisse in utero haemorrhagia, contingente per placenta, ante partum solutam, eidemque mortuo nato esse aerem inflatum, & hic iudicabitur natus esse viuus, & si alia negliguntur rei adiuncta, aut, quid statuendum sit, medicus ignorabit, aut, ficta esse a matre deposita, statuet.

## XXXVIII.

*Vbi infans, viuus natus, non respiret.*

Sequitur, vt eos casus aestimemus, vbi infans viuus quidem natus est, at non respirat, adeoque effectus etiam respirationis non exhibet. Itaque impeditur respiratio a debilitate fetus quacumque. Quum enim dilatatio pectoris, perficiunda viribus fetus, praecedere debeat inspirationem primam, si fetus vires deficiunt necessariae, & respiratio deficiet. Itaque debilis nascitur ex haemorrhagia, contingente ob solutam ante partum placenta, ex capitis incuneatione, ex con-

strictio-

strictione vmbilici circa partem fetus, rel. Qui casus num obtinuerint, ex iis, quae partum & praecedunt, & comitantur, & subsequuntur, ex matris conditionibus aequae, ac fetus; cognoscuntur: alibi tamen fusius considerari debent.

Impeditur porro respiratio a caussis, aëris accessum ad pulmones impredientibus: hinc 1) ab integris post partum natum membranis, ut ouum integrum exclusum sit (qualia partus exempla habent HARVEVS <sup>q</sup>), C. STALPART van der WIEL <sup>r</sup>), tria CAMPER <sup>s</sup>), alii); 2) a concretis, larynge, aspera arteria, bronchiis, quale exemplum ALBERTI refert; 3) a mucositate, fauces & pulmones obturante. 4) ab occlusionem narium & oris. 5) a hydropse thoracis. Primus modus, si postea remouentur, aut soluuntur membranae, sui signa non relinquit, hinc nisi aliunde certitudo adquiri potest, vix detegitur. Alter cognoscitur sollicita sectione partium dictarum, in partu vitali, dum respirationis signa deficiunt, instituenda. Tertius modus cognoscitur inquisitione in nares, fau-

O 2

q) De gener. anim. p. 356.

r) Obs. rar. p. 355 sq.

s) l. c. p. 36 sq.



fauces, tracheam, bronchialia vasa. Vbi animaduerti debet, monente ROEDERERO, aliquando ruptis membranis & effluentibus aquis infantem haurire liquorem: hinc si eiusmodi infans aquis a matre traditur, videri posset respiratio impedita esse ab aquis: igitur in naturam fluidi, ibi reperiundi, inquirendum erit. Et, vbi sinister pulmo natat, dexter submergitur, quum contrarium potius obtinere soleat, & debeat, inprimis videndum, num aëris introitum in dextrum mucus impediuerit. An forte, si firmo nituntur fundamento dicta a Cl. PORTAL, mucus, solum dextrum pulmonem opplens, sufficit impediendae respirationi, quum aër difficilior finistram intret? Nequaquam: siquidem *idem* obseruauit, in duobus experimentis finistram dilatatum esse ab aëre inhalato, obstante cruore, & muco, in pulmone dextro. Quartus denique sui signa relinquit, alibi exponenda. Nec signis suis quintus modus destituitur.

Impeditur denique respiratio a haustu fluidi peregrini, seu ad respirationem infantis nuper nati inepti, eiusque irruptione in partes dictas: hinc 1) a liquore amnii, 2) ab aqua, aut simili fluido. 3) a frigore. 4) a sul.



sulphure accenso. Ii modi quomodo detegendi sint, alius loci est.

## XXXVIII:

*Quis dici possit respirasse.*

Infans ante partum mortuus, §. XXVI. sq. aequae ac is, qui sub partu moriturus conditiones, §. XXVII. adductas, non admisit, & viuus natus, fata dicta §. praec. expertus, respirare non potuit, hinc etiam carebit respirationis effectibus. E contrario, qui sub partu conditiones §. XXVII. admisit, nec fata expertus est, dicta §. praec., respirauit, & phaenomena respirationis exhibiturus est. Itaque quum respirationis effectus deficiunt, dicendus est, infans *nec* respirasse in partu, *nec* post partum: vbi vero respirationis effectus exhibet infans, dicendus est respirasse *vel* in partu, *vel* post partum. Vtrum vero in partu, an post partum respirauerit, aut vtrum respiratio in partu, an post partum impedita fuerit, per sola respirationis phaenomena raro constat, sed per alia decidenda res, est.

## SECTIO III.

## V S V S F O R E N S I S.

## XXXX.

*Quando de respiratione facta aut non facta  
statui possit.*

**V**bi de vita & morte, & mortis causa, in infantibus nuper natis quaestio est, ibi ad pulmonum conditiones respiciendum. Quamvis vero, iis solis vix, confidendum esse, quum de vita & morte iudicium ferendum est, ex prioribus sectionibus constet; sed ad alia simul respiciendum sit, tamen maior omnino certitudo ex iisdem expectanda est, si omni, qua par est, cura adhibentur. Omissis itaque iam iis, quae ad diiudicandam vitam & mortem praeterea faciunt, alia occasione adiungendis, quomodo iis conditionibus utendum sit, exponamus.

Igitur de respiratione facta, aut non facta, statuitur; si

- 1) pulmonum constitutio est naturalis, aut, si praeternaturalis est, tamen intra vnum vel alterum alterutrius pulmonis lobum,

bum, aut alterutrum pulmonem continetur.

- 2) Signa omnia, ex pulmonum constitutionibus defumenda, coniunguntur, & cautelis necessariis, supra expositis, factis fit.

### XXXI.

#### *Quis respirauerit.*

Infantem respirasse, concludimus, si

- 1) pulmones spongiosi atque extensi, vt pericardium fere tegant, & vesiculae aëre distensae conspiciuntur.
- 2) Color pulmonum est rubicundus, albidus.
- 3) In aqua submersi perdunt aliquot vncias, & aquae pondus augent ad aliquot vncias.
- 4) In eadem natant, aut integri, aut dissectorum pars notabilis.
- 5) Pondere (ad 2 vncias) superant pondus pulmonum mortui nati.
- 6) Vasa sanguifera conspiciuntur ampliora, aut compacti sanguinis maiori copia

obruta sunt : nisi sanguinis, a pulmōnibus reuulsi, signa adsint.

- 7) Inter discindendum sonitus percipitur.
- 8) Thorax mensura deprehenditur amplior, latior.
- 9) Requisita §. praeced. in vsum vocantur.
- 10) Bronchiorum ramus sinister minus est retrorsum & deorsum flexus, valuulae bronchialis minus eminet; aorta minus est retrorsum inflexa, & supra rami sinistri latus ducta; & ramus bronchiorum dexter magis ad superiora ductus est, quam solet ante partum.

## XXXXII.

*Quis suffocatus dici possit.*

Infantem respirasse, sed suffocatum esse statuimus, si

- 1) pulmones extensi sunt, ut pericardium fere tegant.
- 2) In aqua submersi perdunt aliquot uncias: aut aquae pondus augent ad aliquot uncias.

3) Pon-

- 3) Pondere absoluto pondus pulmonum mortui nati, imo & eius superant, qui respirauit.
- 4) Vasa sanguifera conspiciuntur ampliora, & compacti sanguinis maiori quantitate obruta sunt, quam solent esse a respiratione sola.
- 5) Sonitus inter discindendum percipitur.
- 6) Thorax amplior, latior est.
- 7) Requisitis §. XXXX. satisfit.

Color pulmonum varius est, mox rubicundus, albidus, mox atroruber, subfuscus, caeruleus. Aquae iniecti pulmones interdum natant, saltem expressi: interdum fundum petunt. Igitur signis indicatis a n. 1-7. imprimis confidendum est.

### XXXXIII.

*Quis non respirauerit.*

Fetum non respirasse, concludimus, si

- 1) Pulmones collapsi ad vertebrae dorsi conspiciuntur: nec vesiculae expansae sunt.
- 2) Color pulmonum est atroruber, subfuscus.
- 3) Aqua submersi pulmones multo minus, ad aliquot uncias, perdunt, quam



illi §§. XLI. XLII., nec pondus aquae adeo augent.

4) In aqua fundum petunt integri & dissecti.

5) Pondus absolutum minus exhibent, quam ii, qui respirarunt, ad aliquot uncias.

6) Vasa sanguifera minora sunt, nec multo sanguine, eoque non compacto, referta.

7) Nullus sonitus inter discindendum percipitur.

8) Thorax mensura minor, angustior est.

9) Concreta sunt larynx, aut vasa bronchialia, aut intimior compages pulmonum, aut pulmones deprehenduntur scirrhusi, calculosi, purulenti, hydro-pici, aut obstaculum, respirationi impediendae sufficiens, deprehenditur, quod mox nato obiectum esse eruitur, adeo ut repugnet, aërem potuisse intrare.

10) Si inflati exhibent colorem rubicundiores, albidum, in aqua natant, & expansi, in aqua submersi, multo magis perdunt, & aquae pondus augent, ad aliquot uncias.

Notan-

Notandum est, colorem, amplitudinem pulmonum; pondus vtrumque mutari a morbis pulmonum, sæpius indicatis, itaque ad hos respiciendum est, videndumque, quid illis tribuendum sit.

## XXXXIII.

*Inflatio quando adfit.*

Fetum non respirasse, sed *inflatum* pulmonibus esse aërem, statuimus: si

- 1) pulmones, viuorum fere instar, extensi.
- 2) Color rubicundus, albicans.
- 3) In aqua natant, integri & disseci.
- 4) Vasa vix ampliora, nec sanguine multo referta.
- 5) In aqua submersi perdunt aliquot vncias & aquae pondus augent ad aliquot vncias.
- 6) Pondus absolutum vero conuenit magis ei infantum mortuorum: nisi maior pars calculorum, aut muci, rel. in pulmonibus deprehenditur. Sed tum reliqua signa deficient.
- 7) Thorax capacitate similis est ei mortui nati.

## XXXXV.

## XXXXV.

*Putredo praesens quando natationis causa.*

Fetus mortui nati pulmones ob putredinem natant, statuimus: si

- 1) desumuntur ex infante putrido, ipsi foetorem putridum spargunt & putredini subsunt.
- 2) Color pulmonum est atroruber, subfuscus: (est tamen interdum albicans, in iis etiam, qui in utero mortui sunt).
- 3) Vasa vix ampliora, nec sanguine multo referta.
- 4) Volumen pulmonum parum modo excedit mortuorum illud; hinc
- 5) In aqua non tantum perdunt, fere minus aliquot unc., quantum viuorum: & sic aquae pondus augent.
- 6) Pondus absolutum accedit ad mortuorum pulmonum illud.
- 7) Dissectorum frustula, manu compressa, fundum petunt.
- 8) Alia corporis viscera pariter aquae innatant, ac pulmones.
- 9) Thorax capacitatem similis est ei mortui nati.

## XXXXVI.

*Iudicium ubi suspendendum.*

De respiratione facta, aut non facta per pulmonum conditiones nihil decernimus, si:

- 1) Pulmo vterque morbo laborat.
- 2) Idemque mediis in aquis haeret.
- 3) In aqua tantum ponderis amittit, vt differentia non sit notabilis.
- 4) Pondus exhibet id, vt diuersitas nihil certi indicet.
- 5) Forte etiam simul putredo, aut inflationis suspicio adest.

Tamen si omnia, quae supra exposuimus, coniunxeris, atque ad alia attenderis, vix erit iam casus, vbi iudicium debeas suspendere.

## XXXXVII.

*Quo ordine conditiones considerandae.*

In adnotandis pulmonum conditionibus hic seruetur ordo, vt

- 1) attendatur ad volumen & colorem infantis pulmonum: an putridi, an morbofi sint, videatur.
- 2) Caute exempti staterae adnectantur & dicta ratione exploretur, quid perdant: aut vas, aqua repletum, staterae imponatur, & videatur, quantum ab immerfis pulmonibus pondus crescat.

3) Sol-



3) Soluantur & experimentum sollemne : in aquae purae congrua copia instituantur caute.

4) Discindantur, ad sonitum attendatur, & frustula iterum in aquam dimittantur, & simul an constitutione praeternaturali, & qua, laborent, animaduertatur; manu compressa iterum iniiciantur.

5) Si mortui fetus sunt, aut viui, qui non respirauit, aut alteruter pulmo, aut lobii quidam inflentur & instituantur experimenta.

### XXXXVIII.

#### *Animaduersiones.*

De vita & morte infantum ex pulmonum conditionibus haec inferas :

1) Si quis edit signa respirationis (§. XLI.), is vixit extra vterum : tamen constet de eo, illos casus, indicatos §. XXVII., non obtinuisse. Idem iudicato de signis suffocationis §. XLII.

2) Si quis edit signa non factae respirationis, inflationis, putredinis, natationis causae, §§. XLIII–V. is certe non respirauit, potuit tamen vixisse extra vterum, aut sub partu. Sed viuere absque respiratione, vix est viuere: neque consideratione dignum esset hoc vitae



genus; si ediceretur, signa non factae respirationis matrem non absoluere a quaestione, quae sit mortis causa: interdum enim infans in vtero adhuc mori violentae traditur; aut sic comparatae sunt fetus conditiones; ut vita illa imperfecta, vterina, in veram mutari facile potuisset, nisi sola peperisset mulier; aut ipsa durante partu, aut postea, causa fuit, ut vita vera auerteretur. Atque, impedire quem, quo minus viuât, est omnino, mortem inferre; idemque delictum est, & sic etiam punitur.

Itaque praesentibus signis respirationis veris, & certitudine, illos casus, ut in vagina respiraret, non obtinuisse, infantem viuum natum esse, & tum mortuum, inferre satis certo possumus. Quodsi respirationis signa vera non adsunt; num in vtero, an durante partu, aut post partum, obierit? ex eo decidi non potest.


Sed omnes hos casus, iam traditos, in foro ne decidas ex solis iam propositis conditionibus, sed attendas *ad reliqua, in cadauere obuia*, eaque, quae partum & praecedebant, & comitabantur, & subsequiebantur, & quae ab infanticidii rea, adstantibusque ad  
acta

acta depoñuntur: saltem donec constiterit, quatenus confidi possit mutatae pectoris capacitatis rationi ad volumen pulmonum, eorumque grauitatem. Quod ideo inprimis requiritur, quoniam iudicium medicorum maiorem fidem in foro obtinet, quam depositiones matris, quum dissensus adest 1).

- 1) PRAGEMANN de fide, quae medicis est apud ICt. p. 7. de BOEHMER de parricid. supplicio §. 8. Selecta iur. Rostoch. fasc. 7. spec. 2. STRVBENS rechtl. Bed. T. IV. n. VII. QVISTORP V. ill. peinl. Recht, p. 424. Koenigl. preuss. Edict vom Kinderm. Berl. 1764. KRESSIVS ad art. C. C. C. 131: §. 3. n. 2. ENGAY P. 3. dec. 60. n. 1: EISENHART T. I. p. 103.

### C O R R I G E N D A.

P. 5. l. 16. certo l. cito. l. 22. SCHVLTVS l. SCHVLZVS. P. 24. l. 10. impunis l. insons. P. 39. l. 20. ausgeschlossen l. ausgeflossen. P. 45. l. 2. explicari l. conciliari. P. 46. l. 1. Resp. ad l. Vindiciae. P. 49. l. 5. Atque ad l. Vindiciae. P. 52. l. 23. artis non peritus adde quicumque. P. 54. l. 17. suffolos l. suffusos. P. 71. n. q) l. 9. prouocandi l. prouocanti. P. 74. l. 5. omnes l. omnia. P. 110. BAGLIVM pone ad annum 1700, quem subscriptum habent eius experimenta, inter quae locus noster occurrit. P. 117. l. 14. natabant l. natarunt. P. 123. RVD. FRID. OVELGÜN referatur post MAZINVM ad. P. 124. ad annum 1748.; quo actor. T. 8. prodiit. P. 134. §. XVII. l. 10. alium l. aliud. P. 140. de HALL. l. 5. falsa l. salsa. P. 157. l. 18. Inde sit l. fieri. P. 179. l. 15. l. Hinc & HALLERVS ipse fateatur, non videri probabile. &c. P. 190. l. ult. dele: ob inflatum aërem, mortuo nato, ab aliquo. P. 191. l. 13. suscepto l. susceperunt. P. 192. l. 22. erant l. erat. P. 206. l. 2. nec tamen l. & iis, qui non. P. 103. l. 9. obseru. adde non.



TIGHT BINDING  
NARROW GUTTERS